

Ex libris Ludovici Choulant.
Fresdae 1825.

V. Lissak's "Hilbert's Raum",
Katalog 8556.

Zur Biographie d. Christoph Plantin
von Van Hulst Mst in der Revue de
Liege, Novemb. 1845, darauf drückf von
A. Scheler im Serapeum VII. D. 321 ff.
Graz 1846

Elfr. Rys Plautin von geboren zu
Mont-Louis bei Tours 1514, starb zu
Aulwangen am 1. Febr. 1589; sein
sohn Franz Kapfelingius (Kaulenghien)
erblte die Litteratur Drückerei, wofür er
Aulwangen Drückerei von der St. Mein. Plau-
tine mit dem andern Elfringsohn des Vaters
Moritz (Moerentorff) fortgesetzt wurde.



PVRGANTIVM

ALIARVMQVE EO

FACIENTIVM, TVM ET

Radicum, Conuoluulorum

ac deleteriarum herba-

rum historiae

LIBRI IIII.

REMBERTO DODONÆO Mechli-
nensi Medico auctore.

ACCESSIT Appendix variarū & quidem rarissimarum
nonnullarum stirpium, ac florum quorundam peregrinorum,
elegantissimorumq; icones omnino nouae nec antea editae,
singulorumq; breues descriptiones continens cuius altera parte
umbellifera exhibentur non paucae, eodem Auctore.



ANTVERPIÆ,

Ex officina Christophori Plantini ...

Architypographi Regij.

M. DCLXXIIII.

1574.

Christophorus Plantinus

SVMMA PRIVILEGIORVM.

CAUTVM est Regio priuilegio, ne quis alius
præter Christophorum Plantinum, librū cui
titulus est, *Purgantium aliarumq; eò facientium, tum
& Radicum, Conuolulorum ac deleteriarum herbarum
hystoriae libri quatuor*, Remberto Dodonao Mechliniensis
Medico auctore, imprimat, vel alibi impressum ven
dat hinc ad octennium, sub pœna cōfiscationis li
brorum, vt latius patet in litteris datis Bruxellæ,
penultima Iulij, M. DC LXX I I.

Subsignat.

De la Torre.

Idem cautum est in Consilio Brabantie, ad toti
dem annos, & sub pœnis iisdem, vt in superiori
Priuilegio; quemadmodum latius patet in litteris
datis Bruxellæ 12. Septemb. eiusdem anni.

Subsignat.

I. de VVitte.

MAXIMO ET³
LONGE POTENTISS.
D. PHILIPPO, HISPANIAR.
CATHOLICO REGI.



ELVTI quocunq;
mentis oculos cō-
uertimus, amplif-
sime ac potentif-
sime Rex, semper,
vbique, & nusquam non admi-
rabilis captumq̃ue humani in-
genij superans in omnibus ope-
ribus suis Deus Opt. Max. est :
ita quoque in stirpiū multiplici
materia non potest non perspici,
non considerari, non agnosci, &
admirabilis eius omnipotens
prouidētia, tum & maxima im-
mensaq̃ue eius largitas. Omniū

etenim earū rerū, quas in vsum
 & necessitatem hominum Deus
 creauit ac contulit, nulla verior,
 nulla copiosior, nulla magis lu-
 xurians, ipsa stirpium est mate-
 ria. Multa quidem animantium
 quadrupedum sunt genera: plu-
 ra volucrum: piscium etiam co-
 piosiora: non pauca è terræ late-
 bris eruuntur. Sed quid hæc ad
 tam variā, tam infinitā stir-
 pium congeriem ac molē? Adeo
 siquidem multiplex hæc est, vt
 nullo numero comprehēdi, nec
 vllis certis limitibus constringi
 posse videatur. Id quod nō mo-
 dō auctorum veterum lectio;
 verū & ipse artium magister
 vsus ac quotidiana ostendit ob-
 seruatio, euidentēq; docet expe-
 rientia.

5
rientia. Quantumuis enim quis
longo tempore in hac studij par-
te vigilet, laboret, ac sudet, ad
omnium tamen stirpium cogni-
tionem peruenire neutiquā po-
test. Semper siquidem humana
curiositas, noua perpetuò perqui-
rens, stirpium nonnullarū prius
incognitarum aut latētium ac-
cessionē adfert. Quod à tractan-
da describendaque harū historia
haud iniuria nōnullos deterret;
alios tardiores efficit; & quò mi-
nūs citò conatus suos ad colo-
phonem perducant, in causa est.
Dum etenim vnusquisque plu-
res auet, desiderat, speratque co-
gnoscere stirpes, studiorum suō-
rum labores ac fructus doctis ac
studiosis communicare non fe-

stinat; sed vel in multos subinde annos premit; aut interdū omnino supprimit: aut etiā de nonnullis & paucis cōmentationem instituit. Ita nobis vsu venisse, testantur, vna Frumentorū & leguminum: altera Florum coronariarumque herbarum antea editæ historiæ. Nā inter alias nō exiguas remoras, hæc vna quoque fuit, cur cōceptam & olim vernaculo Brabantorum sermone conscriptā de stirpibus cōmentationem, non totā, nec mox, sed particulatim Latinè edere cœperimus. Quod quidem eò libentius referimus, quia & hi de purgantibus aliisque eius generis herbis libri, pars vna aliqua tantummodo sit, à nobis meditati

&


7

& propositi maioris operis, sub
R. T. C. M. patrocinio ac fauo-
re in lucem, vti speramus, appa-
rituri: si modò vita & otiũ con-
tigerit, animusque cõmuni cla-
de perturbatissimus, ad studiorũ
labores postliminio redire pò-
tuerit. Interea hos purgantium
aliarumque eò facientium hi-
storiæ libros amplissimæ ac po-
tentissimæ R. T. C. M. offero
ac dedico: Opus quidem exiguũ
& tenue, sed tamen in quo ple-
ræq; à nemine ante nos expref-
sæ, & (absit arrogantia) nonnul-
læ quoque ab ipsis veteribus nõ
satis notæ ac cognitæ describun-
tur. Nec, vti spero, R. T. C. M.
exigui operis aspernabitur te-
nuitatẽ, sed citiùs exemplo ma-

ximorum & clarissimorum veterum Regum ac principū, hoc quantulumcunq; leuidentse munusculum benignè suscipiet, ac boni consulet. Deus Opt. Max. R. T. C. M. diutissimè Christianæ suæ Catholicæ Ecclesiæ conseruet. Mechliniæ, Idibus Nouemb. anno M. D. LXXII.

*Amplissima R. T. C. M.
perpetuò deditissimus*

Remb. Dodonæus.



REMBERTI DODONÆI

PVRGANTIVM HERBARVM

aliarumque eò facientium
historiæ

LIBER PRIMVS.

P R A E F A T I O.



VELVTI omnibus scientiis ac artibus bene & artificiosè instituta methodus lucem ornatumq; cōfert; ita dubio procul ab eadem stirpium historia, si expedita aliqua describi ac tradi posset, gratiæ quoque ac decoris plurimum accederet.

SED tam multiplex stirpium est varietas; tam infinita earum differentie; genera ita innumera, vt ordinata aliqua aut eleganti methodo comprehendendi non posse videatur.

TENTAVIT etenim Theophrastus olim in harum historia tractanda methodum inuenire. Exercuit in eadē se Dioscorides; altam omnino rationem aggressus. Tertiā verò etiam in lib. de simplicium medicamentorum facultatibus Galenus amplexus est.

NEMO tamen istorum ita perfectam aut talem ob-

seruauit, vt absoluta aut optimè instituta appellari ac dici queat: desideratus in quauis multis, quæ ad artificiosam ac elegantem methodum requiri solent.

NAM Theophrastus quidem, dum stirpes in genera quadam distinguit; & differentias caudicum, lignorum, corticum, radicum, medullarum, foliorum, seminum, siliquarum, odorum, florum, sucorum, & similium expedit, sepenumero singulas in partes resectas diuidit, membra earum ita separans, vt vnius alicuius forma, & quæ ad eius historiam sunt reliqua, non nisi è pluribus, multum frequenter separatis locis, colligi subinde ac haberi queant. Quod stirpium cognitionis studiosis, præter quòd incommodat, non parum tædii molestiaq; adfert.

DIOSCORIDIS verò ratio ac via methodica magis apparet. stirpes etenim, membris earum nequaquã diuulsis, in ordines & classes digerere cura habuit; ac congeneres similesq; coniungere. arbores videlicet arboribus sociare: fruges frugibus committere: oleracea oleraceis permiscere, ac in vniuersum similis aut eiusdem faculatis vel quandoque forma iuxta inuicem collocare. Sed tamen est & in hac ratione, quod minus aptum iudicatur, & reprehensioni expositum sit. Non raro siquidem vni alicui classi stirpes ascriptæ, ad aliam aliquam, vel plures etiam pertinere putantur. propter enim multiplicem, vt diximus, varietatem, differentesq; singularum complures proprietates, tam multa occurrunt genera, vt cui præcipuè stirps adscribenda sit, non sit expeditum; & vni apposita, ad aliud videatur transferenda.

GALENI autem methodus, quam Oribasius Aërius, Paulus Aegineta, & Arabes sequuti sunt, duabus illis expeditior ac faciliior apparet: stirpibus nempe elementorum ordine digestis. At hac ratio dum congeneres longè à se
inuicem

inuicem dissociat, separat, diuellit : diuersarum verò formarum differentiumq₃ virium coniungit : herbas arboribus commisceat : exitiales perniciosasq₃ cum edulibus aut alijs vtilibus nullo ordine inter se confundat, nec etiam satis bene constituta, artificiosa, multo minus exquisita nūcupari potest.

ATQVE his de causis, in historia stirpium artificiosam methodum, absolutissimumq₃ ordinem inuenire difficile, immo non possibile. Quod quidem pluribus verbis referimus, quò, si alicubi ab ordine etiam nos aberrare contigerit, noster conatus nostrumq₃ studiū minùs calumniis pateret. Nam cū à nobis meditatam historiam stirpium non putaremus absq₃ ordine tradendam, vnum ex superioribus amplecti necessum habuimus: neq₃ exquisitum videlicet neque absolutum.

DELEGIMVS autem ex his, eum, quem ante nos Dioscorides attentauit, tametsi non curiosè eum obseruantes. Multas siquidem stirpes in alias classes digestimus; & in singulis, crebrò alio eas ordine disposuimus.

SEPARAVIMVS autem primū arbores cum fruticibus, ab herbaceis. herbas verò in edules, ac non edules distinximus. inter edules, quædam ad fruges pertinent: alia oleraceis annumerandæ veniunt. Earum quæ non edules, quædam exitiales sunt, & excedentem qualitatem obtinent: nonnulla medicam ac purgatoriam vim acceperunt: pleraq₃ odorata & coronaria sunt: floribus itē istæ, hæ radicibus, illa seminibus suis medicina vtilitatem conferunt, aut alius modis, vel humanis vsibus deseruiunt, vel differunt.

ET de plerisq₃ quidem harum iam commentati sumus: de frugibus siquidem ac eò pertinentibus prius; deinde de floribus & coronariis odoratisq₃ nonnullis.

IN hac verò nostri operis parte earum quæ medicam & purgandi humani corporis potentiam assequuta sunt, herbarum historias prosequi institutum: vna cum iis quæ radicibus suis viiles habentur. Quibus vicinis adimniculis conuoluentes ac fruticibus sese implicant stirpes coniunguntur. harum enim nonnulla ad purgationes quoq; faciunt, & radices validas efficacesq; promunt. Accedunt etiam exitialem vim potentiamq; sortitæ; utpote purgantibus facultate proxima.

ATQVE inter has primum ordinem ac locum radicibus, proximum purgantibus, tertium conuolulis, posteriorem exitialibus ac perniciosiis herbis reliquimus.

RADICVM autem ordo siue classis, aut, ut nuncupare libuit, liber, non omnes quæ huc referri possent complectitur, verum eas stirpes tantummodo continet, quibus inter purgantes, conuoluula, vel etiam oleracea non est locus; aut quæ omnino aliò translata nō sunt. Subinde enim euenit, ut propter præstantiores aliquas partes facultatēve, quæ radicibus valent, in aliam classem traducantur: ut Iris & Pæonia, quæ floribus accesserunt. Itā fit ut radicum classis pauciores complectatur quàm omnino posset, si efficaces radicibus, omnes, vel saltem plurimæ, in hanc contraherentur.

INTER eas autem quæ præcipuam radicibus utilitatem conferunt, vel primæ sunt Aristolochiæ; de quibus idcirco initio agendum.

DE ARISTOLOCHIIIS.

CAPVT I.




ARISTOLOCHIAE, auclere Dioscoride, tres sunt; Longa, Rotunda, & Clematidis. Plinius Pislolochiam specie annumeravit quartā. Posterior ætas quintam, Sarracenicam dictam, adinuenit.

LONGA Aristolochia multis à radice tenuibus ac viticulosis germinat cauliculis; circa quos folia hinc inde mollia, odorataq;: flores iuxta folia oblongi, caui, vna parte longiores, coloris purpurei, odoris grauis: fructus turbinati, striati, exiguis pyris conformes; qui semine maturato in quinque vt plurimum partes dissiunt; quod triangulum, ac nigricantis est coleris. radix subest dodrantalis, aut breuior, digitalis crassitudinis, buxæ flavescentis coloris, odorata, sed perquam amara ac erigrata.

ROTVNDA Aristolochia cauliculis folijsq; priorem refert. sunt tamen paulo rotundiora folia, eius cuius fructus turbatur. flos vnus (differentia etenim in hoc nonnihil) oblongior & angustior, colore subluteus: alterius breuior & quarescitur parte in purpura subnigricans. fructus huius pyri modo è latiore sede fastigiatur: illius in rotundo oblongus: vtriusq; striatus. semina qualia longæ. radices orbiculatæ ac tuberosæ, gustu & odore longæ.

CLEMATIDIS longis, pratenuibus, viticulosisq; suis cauliculis, ac non raro ramosis, vicina quæuis adminicula comprehendit, quibus se similacis modo implicat ac circumuoluit. folia longiori pediculo hærent, leuia, lata, acuminata, vti aliarum. flos similiter cauius, oblongus. luteus aut ex purpura nigricans. fructus haud differentes. tenues autem radices sunt & prælongæ; modo per summa serpen-

A. rotunda, L. f.
Orb. p. 324





A. rotunda L.
Ind. penn. 320



serpentes; mox aliū denissa; colore pracedentium.

Dioscoridis exemplaria Clematiten foliis esse habent: αειζώου μικροῦ εἰκόσι, sed legendum est: ἀσάρου εἰκόσι, μικρά.

Dioscoridis loc^{us} emendatus.

Deprauatus est de Clematite & Theophrasti locus. nam ubi legitur: τῇ χροιᾷ δὲ μέλαινα, & mox: φύλλον δὲ ἔχει προσεμφερὲς τῇ ἀλσίῃ, restituendum est: τῇ χροιᾷ δὲ μέλαινα, id est, colore melina; & φύλλον δὲ ἔχει προσεμφερὲς τῇ ἐλξίῃ.

Theophrasti loc^{us} restituta.

ARISTOLOCHIAS autem nasci pinguibus & campestribus locis, Plinius refert. Hispania agri harum trium feraces sunt. Longā & rotundam in Italia ac Narbonensi Gallia reperire quoque est. Clematiten Petrus Bellonius in Ida Creta monte à se inuentam scribit. Carolus Clusius circa Hispalim, plurimisq; aliis Betica Hispania locis, in dumetis & vepribus offendisse se hanc refert.

Florent Aristolochia in Belgio quidē Maio aut Iunio: alibi & in calidioribus regionibus prius.

Nuncupatur Aristolochia Græcis ἀριστολογία; quoniam ἀρίστη τῆς λόχης, id est, optima puerperis sit.

Priorem ἀριστολογίαν μάκραν, id est, Aristolochiam longam, ab ipsius radice forma, item & δακτυλίτην, μυλονάριον & τεύξινον nuncupant; & Aristolochiam quoque maiorem.

Altera scæmina existimatur, & ἀριστολογία σποδύλη, siue rotunda Aristolochia dicitur: à nonnullis etiam χαμαίμηλον, seu terra malum. Cyclaminus tamen & terra malum appellatur, ab Aristolochiis multum differens.

Tertia Aristolochia κληματίτης veluti sarmentitia cognominatur.

Reperiuntur porro & apud Apuleium Aristolochia &
B alie

aliæ appellationes: vt, ἀδρὰ πίζα, ἐφέσια, πυξίον & δ' ἀρδα-
 ρ & δ' ἀντίς; quæ cui speciei propria sint, non satis appa-
 ret; omnibus communes videntur.

Facultate autem omnes hæ Aristolochiæ excalfaciunt,
 resiccantq̃, & ad tertium vtriusq̃ qualitatis ordinē per-
 tinent, extergendi potentiam vna habentes.

Dioscorides longam aduersus serpentes & mortifera,
 drachma pondo cum vino bibi, & vtiliter imponi refert:
 ac cum myrrha pipereq̃, potum, expellere omnia in vteris
 à partu relictā, item & menses & fœtus; idemq̃ cū pessa
 impositam posse.

Rotunda tum ad hæc omnia, cū ad alia reliqua ve-
 nena facit: item ad asthma, singultum, rigorem, splenem,
 rupta, conuulsa, laterum dolores, cum aqua pota: aculeos
 & spicula extrahit: osium squamas in cataplasmatibus per-
 mixta adimit: putredines remouet: vlcera sordida expur-
 gat, & tana cum iride melleq̃, implet: gingiuas & dentes
 purgat.

Clematitem Galenus fragrantiorē esse ait: itaq̃ ea ad
 vnguenta vnguentarios vii; sed ad sanationes infirmiorē.

DE PISTOLOCHIA.

CAP. II.

PISTOLOCHIA longa rotundaq̃, Aristolochia,
 & cauliculus & foliis similis est; minor tamen ac tenerior.
 folia eius lata ac hederacea sunt. flosculus oblongus canus
 suprema ac extrema parte nigritans. fructus subrotundus
 veluti vnius rotundæ Aristolochiæ. pro radicibus tenues
 quàm plurimæ exeunt fibræ.

In Narbonensis Gallia nec non Hispania quibusdam a-
 gris sponte nascitur: floret fructumq̃ perficit eodem, quo
 alba tempore.



B 2

Pistolochia pistilochia
 Bot. Beech. 325

Pistolochiam hanc speciem nuncupari, πολύρριζον verò cognominari, Plinius lib. xxv. cap. viii. scribit. Est, ait, & quæ Pistolochia vocatur quarti generis (Aristolochiarum videlicet) tenuior quàm proximè dicta (nempe Clematidis) densis radicum capillamentis, iunci plenioris crassitudine: hanc quidam Polyrrhiζon cognominant.

At facultate & viribus hæc aliis reliquis haud absimilis videtur, exsiccans similiter & exsiccans, non aded tamen intensè. Conuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, ex aqua potam utilissimam tradi, Plinius auctor est.

DE SARRACENICA ARISTOLO-
CHIA RVM SPECIE QVINTA.

CAP. III.

HAEC Aristolochia tenuibus foliis frondosisq₃, ramulis, reliquis sin ilis est, altior tamen ac procerior quàm longa aut rotunda. folia eius maiora quàm Asari. flores concavi, oblongi, vna parte prominentes, colore sublutei. fructus pyrorum instar turbinantur: semina in his intersepta, triangularia, sordidè nigricantia. radix longiuscula, mediocris subinde crassitudinis, lutea, Buxi ligno colore similis, amaritudine nec longa nec rotunda inferior. Est autem hæc interdum exiguas tenuesq₃, reperiri; vbi videlicet quandoque & non ita dudum collectæ ac sublatae. Ex relictis siquidem radicum particulis novellæ plantæ, tenellas initio ac sarmentitias radículas promunt.

Multis in Germania ac Belgio, nec nõ in Italia & ali-
bi, locis, huiusmodi Aristolochia reperitur, iuxta vineas
marginesq₃, agrorum læto ac restibili solo. In hortis felici-
ter quoque adulescit. Quem semel occupavit locum, agrè
deserit. Quantacumque etenim radícula pars, licet altè
atq₃



A. clematitis L.
Bot. Beech. 326

atque in profundo abdita, germen tamen emittit: adeo pertinacis est vita.

Huius æstate flores; autumnno fructus colligi possunt.

Vulgò Sarracenicam nuncupant: Galli Sarasine: Belgæ Sarasijn crupt: Germani Osterluctei: officina Aristolochiam longam. Atque pro hac olim ab omnibus habitata fuit. tandem Clematidis appellari cœpit. Sed iam legitima Clematide reperiata, quo hanc nomine alio quàm quinta Aristolochia compellabimur: nisi foris Clematidem alteram vel Aristolochiam longam maiorem eam nuncupari magis placeat.

Vi autem & potentia hæc Aristolochia reliquis etiam similis, insigniter amara et calida, longa nõ inferior: proinde & pro hac in omnibus compositionibus succedere et recipi absq; vlllo errore potest.

DE RADICE CAVA.

CAP. IIII.

RADICES caue duæ sunt. vna Maior, altera Minor.

MAIORI folia sunt Coriandri modo dissecta, tenuia, dilutè virentia; casio videlicet Aquileia foliorum colore; quorum & formam aliquatenus referunt, minora tamen: pediculi teretes, tenues & leues, palmum longi, circa quos superiore parte flosculi ordine digesti, oblongi, in corniculum desinentes, Linariae floribus conformes, dilutè in rubro purpurei, subinde albidî. semen in valuulis latiusculis exquisq; nigrum, paruum & splendens. radix tuberosa, inferiore parte sessilis, & excavata, pulpa dum recens sublutea, vbi verò exaruit in virore subnigricante, gustu cum amaritudine quadam austera.

MINOR



B 4

Thymus cava
Dud. plant. 329

MINOR species foliis, pediculis, purpurascensibus oblongisq; flosculus, siliquulis, & semine maiori similis est; humilior tantum ac minor. radix huius non caua, verum solida, globosa verticilli specie, colore subluteo, sapore cum amaritudine adstringente.

Exit vtrag; circa sepes, vepres, agrorum & vinearum margines, humilioribus locis ac solo pingui latoq;. Vtraque in Germania, minor Belgis frequentior.

Primo statim Vere vtrag; erumpit; florem mox facit, semeng; breui perficit. Mense Maio eius præter radices nihil superest; ita paucis hebdomadi apparet.

Germani Holtwurtz, Belga Hoolwoztele, id est, radicem cauam appellant. Officinas perperam hac pro Aristolochia rotunda vsas notius est quam referri, aut refelli debeat: & similiter eorum manifestus error, qui temere Pistolochiam iudicarunt. Quo autem nomine dici debeat (si modo veteribus cognita fuerit) non parum ambigendum videtur. Sunt qui Leontopetali speciem faciant: alij Eriphion: nonnulli Thesium: pleriq; Capnon Chelidonium.

Cum Leontopetalo autem tuberosis radicibus & quadrantenus foliis conuenire posse videtur: sed cauliculorum ala plurimæ, floresq; Anemones in radice caua desiderata, discrimen adferunt. Leontopetali etenim caulis ramosus in alas multas diuiditur, flos verò qualis Anemones, ut quidẽ Dioscorides & Plinius referunt.

ERIPHION autem si vtriq; ἀπὸ τῶν &, id est, à Vere nomen habet, ἐρίφιον aut citius ἡρίφιον, Verisq; planta non improprie hac radix nuncupari poterit. Verus siquidem tempore tantummodo apparet ac viret. Sed tamen ἐρίφιον ab hædo dictum eà propter non est. Eriphion siquidem istud, longè aliud est: ut quidem describitur, tum ab Apuleio, cum in libro ad Paternianum Galeno attributo.

Apuleius

Apuleius, Eriphion, ait, nascitur in Gallia, in monte Eriphion.
 Soracti: figuram habet Apij. florē purpureo similem: nascitur septem radicibus totidemq; ramulis; ipsa autem patula humo omni florens tempore, semen habet tanquam faba.

In libro autem ad Paternianum hæc verba leguntur: Eriphion herba est, quæ in summis montibus inuenitur: folia habet similia Apio, & thyrsum oblongum, in cuius summo flosculum quasi violaceum, & semen in medio: radicem quoque ad magnitudinem & valetudinē cepæ oblongæ. habet & radices alias, quæ radículas alias è radicibus emittunt, nigro cortice vestitas. Ex quibus manifestū, radicem hanc nequaquam huiuscemodi Eriphion esse.

De Thesio seu Θήσιον. pauca apud veteres extāt. Theophrastus radicem eius amarā esse, & tūsā aluum purgare ait. Plinius lib. XXI. cap. xvi. radicem quæ Thesium appellatur, bulbosis non dissimilem, et gustu asperam refert.

Athenæus Timachidam citans auctorem Thesium florem tradit, ex quo Ariadnes corona composita fuit. Conuenire hæc satis radici caue apparent. tuberosa siquidem radix, gustu non absq; amarore austera, quæ ad purgationes facere creditur. Sed in tanta veterum breuitate quid affirmandum?

Capnos chelidonia, quæ iuxta sepes enascitur, atq; hinc Capnos chelidonia.
 Capnos cognominatur, qualis sit, Aelius nō exponit. solum nomen eius reperitur Tetrab. II. lib. III. cap. CX. in Collyrio Martiani; & Tetrab. III. lib. II. cap. primo, inter calfacientia & firmitatem iecinori conferentia.

Quod si autem Capnos chelidonia illa est, quæ à Plinio lib. XXV. cap. XII. prima Capnos nominatur, & ad oculorum caligines commendatur, satis manifestum Cavaam

radicem non esse Capnon chelidonium. Prima etenim Plinij Capnos ramosa est, & vicinis sepimentis sese implicat: Caua verò radix ramulis adnatus caret, humiliq; nullis sustinetur neq; eget adminiculis.

Si autem alia est, Aetij Capnos chelidonia, quàm Plinij (quod fortasse Chelidonia cognominatio innuit) non citra aliquam occasionem Capnos chelidonia appellari potest. Fumariam etenim folius, tametsi maioribus, aliquatenus refert: & Vere quidem primo, circa videlicet *Χελιδων*, id est, hirundinum aduentum. Sed tamen idcirco veram & legitimam Capnon chelidonium esse non consequitur. Sunt siquidem & alia eodem tempore prodeuntes, breuiq; post pereuntes, quæ tamen Chelidonia non appellantur.

Ceterum Caua radix calida & sicca potentia est, magis tamen sicca quàm calida: utpote tertio resiccans, secundo verò ordine excalfaciens. adstringit autem & abstergit, nonnihilq; digerit. utilis ad veteres diuturnosq; tonsillarum fauciumve tumores. valet etiam aduersus hæmorrhoidum cum tumore dolores cum vnguento ex populo nigra, aut alio simili facultate permixta. Ferunt & hanc drachma vnus pondo sumptam aluum ducere, pituitamq; detrahere.

DE ARO.

CAP. V.

ARO folia aliquot sunt magna lenia, splendentia, lata, acuminata, hedera foliis multò ampliora, nigricantibus nonnullis lituris veluti suggillata. scapus inter hæc exit semissem altus, purpureis nonnullis punctulis subinde notatus, inuolucrum proferens oblongum, patens, leporina auricula



Arum maculatum, L.
Drd. pump. 329

Arum colocasia.
Bot. pump. 328



auricula amulum, è medio cuius pistillo simile assurgit; membrana in purpura nigricante liuenteq; coniectū, qua tandem rimas faciente decidenteq; vna apparet, ex acinis pulchrè per maturitatem rubemibus & succosis. semen in his vnum aut alterum, exiguum, duriusculum. radix tuberosa, magnitudine maioris oliuæ aut exigui bulbi, candida, carnosâ, fibris nō carens; multis quibus se propagat adnatis exiguis veluti bulbulis.

Nascitur Arum in syluis, iuxta urbium fossas, sub sepi-
bus, locis vbique vmbrosis: & quibusdā locis maius, aliis minus ac omnino paruum reperitur.

Eruuntur mox post Hyemem folia: pistillus verò è vagina Iunio exit; foliis marcescentibus: quibus corruptis vna Iulio & Augusto maturantur.

Exit & in Aegypto Arum, sed ab Europæo diuersum; maius videlicet, & latioribus foliis, quod plerique perperā Colocasiam appellant.

Arum à Græcis ἄρον nominatur: ab officinis Iarus, & Barba Aron; ab aliis Pes vituli; à Syris Lupha: à Cypriis Colocasia: vt inter nothas voces; vbi & ὄλιμ & ἀκοντία appellari reperitur. Testatur Plinius lib. xxiiii. cap. xvi. Aron magnæ cum Dracontio litis esse, & quosdam eandem dixisse. Nonnulli Serpentariam minorē vocant. Germani Pfaffen pint & Teutschen iugbeer: Itali Gigaro: Hispani Taro: Belgæ Calfsboet: Galli Pied de veau.

Ceterum Ari vires pro regionum varietate differunt. Nam, vt Galenus in lib. de aliment. facult. tradit, huius radix in quibusdam regionibus acrior prouenit, vt propè ad Dracontij accedat. Cyrenis contrā minimè medicamēt-
osum est Arum aut acre: adeò vt & Rapis vtilius reputetur. Et tale in cibo est præstantius.

Si quis autem humores crassos vel lentos in thorace aut pulmonibus collectos, tussi expurgari velit, acrius ac medicamentosius magis conueniet. Acrius autem est in Italia, Germania, Gallia, Belgio, & in Asia quoque, Galeno teste: Estur verò in aqua elixum; sed dum ipsa radix coquitur effusa priore aqua, in aliam calidam conicere ipsam conuenit.

Terrena autem ipsum Arum essentia constat, ut in lib. de simplicium medicamentorum facult. Galenus ait, sed calida: proinde extergendi vim possidet, verum non valentem, sicut Dracontion. Est itaque in exiccando & calefaciendo primi ordinis. Radices eius maximè sunt utiles: siquidem comesa crassitiem humorum mediocriter incidunt; adeò ut & excretionibus ex pectore idonea sint: sed magis tamen aptum est Dracontium.

Dioscorides folia etiam ad esum condiri, & arida per se decocta mandi refert: item radicem priuatim ex fumo bubulo illitam podagricis prodesse.

Vrsi post quadraginta dierum latebras & ab omni cibo abstinentiam, exeuntes Arum edunt: cuius natura ventosa intestinum diducit dilatatque; & facultatem recipiendi cibi adfert. Abstinentia siquidem tanti temporis intestinū eatenus lupi adducitur, ut propemodum cohereat: ut quidem Aristoteles, Aelianus, Plutarchus, Plinius & alij scribunt.

DE DRACONTIO.

CAP. VI.

DRACONTIA duo sunt: vnum maius, alterum minus: & prater tertium quidem, quod aquatilibus locis gignitur.

MAIUS siue magnum Dracontium caule assurgit recto, sesquicubitali aut altiore, crasso, tereti, leui versicoloribus



Dracontium draconis, L.
Dod. pempt. 329

loribus lituris veluti serpentum maculis resperso. folia magna & ampla sunt, è senis, septenis pluribúsve simul ordinatè coniunctis; quorum singula oblonga sunt & angusta; acutirumicis foliis satis similia, at lævia & glabra. è scapi fastigio vagina exit oblonga et quàm Ari maior, foris herbacei, interius verò in punico colore vnà cum pistillo suo nigricante; qui longus, crassus, & cornu modo in acumen fastigiatus; cuius, seminis incremento, distenta disilienteq; membrana, fructus racemosus vix instar patet, primum virentibus, deinde rubentibus succiq; plenis baccis factus: in quibus semen duriusculum. radix subest perennis, crassa, bulbo similis, candida, tenui cortice induta, mediocris subinde mali magnitudine, multis candidis capillamentis fibrata; adherentibus quoq; non raro exiguis aliquot bulbis, quibus multiplicatur.

MINVS Dracontium, foliis, inuolucro siue vagina, pistillo, vnaq; Aro simile est; foliis tamen non nigris, sed albicantibus maculis respersa. quæ nõ ita citò vti Ari pereunt, sed vnà cum vuis in Hyemem vsq; perdurant. acini quoq; minus saturato, scil ad croci inclinante colore rubent. radix non absimilis Ari, candida, & bulbi specie, fibras habet adherentes, exiguaq; nouarum stirpium rudimenta.

Locis vmbrosis, in calidioribus præsertim regionibus, vtrumq; Dracontium reperitur. Maius Germaniæ & Belgij satis familiare: sed minus rarius est.

Floret vtrumq; vnà cum Aro aut aliquanto serius; vna Augusto perficiuntur.

Græci δρακόντιον & δρακοντίαν, Latini quandoq; Draconticulum appellant.

Et quod maius est, recentiorum pleriq; Serpentinam maiorem nuncupant: alij Bisariam: nonnulli Colubrinam: Cordus Draconticulum polyphyllon & Loph cristum: Germani

mani Schlangēkraut/dzachēwurt; Brabanti Speer-
worte: Galli Serpenteaire: Itali Dragontea; Hispani Ta-
ragontia. In censu notharum vocum etiam ἄρον, ἵπαρον,
ἱάρον, ἱερῶνα & βίαρον, ἀρμυρίον, κύπερις, sauriaria, &
figingiaria, dicta etiam reperitur.

Matthioli hunc Dracunculum minorem facit, & aliū
quendam pro maiore pingit; qui, si in rerum natura est, Bi-
storte species videtur. Occasionem dedisse potuit vox ἀν-
τεμπεκόνευα, pro qua, sibi inuicem implicata, Matthio-
lus, & ante eū Marcellus Vergilius reddidit. Nam Dra-
cunculi huius folia λαπαδοειδῆ ἀντεμπεκόνευα Diosco-
rides describit. Sed ἀντεμπεκόνευα dicuntur connexa &
coherentia. ἀντεμπεκόνειδ' siquidē connexio est. Et talia qui-
dem huius Dracunculi folia, quae pluribus lapathi simili-
bus, ut diximus, connexis constant & coherentibus.

Dracontiam minus, sunt qui Arum alterum, aut Arū
minus vocent: Cordus Dracunculum henicophyllum, &
Luph planum. potest etiam Serpentina ac Colubrina mi-
nor nominari. officinis autem iste non est cognitus.

Apuleius Dracontion draconteam appellat, & multa
eius peregrina adfert nomina, quae an maiori vel minori
aut virg, conveniant, non explicatur: ut Pythion, As-
clepias, anchomanes, sauchromaton, aut sauromaton, the-
rion, Schoenos, Dercadion, Typhonion, Crocodilion, The-
riophonon, Eminion.

Athenaeus Aroniam nuncupari Dracūculum etiam re-
fert. & non improprie minor, ἀρώια dici potest; cum sit
Aro similis.

Ceterum viribus Dracontion quiddam Aro persimile,
ut Galenus ait, obtinet, tum foliis, tum radice, illo tamen
acrius & amarius: ac proinde excelsatorium magis re-
nuiorumq; partium. Obtinet etiam leuculam quandam
C adstri-

adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acri scilicet & amara, coniuncta est, medicamentum factum est utriusque maxime efficax.

Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum & lentos humores extenuans. Optimumque remedium est continuatum ulcerum, quæ ægredi nuncupantur. Expurgat extergitque, strenuè tum alia quæ extersionem desiderant, tum albos cum aceto.

Folia quoque, utpote similem facultatem habentia, ulceribus, vulneribusque recens insiliētis accommodata sunt; & quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nā quæ sicciora, viribus sunt acrioribus, quàm ut vulneribus conueniant. Creditum est, casum humidum, si illis foliis repositus reponatur, ob temperaturæ illorum siccitatem, à putredine conservari.

Fructus valentior est, non foliis tantum sed & radice: proinde & cancos & polypos eliquare creditus est. Succus quoque eius oculorum vitia expurgat.

Præter hæc autem Dioscorides, ferri narrat, à viperis non ferri eos, qui folia aut radicem manibus affricuerint.

Plinius Dracunculum habentem serpentes fugere etiā scribit. Et hæc quidē de utroque Dracunculo in duobus Dioscoridis capitibus leguntur.

Memini autem Dracunculi Galenus etiam in lib. de aliment. facult. ubi Dracunculi radicem bis terve elixam, quod omnem exuat medicamentosam vim, in cibo, ait, interdum Ari modo exhiberi, cum crassi ac glutinosi thoracis pulmonemque infestantes humores sortiore vi expellendi veniant.

Dioscorides verò minoris Dracunculi radicem refert, tū coctam tum assatam cum melle, aut per se in cibo acceptā humores in thorace hærentes ad educationē faciles efficere.

Calla palustris, L.
ord. prim. 331



DE DRACUNCULO AQUATILI.

CAP. VII.

AQUATILI dracunculo non rotunda bulbi specie, sed prelonga, repens & geniculata, mediocrisq; crassitudinis est radix; è cuius geniculis foliorum pediculi assurgunt teretes, glabri, intus fungosi; deorsum verò candida & tenues aliquot demittuntur fibra. Fructus in breui pediculo supra, atque vnà cum vno foliorum prodit, initio quidem exiguis candidusq; staminibus (quæ pro flore sunt) circumdatus. excrescit inde in racemum, primum viridem, cùm maturuit, rubentem, Ari vna minorem, at nō minùs acrē. folia lata sunt, virentia, glabra, leuiaq; hederaceis conformia, sed tamen minora quàm Ari. illud verò cui racemosus fructus connascitur, etiam minus est, ac parte eū versus, superiorem nempe, candidum.

Nascitur Dracunculus iste in vliginosis palustribusq; locis, in ipsis frequentissimè paludibus ac resediis aquis. in Germania ac Belgio non infrequens. Autumno vix maturantur.

Dracunculus aquaticus & palustris non abs re nominatur; à nonnullis Arum palustre; perperam verò Hydroperi rubens dicitur: Germanis Wasser scylangē kraut, id est, nostrate dialecto, Water slangen crupt.

Describitur autē Dracontion istud à Plin. lib. XXI I I. cap. xvi. & tertia eius species est. quam demonstratam ait, folio maiore quàm cornu; radice arundinacea, toridè, vt affirmabant, geniculatā nōdis quot haberet annos, toridemq; esse folia. Conuenit foliorum forma & magnitudo, radicūq; effigies. sed an tot annos quot geniculi habeat, explorandum.

Facultas autem huius Dracunculi, aliorum atq; ipsius
Ari

Ari similis est, sed tamen minus potens minusq₃ efficax videtur.

DE ARISARO.

CAP. VIII.

DVPLEX Arisarum est, vnum latifolium, alterum angustioris folij: vt nostra posterior etas obseruat.

LATIFOLIUM Arisarum folio est hedcraceo, lato, & acuminato, sed multo quàm Ari minori. cauliculus eius tenuis & exilis est: vagina siue inuolucrum paruum: pistillus exiguus, in nigro purpurascens. vna matura rubet. acini minuti. radix candida, forma Ari sed minor.

SECUNDO Arisaro quina, sena, pluræue sunt oblonga & angusta folia, læuia quoque ac splendentia. vagina siue inuolucrum angustum & oblongum. pistillus, qui ex eo prodit, tenuis et longus, iunci crassioris modo, in purpura simul cum parte vagina interiore nigricans; ad quem tandem inferius iuxta terræ superficiem ac subinde profundius, aliquot perpauca acini in exiguam vnam conformantur; initio vt aliorum virentes, dein rubentes. radix globosa & candida, veluti prioris.

Peregrinum vtrumq₃ Belgio ac Germania. sed primū in Italia ac præsertim Tuscia quibusdam locis: alterū circa Romam, ac in Dalmatia, Aloisio Anguillara teste, reperitur.


Flores & fructus vtriusq₃ eodem quo Ari & Dracontij tempore perficiuntur.

Atque primum horum Dioscorides ἀρίσαρον appellat, & Plinio autem ἀρίς dicitur. lib. siquidē XXI III. cap. XVI.

Est & Aris, ait, quæ in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tantum, minoribusq₃ folijs, & viiq₃ radice, quæ ta-

Arum arisaema, L.
Bot. Kemp. 332.





Arisaema angustifolium, L.
 Herb. frons. 332.

men olea magnitudinē implet. Alterum Arisarum ignorasse veteres existimantur. Esse autem Arisari speciem floris, fructus, radicūq; forma & qualitas ostendunt.

At potētia ac facultate Arisarum Aro simile est: acrius tamen, vt Galenus ait. Nomas imposita radix sistit: sunt ex ea collyria ad fistulas efficacia. corrumpit eadem genitale cuiusvis animantis imposita: auctor Dioscorides.

DE BISTORTA.

CAP. IX.


FOLIA Bistorta in longiusculis pediculis promit oblonga, lata & acuminata Lapathi similia, verū venosa, & supernè quidem virentia, inferius verò in caſſio colore candicantia: inter quæ mediū exeunt caules pede altiores, rotundi, minoribus aliquot foliis circumvestiti; spica in fastigio exiguis flosculis è dilutiore rubore purpurascēte; semina in qua tandem triangularia, splendētia, veluti oxalidis. radix subest crassa, oblongior, geniculata, nonnunquam retorta, multis fibris capillata, foris nigricans, interiore verò pulpa non intensè rubescens, gustu adstringens.

Fuchsius duas huius species facit: vnam foliis rugosioribus, aliam lauioribus: & radice hanc magis in se contorta; illam verò maiore & minus complicata, multumq; fibrosa.

Reperitur Bistorta locis humentibus, in opacis syluis, pingui ac lutoſo solo. Matthioli in montibus exire refert. Adoleſcit etiam feliciter in hortis. perenni radice nititur.

Maior ac Iunio flores spicati vigent: semen postea matureſcit.

Ab intortis et conuolutis radicibus nomen Bistorta habet. Germani *Paterwurtz*, Belga *Hertstonghe*, Galli *Bistorte*



Polygonum bistorta, L.
Ord. frug. 353

Bistorte appellant. *Colubrina* & *serpentaria* à Germanica voce etiam dicitur: & à quibusdam *Dracunculus*. Sed à *Dioscoridis* *Dracōtio* multum differt. *Plinianorum* autem *Dracunculorum* aliqua fortasse species est. *Plinius* siquidem lib. *xxi* *iii* cap. *xvi*. id quod *Græci* *Dracontion* vocant, triplici sibi effigie demonstratum refert: foliis beta, non sine thyrso, flore purpureo: alios radice longa, signata articulosq; monstrasse: tertiam demonstrationem fuisse folio maiore quàm cornus, radice arundinacea. Deinde infra, lib. *xxv* cap. *ii*. in agro hospitis repertum ait, *Dracunculum* appellatum, caule pollicari crassitudine, versicoloribus viperarum maculis, quem ferebant contra omnium morsus esse remedium.

Atque primus horum *Dracunculorum* *Aro*, auctore ipso *Plinio*, similis est. Tertium aquatilem esse paulo antè scripsimus. Posterior, *Dracontion* maius *Dioscoridis* esse videtur. & *Plinius* huic à reliquis tribus differentem etiam ostendit. Alius est, inquit lib. *xxv*. cap. *ii*. quàm nos in priore volumine eiusdem nominis diximus; sed huic alia figura. Superest secundus *Dracunculus*, qui si idem est cum eo, cui cap. *xvi*. lib. *xxi* *iii*. statim initio, radicem tradit esse subrutilam & draconis conuoluti modo, multum cum *Bistorta* conuenit. Nam *Bistorta* radix intorta & conuoluta est; ac colore, quem subrutilum dicere liceat. Est eadem & veluti geniculis articulata, vt secundi *Dracontij*. quod coniecturam & suspensionem auget.

Sunt tamen ex recentioribus, qui *Bistortam* omnino aliam esse volunt. *Matthiolus* siquidem in epistolis medicinalibus *Behen rubrum* esse scribit. *Gesnerus* ad *Limonium* refert. aliis placet *Britannicam* esse.

Behen.

Sed *Behen* tam rubrum quàm album (duplex etenim est) radices sunt odorata, potentia calida, ad venerea facientes,

cientes: ut Auicenna & Serapio memoria prodiderunt. Bistorta verò radix odore caret, refrigerās, adstringēs q̄, venereis aduersatur.

Limonium autē folia habet, Dioscoride teste, Beta tenuiora & longiora, semenq̄ rubrum. Cōtrā Bistortae minora durioraq̄ sunt folia, & semen oxalidis. Limonium.

Britannica verò folio est Lapathi nigriore & hirsutior, radice tenui & breui; Dioscoride & Plinio auctoribus. Britannica. Bistorta lenia folia, & inferna parte candidula, radixq̄ multo maior quàm tenuis ac brevis appellanda sit. Iam & Britannica succum & folia in Hyemē reponenda Apuleius suadet; causam addens, quòd non sen per appareat. At Bistorta viuax radice est, & nullo non anni tempore reperiri potest. Quae Bistortam & ab Arabum Beben, & à Dioscoridis Limonio, nec non à Britannica differentem esse satis manifestè ostendunt.


At facultate Bistorta frigida, & cum resiccatione validè adstringens. Radix menses & vndeque profluentem sanguinem supprimit; aluum sistit; vomitum compescit; dysenterijs medetur, quouis modo assumpta. Tonsillarum, faucium et oris inflammationibus succurrit; gingiuas firmat decocto aut succo eius ore colluto. Idem possunt folia & semen, sed tamen minus efficaciter.

DE BOLBOCASTANO.

CAP. X.

BOLBOCASTANO folia sunt tenuia, dissecta, atque diuisa, apij tenuiora ac minora, Crithmi aut potius Anethi similia. cauliculus tenuis & dodrantalis: slosculi parui in umbellis candicantes: semen non magnum, oblongum, angustius quàm fœniculi, odoratum, obsoleto Cymini colore

Scilla bulbocastanum, Lf.
Vod. park 384.



colore nigricans. radix rotunda, exigui rapi forma, foris nigra, & vbi inaruerit rugosa, intus pulpa candida, sapore inter castaneam & pastinacam medio.

In aruis & agris nonnullis Zelandiæ ac Hollandiæ Bolbocastanon reperitur: item & in Græcia, Chio ac Rhodo, auctore Guilandino. Fertur & in Britannia siue Anglia prouenire. Nec destituitur eo quoq; Germania, si non fallimur. Nam radices quas ad Rhenum Moguntia in aruis & hortis inueniri Lonicerus tradit, Bolbocastani sunt, non autem, vt ipse opinatur, Ornithogali. Scribit autem has esse rotundas, castanearum magnitudine, pullo extrinsecus cortice, intus carne cãdida, gustu dulci, crudas coctasq; in aqua edi: cauliculum esse singularem tenerum, ab imo nudum, folia cunini, flores in umbellis veluti Anethi. quale Bolbocastanum esse iam diximus.

Vigent Bolbocastani flores Iunio: semen postea ad perfectionem venit.

Meminit Βολβοκάστανος Alexander Trallianus lib. VII. inter ea, quæ purulentis vtilia sunt, cibaria ipsum referens. Guinterius dictionem existimauit corruptam, legẽdumq; esse Βαλαρονάσανον: sed tam peregrina hæc vox est, quàm Βολβοκάστανον.

Βολβοκάστανον autem à forma bulbi & sapore castaneæ nomen inuenit suum. Nostra ætate plerique ἀγροκάστανον nuncupant: Zelandi Elepn cerdnoten: Germani Elepn cerdnus;.

Est autem Bolbocastani radix moderatè calida & sicca, simul & adstringens: semen verò calidius & siccus. Editur illa: cruda, sed suauius cocta: sanguinem spuentibus & mingentibus utilis.

Semen aperiendi vi præditum, & διερρηκτὸν esse videtur.



Centaurea Centaureoides, L.
Ord. Prim. 354



Cent. magn. 33

DE CENTAVRIO, ET PRIMUM
DE MAIORE.
CAP. XI.

DVPLEX Centaurium, Dioscoride auctore; *Maivs* & *Minus*, quæ & forma, & magnitudine multum à se inuicem differunt.

MAIUS siue magnum Centaurium caules edit rotundos, teretes, duorum aut trium cubitorum: folia oblonga, in plures quasi particulas diuisa, iuglandis folijs eâ propter quasi conformia, sed ambitu crenato. flores capillacei ac staminei in diluto ceruleo purpurascent, & in ramulorum fastigijs è capitulis emicant squamosis, rotundis aliquantulum turbinatis; in quibus vnâ cum lanosis pappis semina oblonga, glabra, splendentia. radix subest longa, carnosâ, crassâ, fragilis, foris nigricans, interius rubescens, succo sanguinei coloris prægnans, cum dulcedine & adstrictione nonnihil mordax.

HVIUS verò & alia reperitur species, folio non dissecto, verùm Lappathi modo, longo, lato, simplici atq; indiviso, per ambitum tamen serrato: caule breuiore: floribus, semine, radice priori conformis. Atque huius Centaurij maioris meminit auctor (qui Galenus fertur) libri de virtutibus Centaurij ad Papiam, Crateuam adducens testẽ, in libro eorum quæ effodiuntur. Vbi duæ Centaurij species referuntur, maior & minor: ac maior folijs describitur Lappathi. Sed verba ipsa adferamus, quæ sic habent: Vnũ (videlicet Centaurium) folia habet sicut Lappathum hortense minora tamen, in circuitu verò scissa veluti serra; caulem verò trium palmorum; succum rubrum; in summitate caput laminiginosum; radicem verò solidam & crassam.

Latum ac pingue solum maius amat Centaurium, ac
colles

colles herbosos apricos. Copiosissimum, inquit Dioscorides, in Lycia, Peloponneso, Arcadia, Helide, Messenia, pluribusq; circa Pholoen, Lyciam ac Smyrnam locis. Reperitur & in Apulia Gargano, nec non in Baldo agri Veronensis monte, sed quod in Baldo monte, ut Matthiolus scribit, Apulo cedit. Simplicis folij Centaurium maius Hispania mittit, atque hinc aduecta Antuerpiam radices, terraeq; commissae subinde in hortis reforescunt.

Aestate huiusmodi Centauria florent; radices autem Autumno legi expedit.

A Chirone Centauro inuentore *κενταύριον* nomen habet. plerique Centauream vocant.

Quod maius est, Graeci *κενταύριον τὸ μέγα* appellant: Theophrastus etiam Centaurida. In officinis nonnullis perperam Rha ponticum dicitur. Rha ponticum siquidem Rha est in Ponti regionibus natum, stirps à Centaurio maiore diuersa. Extant porro & alia huius nomina, inter nothas & ascriptitias voces; tum & apud Apuleium, quarum nonnullae ad Centaurium minus pertinere videntur, ut sunt, *ναρκή, μαρώνη ἢ μαρώνιον, νέασιον, λιμνήστον, λιμνήσις, πλεκτρονία ἢ πηλητρώνιος, χειρωνία, αἶμα ἢ ρακλέας*. vnesera, fel terrae, Polyhydion ἢ *μερώτον*.

At Theophrastus & Plinius, Centaurium istud maius, tum & minus, de quo capite mox sequente, inter Panacis genera referunt. Prater enim Syriacum Panaces, de quo vterque seorsum agit, deinde & prater alia tria, quae à Dioscoride quoque describuntur, & duo reliqua superesse ostendunt. Et Theophrastus quidem lib. ix. vnum *πλάτυφυλλον* sine latioris folij: alterum *λεπτόφυλλον*, hoc est, tenuis folij esse ait. Quae Theophrasti verba ipse Plinius reddens à Chirone Centauro reperta, & Centauria cognominata, lib. xxv. cap. iiii. scribit, idem quoque cap. vi.

Mo. Bot. Garden, D affir-

affirmans; vbi vtrumque Centaurium latius explicans, à Chirone repertum repetit; atque inde Chironium vocari addit. Sed Plinium ipsum audiamus:

Quartum, cap. 1111. inquit, genus Panaces ab eodem Chirone repertum Centauriū cognominatur, sed et Pharnaceon in controuersiam inuentionis à Pharnace Rege deductum. Et paulo post:

Huius generis fecere duo, alterū latioris (exemplaria plerag, leuioris perperam habent) folij: alterum tenuioris. Cap. verò v1. Cētaurca curatus dicitur Chiron cūm Her- culis excepti hospitio, pertractanti arma sagitta excidisset in pedem, quare aliqui Chironion vocant. folia sunt lata, longa, serrato ambitu, &c. Et mox infra:

Est & alterum Centaurium cognomine λεπτορ minutis folijs, quod aliqui Libadion vocant.

Ex his apparet, Centaurium vtrumque inter Panacis genera relatum; & maius Centaurium esse quarti generis ματούραλλον, siue Latifolium Panaces.

Ceterum quod ad facultates attinet: Centaurij magni radix (Galenus scribit) sicuti gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus præstat. Secundum omnium autem qualitatum actionem ruptis, conuulsis, dyspnœa & inueterata tussi conuenit.

Hac eadem & plura quoque Dioscorides tradit. Conuenit, inquit, radix ruptis, conuulsis, spirandi difficultati, veteri tussi, sanguinem expuentibus, non febrientibus cum vino, febricitantibus cum aqua drachmarum duarū pondere exhibita: item & ad tormina, ac ad vteri dolores. Ducit etiam menses ac sœtus collyrij forma vtero imposita. Est & vulneribus idonea, recens tussa, aut arida prius madefacta contusaq;. coniungit etenim ea, ac glutinat. Quin & carnes coalescunt, si contusa simul decoquantur.

Eadem,

Eadem, quæ radix, Galenus ait, & succus ipsius efficit;
quo & vice Lycij vtuntur.

DE CENTAVRIO MINORI.

CAP. XII.

EXIGUA herba minus est Centaurium. cauliculo
assurgit anguloso semipedem aut dodrantem alto: foliis
Hyperici nostratis forma et magnitudine. flores in summis
virgulis è punico colore in purpura rubet, Lychnidis sativæ
floribus minores, qui interdum & exorto sole patent, sub
vesperam verò recluduntur. Siliquæ sequuntur exiguæ &
oblongæ grano tritici similes, in quibus semina minutissi-
ma. radix subest parua, dura, nullius usus.

Loca amat herbosa, aratro non proscissa, aliquantulū
sed tamen non omninò rigua. Est non modò in Italia pro-
uinciis, vcrum & in Germania ac Belgio abūdè frequens.

Iulio & Augusto vnà cum floribus ac siliquis legitur:


Istud genus Græci κενταύριον μικρον appellant: item et
λιμνήστον & λιμναϊον, quòd videlicet circa palustria nasca-
tur. Plinius Libadion ab eadem occasione (si integra lectio
est) ac propter summam amaritudinem; sel terra dici af-
firmat. Appellatur etiam, vt inter spurias voces reperitur,
ἐλλεβορίτης, ἀμάραντον, αἶμα ἡπατλέως, febrisugia, & mul-
tiradix.

Theophrastus & Plinius, vtī superiore capite ostendi-
mus, inter Panacis genera reposuere, inter quæ Panaces
est λεπτόφυλλον, id est, tenuifolium. Itali in Hetruria Bion-
della: Hispani Cintoria: Germani Tausentguldē kraut:
Belgæ Santorie & cleyn santorie: Galli Petite centau-
re appellant.

Habent autem huius Centaurij cauliculi superiores fo-

Centaurium Centaurea, L.

Dod. pempt. 336



lia floresq; vincentem qualitatem amarā, & temperaturam calidam & siccam ordine secundo Hepatis & fellicis, nec non lienis obstructions decocta in aqua & epota aperiunt. regio morbo medentur, diuturnis ac prorogatis febribus auxiliantur. ventris tineas & lumbricos interimunt. in summa abstergant, expurgant, crassiem humorum attenuant, ei quidquid amara possunt insigniter præstant.

Dioscorides, & post eum Galenus, bilem & crassa per aluum ducere; ischiadicisq; insundi Centaurij minoris decoctum referunt. Nos autem tametsi frequenter ac feliciter hoc vñ, per aluum tamen expurgationem vllam facere, obseruare non potuimus. Quamobrem nullā huic Centaurio miniori commouende aut expurganda alui vim ac potentiam adesse existimamus.

Reperitur verò hæc facultas in ea herba, quam vulgò Itali Stanca Cauallo vocant, alij Gratiolam. Quæ amaritudine Centaurio miniori nō cedit, atque eius species quædam videtur, ac non modò per inferiorem ventrem, sed et vomitione crassa & biliosa educit. Fieri autem potest, vt vires vtriusque inter se confuse sint, & descriptiones permixta. id quod ex ipsis Dioscoridis verbis quodammodo apparet.

Centaurium siquidem, scribit, mixus herba est Origani. aut Hyperici similis, solius Rutæ prælongis & parvis. At Centaurij nostri minoris folia non prælonga, sed rotundis modò, paulo longiora, veluti Hyperici sunt; Gratiola verò oblongiora sunt, & ad Polygoni accedentia; quod foliis Rutæ longioribus describitur.

Facit hæc quòd Helleborites vox inter spurias Centaurij minoris appellationes supersit. Centaurio siquidem minori nequaquam, sed Gratiola hæc optimè conuenit: vipore

qua Hellebori ferè modo, per superna expurget, vt cap. de Gratiola latius, suo loco.

Glutinat autem istud Centaurium etiam vulnera re-
tens virensq; tusum ac impositum : vetera vlcera expur-
gat & ad cicatricem perducit. Succus ad oculorum medi-
camenta vilis est: cum melle expurgat, quæ claritati eorū
officiunt. In pecto admotus factus & secundas educit. Po-
tus autem priuatim neruorum affectionibus conuenit. au-
ctor Dioscorides.

Optimum, inquit Galenus, succus etiam medicamen-
tum ad iecinoris obstructions solucendas, bonumq; lienī
indurato remedium foris impositum; nec secius si quis bi-
bere sustineat.

Succi autem colligendi extrahendiq; rationem, & li-
ber ad Papiam docet, & Dioscorides breuiter ostendit.

DE CYCLAMINO ORBICVLARI.

CAP. XIII.

PRÆTER Cyclaminum se vicinis fruticibus aut ad-
miniculis circumuoluentem, quem alterum Dioscorides
cognominat, sunt eius, qui orbiculari est radice, à recen-
tioribus aliquot obseruata species, & quidem foliis disse-
rentes.

I VNA ac prima Cyclaminos foliis vires latis, angulo-
sis ac hederae similibus, ambitu leniter serratis; superiore
parte in virore nigricantibus, albicantibus tamen maculis
variegata, & umbilico siue medio folij subalbido; inferiore
verdè ac prona parte purpurea; & subinde colore saturato,
aliàs dilutiore. flosculi ex tenellis pendent pediculus, deor-
sum nutantes; foliolis eorum sursum reflexis; & purpureo
viola nigra colore non tamē intenso splendent; odoris exi-
gui.



gui. succedunt capitula seminifera, in spiras pediculis contractis. radix bulbi aut rapi modo in orbem circumacta et aliquantulum in latitudinem pressa, foris nigricat, intus candida, rugas inarescens contrahit.

ALTERIVS ac secunda Cyclamini & lata quidem sunt, sed nequaquam angulosa, verum quasi rotunda, & nullis superius aut omnino obscurissimis apparentibus maculis; aturo colore virent; inferius verò è punicante purpura rubent. flores prioris similes, at odoratiore. radix aliquanto minor.

TERTIA species foliis similiter est haud angulosis, sed ambitu eorum aliquantulum crenato: maculata hac sunt, sed umbilico nigriore. flos intensiore colore purpurascit, odoris suavisimi. radix quàm aliarum minor.

Nascitur Cyclaminos locis umbrosis sub arboribus & in sylvis, in vepribus, Plinius ait. Et prior quidem harum in Veromanduorum, Verocassum ac Atrebatum sinibus; altera in Arduenna sylva, ac vicinis locis apud Belgas reperitur. Sunt Italia, Germania ac aliis regionibus communes. Tertia rarior est, sed tamen Italia non peregrina. Septembri ferè mense Cyclamini florent, folia inde noua succedunt, Hyeme virentia. semen sub aestatem sequentem ad maturitatem peruenit.

Κυκλάμινον Græci appellant: dicitur & κισσόφυλλοις, κυσάνθειον, χελώνειον, ἰχθυόειρον, χυλίμη: à Zoroastre τριμυαλίτης, ut inter nothas voces: item Tuber terræ, & Terræ rapum, à Marcello Orbicularis, ab Apuleio similiter Orbicularis & Palalia, Rapum porcinum, Terra malum; in officinis Cyclamen, Panis porcinus, Arthanita. Itali Pan porcino: Hispani nonnulli Maçam de porco: Germani Schweinbröt/erdtapffel: Belgæ Verckens broot/suezghen broot: Galli Pain de pourceau.

Colorem floris Plinius Colosinum appellat. Flos eius, inquit, Colosinus in coronas admittitur. Colosinus color.

Varias autem Cyclaminus, auctore Galeno, vires obtinet. Nam & extergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit, & discutit.

Succus eius hamorrhoidas aperit, & ad secessum prouocat in floccis appositus: medicamentis phymata, strumas, aliasq; durities digredientibus admiscetur: suffusis cum melle illitus competit; ad hæc quoque per nares expurgat: abdomine illito ventrem subducit, & scitum interimit: est & validum interimendo conceptui medicamentum in pessa additus.

Tota radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa vehemens sit. Nam & menses siue epota siue apposita enocat, & regio morbo prodest; non modò viscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem eiciens. Cutem extergit, cum in aliis, tum quòd alopecias, epheidas, omniaq; exanthemata curet. Lienem quoq; induratum iuuat imposita, cum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant.

Tradunt (vt præter hæc Dioscorides refert) si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Bibitur & in vino contra lethalia, & præsertim leporem marinum; & contra serpentum ictus imposita remedio est: immista vino ebrietatem facit. Decocto eius luxata. podagra, pernionesq; vtiliter fouentur. Cauata radix oleo expletur, & cineri feruenti imponitur, adiecto cera thyrrhenica modico vt strigmentosum fiat vnguentum pernionibus vtilissimum. Narratur & ad philtrea amatoria assumi contusa, & in pastillos efformata.

Cyperus rotundus L.
And. p. 338.
2.



DE CYPERO.

CAP. XIII.

CYPERI genera duo sunt: longioribus radicibus unum, alterum rotundioribus; & præter tertium quidem Dulcichinum appellatum. Indicus Cyperus inter aromata è longinquo allata referendus.

Veriq; autem Cypero, tam rotundioris quàm longioris radicis, folia sunt longa, gracilia, arundinacea, porraceis longiora, duriora, dorso eminente cultellata: caulis rectus, enodis, glaber, triangularis, rarissimè quadrangulus; in cacumine cuius foliola minuta, & iuba lata, laxa; panicula ex qua dependent semina exigua recondentes. Radices, vnius præloge, geniculata, graminis modo serpentes, sibiq; implicata, foris è punice colore nigricantes, interiore verò carne in subluteo albicantes, odore suavi, gustu subamaro: alterius verò nodosa sunt, è fibris aliquot coherentes, oblongioribus oliuis, ac non raro rotundioribus similes, odore & colore prioris. Sunt huius folia minora, & caules paulò breviores: illius verò maiora folia, & caules altiores.

Amat Cyperus palustria loca ac rigua. In Italia locis quibusdam spontè nascitur: & in aliis quoq; calidioribus Meridiem versus regionibus, vti in Syria, vbi & odoratiores ac præstantiores. In Germania tam superiore, quàm hac nostra inferiore non nisi satus reperitur, & qui longus præcipuè: nam rotundus perrarus est.

Sed Pseudocyperus graminis species, foliis Cypero & iuba similis, radice verò candida, tenui, longa, geniculata, omni odore & sapore, exceptis herbaceus, destituta, locis palustribus in Belgio satis frequens occurrit. — Antierp
Pseudocyperus.

Eminent Cyperi iuba Iunio, Iulio & Augusto. crescit

Græci modò κύπερον, modò κύπερον per diphthongum appel-

appellant; Latini Cypirum & Cyperum: Cornelius Celsus luncum quadratum: Plinius luncum angulosum, & luncum triangulare. Dicitur & ἐπιστῆκνῆρον καὶ ἀπαλάδων, atq; vt in Castiani Bassi Geoponicis à nōnullis ζέρον: Italici Cypero: Hispani luncia olorosa, & lunca cheyrosa: Germani Wilder galgan: nostris Wilden galigaen: Gallis Souchet. Officina Cyperi nomenclaturam retinent; & vnum Cyperum longum, alterum rotundum vocant.

Plinius Cyperi radicem, cum oblonga est, Cyperida dici ait.

Cyperī autem radices maximè vsui sunt: vt Galenus ait, excalescentes pariter & exsiccantes citra mordacitatem: Itaque vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittūt, mirificè prosunt. habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlceri item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, quia & calculo vexatis congruunt, & vrinam mensesq; promoucant.

Dioscorides malagmatis calfactoriis etiam misceri, & ad vnguentorum spissamenta accommodari esse addit.

DE DULCICHINO.

CAP. XV.

DULCICHINVM Cyperum rotundum refert. folia etenim eius arundinacea, oblonga, dorso eminente, triangula, Cyperinis similia; caulis angulosus et iuba similiter respondent; omnia tamen breuiora ac minora. à tenuibus radicum sibris, auellanis serè conformes, sed tamen aliquanto oblongiores, dependent globuli, veluti exigui bulbuli, specie articulati; colore exterius rufescente, interiore vero



Cyperus esculentus, L.
Bot. Europ. 340

verò carne candidi, sapore grato dulciq³, & castaneis proximo.

Colitur Dulcichinum plerisq³ Italiae locis. in fluminis Athesis feritur sabulosus; vt tradit Alexander Benedictus. In agro Veronensi vel spontè, Matthiolo teste, prouenit.

Autumno bulbuli leguntur, Vere seruntur in plures multiplicandi.

Stirpem ipsam nostra atas Dulcichinum, & radículas Trasos siue Tragos appellat, aut Trascos. Cyperi species est, sed dulcis, Theophrasto, vt satis apparet, non incognita. Libro siquidem de causis v. r. Cyperi radices inter dulces atq³, edules refert. Cyperi, inquit, radix dulcis, vt eorū quæ in fluminibus & paludibus proueniunt. Quod procul dubio, non de alio, quam de isto, accipi potest: aliorū siquidem Cyperorū radices amaricant & minimè edules sunt. Non desunt tamen, qui Trasos istos Arabum medicorum Hal alzelin siue granum zelin esse constanter existimāt; quod tamen veritati parum consentaneum. Nam Alzelin ab auctōribus Arabibus inter fructus siue grana communeratur, nequaquam autem inter radículas. Serapio siquidem cap. CCCXXVII. sic habet:

Hal alzelin.

Hal alzelin granum est pingue, Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album interiūs, & habet bonum saporem, et defertur ex terris Barbarie. Idem affirmat Auienna his verbis, cap. CCCIII:

Granum Alzelin quid est? granum eius est boni saporis, & oritur in partibus Herzur. Ex quibus; quod inter hoc discrimen, palam fit.

Ceterū Trasi in moderatè calefacientium ac humectantium sunt ordine. crudorum thoraci inhaerentium humorum concoctionem promouent; vrina acrimoniam obtundunt, præsertim in carnis iure macerati, inde triti ac succo

succo eorum extracto. genituram etiam adaugent, & ad venerea faciunt, flatus siquidem quodammodo gignunt; auctore Matthiolo. Vnà cum bellariis apud Veronenses inferuntur.

DE GLYCYRRHIZA, SIVE DVLCI
RADICE DIOSCORIDIS.
CAP. XVI.

VNIUS dulcis radice Dioscorides tantum meminit, præter hanc tamen & alia est vulgaris vsus, de qua capite sequente: hoc de Dioscoridis Glycyrrhiza.

Promit autem hæc sæpenumero caules complures altos & ramosos; folia circa quos oblonga, alata, ex multis sibi inuicem oppositis collecta, Lentisci foliorum figura, attamen maiora, viroris saturati, & tactu nonnihil glutinosa. flores è foliorum alis exeunt parui, cerulei atq; eius cuius non scriptus Hyacinthus coloris, in rotundi globuli formã commissi; quibus tandem emarcidis maior factus orbiculus, rotundam asperamq; Platani pilulam referre videtur; multis paruis subruffis, asperis & hirsutis siliquis constans, in quibus semen. Radix prælonga, crassa, & vnica est, brachij subinde longitudine ac crassitie, buxei luteive intus coloris, foris raro alterius, sed tamen quandoque nigricantis, gustu dulcis cum austeritate quadam.

Plurima, inquit Dioscorides, in Ponto & Cappadocia gignitur. Apud Belgas in hortis subinde videtur.

Flores Aestate, Autumno pilula cum siliquis perficiuntur. Vere herba regerminat, nouosq; caules producit; Hyeme siquidem cum caulibus folia intermoriuntur, radice interm. viuace.

Γλυκύρριζα à dulcedine Græci, Latini dulcem radicẽ
appel-

G. glabra, L.
 Bot. hump. 341



appellant. Sunt eius & alia nomina inter spuria, ut πεν-
κὴ ἀ Ποντο, γλυκῆραιον, γλυκύφυτον, σῦμφυτον, λεοντικὴ,
σκύδιον, ἄλιδον, συλίσρα, λίβυεσάτων, ὁμοιορόμοι, πεν-
δαύοι. Officinis & vulgò hæc incognita Glycyrrhi-
za est.

Huius fruticis natura, ut Galenus ait, familiaris est no-
stra temperatura, et cum adstrictio quedam adiuncta sit,
eius temperamentum quātum ex caliditate & adstrictio-
ne est, tepida potissimum caliditatis fuerit, quā proximè
accedens ad temperatum. porrò quoniam & dulcis, nini-
rum & modicè humida est.

Succus radicis, Dioscorides tradit, ad arterie exaspera-
tiones utilis est, quem lingue subditum eliquescere oportet.
prodest & ad ardorē stomachi, ad recinoris thoracisq;
vitia, vesicae scabiem, renumq; affectus cum passo potus. Si-
tim extinguit sub lingua eliquatus, vulneribus prodest il-
litus, commendacatus stomacho convenit.

Radicum recentium decoctum ad eadem facit. At ra-
dix arida leuissimè trita pterigis modissimè inspergitur.

Plinius Glycyrrhizam stomaticem esse, & oris ulceri-
bus inspergi, præter ea quæ Dioscorides, etiam refert.

DE VULGARI GLYCYRRHIZA.

CAP. XVII.

VULGARIS vsus Glycyrrhizæ caulibus folijsq;
priorem satis refert, sunt tamen folia virētiora maioraq;
cauliculi verò subinde teneriores. flores non in globulū aut
orbiculum collecti, sed in spicam veluti viciæ digeruntur,
exigui colore dilutè carulei, siliqua inde eodē ordine parue
succedunt, nequaquam aspera aut hirsuta, sed leues &
Lentium valvulis similes; in quibus semina parua. Radices
E tenues



G. glabra, L.
Desh. herb. 347

tenuēs & longæ sunt, ramosæ instar sarmentorum vitis, foris nigricantes, intus buxci coloris, quæ tam latè sub terra per transversum & obliquum repunt, vt vix tota erui queant, & plerisq; etiam locis progerminant.

Copiosa hæc in Germania, agro præsertim Padenbergensi, in Franconia dicta. frequens & in Hispania. Belgarum horti hæc non destituuntur. Theophrastus, & post eum Plinius, iuxta Meotidem paludem referunt nasci.

Rarius in Germania ac Belgio floret: ideoq; etiam sterilis à nonnullis, sed temerè, creditur; cum autem floret; sub finem floret astat. Inarescunt & huius folia caulesq; radice restibili viuacitate diuturna.

Glycyrrhizam hanc etiam esse palam est. Officina corrupta voce Liquiritiam vocant: Itali Regolitia: Hispani Regaliza & Regalitia: Germani Süßholz / süßwurtzel: Galli Riglice, rigolisse: nostri Callistiehout / suethout. Theophrastus σκυδάνη ρίζα, & vt ait, nonnulli εὐτυλόχεια appellat. Plinius Scythicam herbam. Et verè εὐτυλόχεια siue multum dulcis, hæc dici potest; est etenim omnino dulcissima, & quàm altera Glycyrrhiza dulcior. Scythice, à Scythiæ regione in qua gignitur, nominatur. Potest & hæc ἄλιον & citra aspirationem, & ἄλιν & propriissimè nuncupari: exiguo siquidē gustu famem & sitim præcipuè sedat.

Cæterum autem quandoquidem hæc radix dulcis est, temperatè quoque calida et humida est. Cortex eius amaritudinem quandam tamen habet, & calidioris qualitatē participat: sed hunc abradere oportet. humectat autem magis recens & succo plena radix, quàm arida.

Utilis est ad rauedines, tusses, difficilem respirationem, peripneumoniam, pleuriticidē, sanguinis purisq; sputationem, phthisim, & ad omnes thoracis morbos. exasperata

lenit; inflammationes sedat; acrimoniam & fæculaginem humorum mitigat contemperatq;: crudiores humores concoquit; & sputi exitum faciliorem promouet: vlcera expurgat in eclegmate vel alio quouis modo sumpta; aut aliquandiu mansa, succore sub lingua detento. Decoctum eius renibus ac vesica exulceratis confert: vrinae stillicidio medetur, ac in vniuersum omnibus malis occurrir, ab acris, falsis & mordacibus humoribus excitatis.

Hæc eadem de Scythica radice Theophrastus quoq; habet, qui hæc & Hippace, Scythas etiam dici refert; ad dies vndecim aut duodecim posse vinere; & quidem his verbis: Radix Scythica utilis ad anhelitus, et ad tussim siccam, atque in totum thoracis morbis: ad hæc vlceribus mederi potest cum melle: sitim quoq; extinguit si teneatur in ore. Qui de causa, ea & Hippace degere aiunt Scythas, dies vndecim aut duodecim.

Plinij error.

Hippace autem caseus est, vt Hippocrates testatur, ex equino lacte concretus. Plinius lib. xxv. cap. viii. perperam eius nominis herbam esse existimauit.

DE GENTIANA.

CAP. XVIII.

FOLIIS Gentiana vixet lata, longis & nervosis, veluti plantaginis, sed maioribus & veratri albi similibus. Scapi inter hæc surgunt, alti simpliciter, indurati, inanes, laues, geniculati, foliis è singulis geniculis binis, sensim imminutis: circumambientibus corona modo: superiorem partem ex interuallis floribus colore luteis, è senis angustis foliolis radiantis stella instar explicati; qui è calycibus exeunt oblongis, in quibus inde semen laue, latum, tenue, veluti Leucoij, colore subruffo sordens. Radix proluxa, crassa, quan-



G. bicolor L.
 Dist. franc. 342

quandoq₃ bifida aut trifida, lutei ac buxei coloris, gustu amarissima.

Locus gaudet vmbrosis, frequens in Italia, Illyrici, Germania, Galliaq₃ montibus.

Flores Aestate, semen Autumno non raro perficit.

Gentius Illyriorum rex inuentor nomen γεντιανῆ dedit, quod & officina seruant, Gentianam nuncupantes. Germani Gentian bitterwurtzel: Belgæ cum Italis, Hispanis & Gallis, Gentiane dicunt. Sunt & eius spuria quadā nomenclatura, quæ & apud Apuleium reperiuntur, vt χενταύρη & ρίζα, νεφρὴν, χερσάνιον ἀλοῖτης, Aloe gallica, Basilica, Cyminalis.

Locus: Dioscoridis restitutus.


Habet autem Gentiana radix calfactoriam, vt Dioscorides ait, & στυμλικὴν, id est abstergentem vim. (nonnulla exemplaria perperam στυμλικὴν.) Admodum efficax, auctore Galeno, est, cū opus extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, cū impensè amara sit.

Vtilis autem esse perhibetur conuulsis, ruptis, ex alto cadentibus, hepaticis & stomachicis: miscetur etiam antidoti, veluti Theriaca diateffaron: quam Aëtius Mysteriū appellat. Tanta huic vis est, ait Plinius, vt iumentis etiam non tuſſientibus modò, sed & illa quoq₃ trahentibus, auxilietur pota.

DE CRUCIATA, SIVE GENTIANA
minori, atque aliis quibusdam Gentianæ spurii generibus.

CAP. XIX.

CUM Gentiana cognitionem magnam & similitudinem nonnullam habet, à plerisq₃ nuncupata Crucjata, Caules eius rotundi sunt, geniculis distincti, inanes, dorantales,



Gentiana cruciata, L.
 Bot. Beech 343.
 Socn. hist. 248.

drantales, vel aliores. folia radicibus proxima, tum quæ circa caules geminata, Gentianæ similia, verum minora, crebroq; deorsum reflexa. flores carulei, oblōgi, intus caui, cauliculorum fastigia orbiculatim ambiunt, ab herbaceis calycibus exeuntes. radix candida, teres, & oblōga, subinde foraminosa, & plerunq; inter lapides sub terra iacentes descendens; gustu amarissima.

In collibus & montibus, nec non in aliis incultis & asperis locis reperitur, & in Germania quidem frequenter, Iulio mense in Belgij hortis floret.

Germani Modelgheer / Speerstück / & creut; wurtzel: Latine Cruciatam appellant. Gentiana speciem esse, & forma & facultas ostendunt; Gentiana minor idcirco nuncupari poterit. Nam & alia est Cruciata, decussatis foliolis, de qua inter Rubiæ affines agendum.

Sunt verò & qui hanc Chilitodynamin dici velint: sed Polemonia à Cappadocibus Chilitodynamis appellatur, auctor Dioscorides. Cum Polemonia autem ista Gentiana minorus species similitudinis habet nihil. -

2 HVIVS speciei & aliam Gesnerus ac Tragus perhibent: foliis Hirundinariæ siue Asclepiadis: floribus multis conferctis & eleganter caruleis, extrema Aestate vigentibus: radice multiplici vehementer amara, quæ locis montanis apud Heluetios, & alibi in Germania secus semitas apparet, ac Geseurt; & Schelmkraut appellatur à vulgo.

GENTIANÆ quoq; species est Campanula Autumnalis, quam Violam Calathianam ex Ruellij descriptione nuncupauimus, & Matthiolus in posterioribus commentariis Pettimborsam vocari ait: de qua nos in Florum historia scripsimus.

Ceterum omnes hæc amara & foliis & radicibus sunt; tempe-

temperiem calidam & siccam obtinent. Existimantur, & præsertim Cruciata, ad omnia ad quæ Gētiana vtilis: præstant autem quæcunque amara possunt.

DE HELENIO SIVE INVLA.

CAP. XX.

GRANDIA mox à radice folia promit Helenium, palmum aut semipedem lata, cubitum subinde longa, acuminata, Symphyti maioris serè conformia, sed mollia, tenuiq; lanugine pilosa, in virore candicante, & inferiore parte albidiora, ambitu leniter crenato. caulis tricubitalis, digito crassior, non absq; lanugine, in cacumine diuisus, in singulis verd adnatis flores magni, lati, rotundi; quorum non modò circum ambientia, oblonga foliola, verùm & medius latus est discus siue orbis, qui infinitis staminibus confarcitur, tandemq; in tennes soluitur pappos; quibus semen subest gracile & oblongum. radix inequalis, torosa, crassa & manum implens, haud longa, foris quandoq; nigricans, intus candida & carnosæ, odorata, gustu amaricans.

In pinguibus & latis nascitur pratis. reperitur quandoq; & in montibus, locis vmbrosis, at non omnino aridis. frequens non modò apud Belgas, verùm et alibi, vt in Italia, Gallia, Germania, &c.

Flores Iunio ac Iulio vigent. radices Autumno, & non rarò Aprili & Maio mensibus leguntur.

Quod Grecis ἐλένιον, Latinis Inula & Enula dicitur: officinis Enula campana: Germanis Alantwurtz: nostris Galandtwortel: Itali Enoa & Enola: Hispanis Raiz del alla Gallis Enule campane. Extant et inter notha hæc eius nomina: σύμφυτον, περσικὴ, μινδικὴ, ὀρεσείον, νεκτάρειον,

Inula helenium, L.
Bot. parisi. 324



καλωνία, φλόμ & ἰδαί & , Terminalium.

Præter autem istud Helenium, & aliud eiusdem nominis in Aegypto gigni Crateuam tradere Dioscorides asserit: et herbã esse cubitalibus ramulis, humi serpylli modo repentem; foliis circa ramulos multis, lenticula minoribus; radice lutea, digiti parui crassitudine, infernè tenui, supernè crassiore, cortice exterius nigro: nasci q̃ in collibus & vmbrosis locis.

Helenium Aegyptium.

De hoc Helenio etiam Plinius, lib. xxi. cap. x. sed tamẽ paulo aliter radicem siquidem candidam, & ramulos dodrantales refert. Plinij autem hæc verba: Helenium è lachrymis Helenæ dicitur natum, & ideo in insula Helena laudatissimum. Est autẽ frutex humi se spargens dodrantalibus ramulis: folia similia serpyllo. Deinde cap. xxi. ait, radicem eius intus candidam & dulcem.

Meminit & Helenij cuiusdam Theophrastus. suffruticem id esse lignosum, ait, coronarium, & ramis foliisq̃ ac tota sua natura odoratum. Existimatur autem istud idem cum Aegyptio.

Heleniũ Theophrasti.

Adfert & Helenium Apuleius, sed omnino ab Aegypto, tum etiam ab alio differens, ipsum videlicet Panaces Chironium, quod ait à Græcis ἐλένιον, & à Latinis Inulã campanam appellari. Sed Apuleium ipsum audiamus, cap. xcv. de Inula campana:

Helenium Apuleij.

Græci, scribit, Panacen Chironion: alij Panacen Centaurion: alij Helenion: Latini Inulam campanam appellat. Habet folia Amaraco similia, flores aurosos, radicem tenuem, non altam, acerrimam gustu. medetur serpente vexatis. Quæ descriptio planè cum Panacis Chironij apud Dioscoridem conuenit. Sed de hoc satis. ad Enulam campanam vulgarem regrediamur.

Panaces Chironium.

Est autem radix huius Inule ad multa maximè utilis,
natura

natura excalfactoria & refecans terio ordine: praesertim arida. Nam recens & adhuc succo plena, excrementitio redundat humore, qui calfaciendi ac reficcandi eius potentiam nonnihil obtundit.

Prodest aduersus respirandi difficultatem, orthopnoeam, veteremq; tussim, ad expurgandos siquidem crassos, lentos & pertinaces humores, qui in thorace & pulmonibus haerent, multam in eclegmate tum et condita potest, veluti & aliis modis, data. Ventriculo autem commoda & salubris radix condita est, à cena sumpta non modò concoctionem promouet, sed & aluum faciliorem reddit.

Pelli lumbricos & ventris tineas decocta succus, ut Plinius tradit: qui et eam à ieiuniis commanducatam dentes confirmare scribit, lib. xx. cap. v.

Miscetur Inula radix utiliter antidotis. Serpentū moribus auxiliatur: venenis resistit: ruptis ac conuulsis confert. Sunt etiam qui ipsis decoctis, tritis ac melli instar vnguenti permixtis, vetera vlcera expurgari atq; ad cicatricem perducere affirmant.

Galenus rubificari quoq; his partes diuturnis ac frigidis molestatas ait affectionibus; ut sunt nonnullae coxarum passionēs, ischiadas vocant, & exiguae assiduaq; articulo-
rum quorundā pra humiditate procidentiae ac luxationes.

DE POLYGONATO.

CAP. XXI.

POLYGONATON cauliculum emittit cubitalem tenuem, leuem, nullis ramis brachiatum, sed simplicem, foliis ex interuallis adornatum, latis, oblongis, Lauri satis similibus, leuioribus tamen tenuioribusq; latioribus aliquanto ac venosis. flores oblongi, intus caui, candicantes,
foliis



Polygonatum multiflorum
 Bot. temp. 345

foliis numerosiores. ab vnoquoq, enim folij sinu siue annexu, bini aut terni dependēt. fructus rotundi ochri magnitudine, nigricāte colore, maturi virent. radix oblonga candida, frequentibus veluti articulis nodosa, digitalis crassitudinis haudquaquam rectē descendit, sed per transversum obliquē progreditur.

In sylvis, locis vmbrosis, et iuxta margines nascitur, nec modò in montosis, sed & in planis.

- 2 Inuenitur huius & alia species, foliis è quonis exortu quaternis quinisve oblōgis, acuminatis, multo quā prioris angustioribus, lauibis & venosis. floribus in virore albicantibus: baccis rubenibus: radice similiter candida, nodosa, obliqua, tenuibus fibris capillata. In editis & montanis Hercinie sylua locis, Cordo teste, exis.

Maio ac Iunio vtriusq, flores; Augusto fructus colligi possunt.

Græci πολυγόνατον: Latini similiter Polygonatum; officina Sigillū Solomonis: Germani Weiswurtz; Galli Seau de Salomon. Hetrusci Frassinellam & Fraxinellam, alij geniculatam aut genichellam vocant. Ioannes Munardus Arabum Secacul existimat, sed veritatem minùs assequutus.

Secacul.

Secacul etenim noua stirps, & Arabum inuentum. Serapio siquidem in eius descriptione nullius Græci, nec etiā alterius auctoris testimonio niritur. qui aliās solet singula ad suos auctores, & veteres quidem referre.

At Polygonati radices mistam tum facultatem, tum qualitatem habere, Galenus ait. Habent enim, inquit, adstrictionis pariter & acrimonia quippiam, nec non fastidiosam quandam amaritudinem explicatu difficilem. quamobrem nec admodum sunt vsui.

Dioscorides radicem tradit vulneribus auxiliari impostam,

fitam, & vultus maculas delere ac auferre: Matthiolus è Polygonati radicibus aquam elici refert, qua ad faciem abstergendam mulieres Itala vtantur.

DE PYRETHRO:

CAP. XXII.

PYRETHRO folia sunt multipliciter dissecta diuisaq; similitudine fere foliorum faniculi, sed tamen minor, Dauci syluestris & Carotæ amula. cauliculi dodrantales, aut paulo altiores; in quorū fastigiis flos amplius, latus, Anthemidis similis, sed tamen maior, medio orbe subluteus; angustis oblongisq; circumambientibus foliolis, supina parte albicantibus, prona verò nonnihil purpurascens. semina inter disci siue orbis stamina, gignitur tenue & oblongum. radix digitalis fere est crassitudinis, longa, subrucco colore nigricans, gustu acri & admodum feruido.

Ex Orientis partibus infertur. Nasci in quibusdā Italia montibus, sed minùs acre, Matthiolus scribit: In Belgij hortis satum adolescit; & florem inclinante Aestate facit; quæ si feruens siccaq; fuerit, semen etiam perficit.

Græci πύρεθρον ab ignea qualitatis gustu nuncupant: item & πύρινον, πύρωτον, πύρωδρον & πυρίτην, pleriq; etiā δούκιον, vt inter ascriptitias nomenclaturas reperitur. Latini Saluarem: officina Græcam vocem retinent: Italij Pyrethro: Hispanij Pelitre aut Piletre: Gallis Pied d'Alexandre, id est, Pes Alexandrinus; Germanis ac nostratibus Bertram; à nonnullis Seyerwurtz.

Et legitimum quidem istud est Pyrethrum. Nā quod verum à nonnullis existimatur, alterius generis herba est, sub saxifragiæ nomine alibi describenda. Imposuit istis corrupta Dioscoridis lectio; in floris siquidem descriptione,

Dioscoridis locus emendatus.

exem-

Dioscoridis lo-
cus emendatus.

exemplaria pro ἀνίδου, perperam substitutam habent vo-
cem ἀνίδου.

Pyrethri autem radix vehementer calidam & vrentē facultatem habet, qua & refrigeratos ac dolentes dentes mitigat, et pituitam ex ore copiosam elicit. Manditur autem sicca, aut aceto in quo decocta fuerit os colkitur. Sudores etiam hæc mouet; & ad diurnos horrores efficax, cum oleo illinita: ad omnes etiam corporis partes perfrigeratas ac resolutas plurimum conducit: auctor Dioscorides.

Miscetur eadem vtiliter antidotus & alius compositio-
nibus, quæ ad diurnos capitis dolores, vertigines, apo-
plexiam, comitalem morbum, nervorum tremores, reso-
lutionesq; faciunt. conducit etenim plurimum ad omnes
capitis & nervorum frigidas ac diutinas affectiones.

DE RHODIA RADICE.

CAP. XXIII.

RHODIÆ raditi cauliculi sunt dodrantales aut al-
tiores paulo, rotundi, nonnihil concavi, foliis circumvestiti
plurimis, oblongis, latis, acuminatis, virentibus, carnosiss,
glabris, per ambitum serratis, Crassula herba aliquatenus
similibus, at tamen minoribus. in cacuminibus umbella
parue apparent, in quibus flosculi exigui è tuteo pallentes,
tandemq; rubescentes. radix crassa, inæqualis, & tubero-
sa, quæ recens candida & succosa trita rosarum odorem
satis refert.

In Apennino & Gargano Italiæ montibus, nec non in
Germaniæ alpibus spontè gignitur: & ut Dioscorides, in
Macedonia quoq; In Belgij hortis colitur, vbi Aestate vi-
ret, & aliquando floret: Hyeme latet, sola radice viuaci,
frigorisq; patiente.



F

Rhodiola radix,
 Prod. pempt. 349

Ῥοδίον πίζαν Græci nonnulli πόσιδα nuncupant. Germani Rosendwurtz; Hispani Rayz Rodia: nostri Rosolè Wortele. haudquaquam à Rhodo insula, sed à Rosis nomē accepit, quarum odorem attrita spirat.

Ceterum utilis hæc herba est, auctore Dioscoride, capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum modico rosaceo imponatur.

Galenus tenuium eam esse partium digerentisq; facultatis, & in calfaciendo secundi ordinis censendam esse: aut tertij incipientis.

At nobis refrigerans & Rosis vti odore, ita & temperatura affinis videtur; & aduersus capitis ex calida causa dolores, efficacem esse posse.

DE FRAXINELLA.

CAP. XXIIII.

FRAXINELLÆ complures exeunt cauliculi, rotundi, cubitales aut altiores, inferius foliis, superius verò floribus supra inuicem digestis exornati. folia oblonga ex pluribus ad vnum pediculum vnita Glycyrrhizæ similia, multo quàm Fraxini minora: singulæ tamen eorum breuiora, duriora, magisq; acuminata, quàm Glycyrrhizæ. florum color dilutè est rubentis purpura, quasi vti syluestris Maluæ: sed forma dissimilis. A quinis etenim ut plurimum striatis oblongisq; superioribus foliolis, stamina aliquot recurvata barba instar dependent. Odor horum grauis est, ac hircinum olet, & similiter earum quæ sequuntur siliquarum. Succedunt autem singulis floribus quinque simul, asperæ, scabræ, & subrubentes; in quibus semen gignitur rotundum, nigrum, splendens, minus quàm Pæoniae aut etiam Lentisci. radices ab vno capite plures diu-



Fraxinella alba.
Bot. temp. 348

duaricantur longa, cādida, carnosā, tenui in medio neruo, cum obscura acredine aliquantulum amaricantes.

Videntur autem huius dua esse species, non tamen valdè differentes. Vnius folia maiora, virentiora, duriora, magis acuminata: alterius verò nigriora, minùs dura, ac nō aequè in acumen desinentia. flores quoq; huius aliquanto dilutiores: illius verò paulo rubicundiores.

In Italia ac Germania montibus ac collibus, lutofo ac saxoso reperitur solo. apud Belgas hortensis est.

Flores Iunio: semen seriùs provenit.

Recentiores Fraxinellam pleriq; ~~χαμαιμυδιον~~ quasi humilem fraxinum appellant: officina Diptamum & pro legitimo Dictamno, radicibus huius subinde vtuntur: vnde & à nonnullis Pseudodictamnium & Dictamnium album nominatur. Non esse autem legitimam Dictamnium, notius modò est, quàm vllis verbis refelli opus sit. Et Pseudodictamnium quoq; Dioscoridis nequaquam esse, nō minùs manifestum. Sed nō esse Tragij veterum speciem, nō aequè expeditum videtur. Nam cum Tragio, & quidem priore convenire posse apparet.

Tragium primum.

Plinij locus re-
statutus.

Habet autem istud prius Tragium (duo siquidem sunt) auctore Dioscoride, folia, virgas & fructus Lentisco similia, sed minora omnia, & succum fert gummi similem: & in Creta tantùm nascitur. Idem Plinius lib. xxvii. c. xlii. Tragonis siue Tragium, ait, nascitur in Creta tantùm insule maritimis, Lentisco (exemplaria perperam Iunipero habent) similis, & semine, & folio, & ramis. succus eius lacteus in gummi spissatus, vel semen, impositione spicula è corpore eiicit.

Et Fraxinella quidem Lentiscum nō minùs quàm Glycyrrhiza folio refert; & odorem τρέζου, id est, hirci spirat. Quæ huius cum Tragio similitudinem quādam ostendūt.

Sed

Sed tamen quia frutex non est; non baccas quales Lentiscus, sed siliquas ferat; adnatis ramulis careat; ad hæc neque lachrymam fundat; haudquaquã Tragium, sed aliã, atque ab eo differentem stirpem esse consequitur, quam verisimile est veteres non obseruasse, vel in nullo usu, aut saltem negligentius habuisse. Facit huc quod Bellonius libro primo Singularium referat, Tragium in Creta iuxta fluentia nasci, & flore esse luteo. Nam Fraxinella montes amat, & flore rubet. Ex quibus Fraxinelle cum Tragio discrimen satis apparet.

At Fraxinelle radix excalscit & resiccat ordine secundo, digerentis, attenuantis, & aperientis est facultatis. Menses & vrinas mouet: partus adiuuat; secundas educit; vteri frigidioribus morbis auxiliaris est. conferre et stomachicis & anhelosis fertur. Tradunt etiam aduersus ictus morsuq, ferarum, lethalia medicamẽta, & pestilentium morborum contagia prodesse, antidotiũq, vtiliter permisceri.

DE VALERIANA.

CAP. XXV.

VALERIANÆ tria genera passim occurrunt. Vnum hortense: syluestria duo. Reperiuntur verò & aliæ quædam, sed nomine, non effigie reliquis similes, vt quam Rubram cognominant: & quam Græcam.

SATIUA siue hortensis valeriana, prima folia edit oblonga, lata, lenia, virentia, atq, indiuisa; quæ verò secundum caules maiora, longiora, vtrinq, profundius laciniata, Elaphobosci siue Pastinacæ maioris foliorum amulæ, sed tamen minora. caulis cubito altior, lenis & concavus & interuallis rarioribus articulatus; è cuius geniculis bina



V. pinnatifida
Hort. 349



V. officinalis. in
part. herb. 349



V. choricola, L.

Dod. pempt. 850

exerūt folia, et in fastigio flores in umbellis acervati, parui, ab oblongiore & angustiore exiguo veluti collo sese pandentes, Narcissi quidem effigiem aliquatenus exprimentes, sed tamē multo tenuiores & magnitudine ipsis plurimum cedentes, colore è rubente diluta purpura albicātes. radix digitalis crassitudinis, obliqua, fibris multis summae terrae adheret, plurima parte eminens: quae dum resiccatur, pinguis ac cileosa efficitur, & odore est suaviore quā recens.

Sylvestriū quae maior, foliis cum prioribus tum iis quae ² circa cauliculos, est diuisis ac laciniosis, maioribus & nigricantioribus quā sativā. caulis huius levis quoque, inanis & geniculatus, cubitoq; procerior. flores in umbellis similes, & dilute purpurei. radices tenues & veluti multis capillamentis fibrosae, odore non omnino destituta.

Altera sylvestris forma hortensem satis refert, sed longē minor est. prima eius folia indivisa; reliqua in partes ac ³ lacinias dissecta. cauliculus dodrantalis. flores in umbellis aliarum similes ex levi purpura albicātes. radices tenues, oblique repētes, et rennibus fibris capillatae, odoris exigui.

Seritur hortensis apud Germanos & Belgas. in Creta autem & Ponto sua spontis esse fertur. Sylvestres humentibus locis, iuxta rivulos, fossas & scrobes aquas habentes reperiuntur. maior harum in hortos translata luxuriat; minor verò agrē coalescit.

Florent haec Maio, Iunio & Iulio aestivis mensibus.

Valeriana passim appellantur & Graecè φού. Et prima quidem quae apud Dioscoridem descriptioni respondet: neq; obstat slos parvus & Narcisso minor. Quod siquidē maior scribatur, errore sit Graeci exemplaris; in quo sic habetur:

αὐτὴν ὁπὸς τὰ ραπίον μετ' ὧ δὲ καὶ τριπλότερον. Sed pro μετ' ὧ, i. maior, restituendum est ἥσσον ἢ τὸ αὐτὸ, id est, minor.

Dioscoridis locus emendatus.

ut ante nos Ruellius quoq; annotavit. Id quod mox subse-

quens dictio τριφώτερα, hoc est tenerior, non modò innuit, verùm & palàm ostendit. Neq; enim maiora, sed minora teneriora esse solent. Atque sic se habente Dioscoridis lectione, omnis adimitur scrupulus. Sunt namque Valeriana flores ἡλίανθος & τριφώτερες, quàm Narcissi.

1 Appellatur præterea Valeriana sativa à Dioscoride, *βάσις & ἀγρία*, id est, sylvestris aut rustica nardus; à Plinio Nardus Cretica; hac etate à quibusdam Marinella, Genicularis herba benedicta, & Theriacaria : in officinis Valeriana domestica : Theophrasto Paracelso Terdina : Germanis Gross baldzian : nostris Groote valeriane / Speercreupt / S. Jozis crupt: Gallis Valeriane.

2 Altera species Valeriana sylvestris, nūcupatur & Germanicè Wild baldzian / katzen wurtz / augenwurtz / wendwurtz / denmarck.

3 Tertia Valeriana minima nominari ferè solet.

Excalfacit autem Phu legitimum, ut Dioscorides ait; sed tamen non intensè, neque ipsa recens radix, sed arescens tantum. Recentem siquidem exiguum omnino caloris habere facile deprehenditur. arescentem verò calidiore esse, & gustus & odor uterq; intensior ostendunt.

Mouet autem, auctore Dioscoride, sicca radix vrinas; menses cit; prodest ad laterum dolores, & antidotis permiscetur.

Sylvestrem autem Valerianam, ruptis, conuulsis, ex alto præcipitatis, recentiores utilè censent. folia huius, tum & sativa ad oris & gingivarū cum inflammatione exulcerationes, decocta, & gargarisata prodesse ferunt.



V. rubra, L.
Ord. Ranuncul. 250

DE VALERIANA RVBRA.
CAP. XXVI.

HÆC herba duorum dodrantum caulibus aut longioribus, iisq; rotundis, lævibus & geniculatis assurgit. folia habet lata, longa, acuminata, lævia & diluta viroris: è fistigis caulium Valeriana propemodum similes umbellas, sed laxiores & magis inconditas; in quibus flores oblongi, tenues, rubentes; & semen inde exiguum, oblongū, quandoque summa parte barbatulum. radix subest candida, mediocris crassitudinis & longitudinis.

- 2 Huic similis alia reperitur, foliis quoq; oblongis; cauliculis circa superiorem partem in ramulos complures diuisis; flosculis è diluto caruleo purpurascens, brevioribus quam superioris; radice mediocris crassitudinis.

Utraque Belgis hortensis, & altera quidem rarior. florent aestiuis mensibus.

Valeriana rubra à florum umbellarumq; similitudine plerique nomen dedere, quod huic permittere maluimus, quàm impropiam appellationem temerè attribuere. Sunt etiam qui Behen recentiorum speciem esse velint, id ipsum Behen rubrum nuncupantes, ad differentiam alterius Behen albi dicti. Quæ quidem est herba multum à Behen Arabum differens; veluti & prasens. Alij inter Limonij genera referunt. Matthiolus etiam secundam speciem pro Limonio depingit. Atque hanc ipsam aridam ad nos pro Limonio misit præclarissimus vir, & in notitia stirpium omniumq; simplicium versatissimus Iacobus Antonius Cortusius Patritius Patavinus. Et respondet satis cum Limonij descriptione posterior. Sed Valeriana rubra non aequè: non modò quòd folia eius sint longè quàm Beta minoræ, verum potissimum, quòd semen eius rarò perficiatur, et hoc ipsum

ipsum nequaquam rubeat. Nam Limonio folia sunt Beta Limonium.
 similia, tenuiora tamen & minora: caulis tenuis, rectus,
 refertus semine rubicundo, ut Dioscorides refert.

Ceterum quod ad facultates attinet, nullas quidem ha-
 rum compertas habemus. videtur autem virag, vnâ cum
 radicibus refrigerantis esse naturæ.

DE VALERIANA GRAECA.

CAP. XXVII.

GRAECA Valeriana coliculos tres aut quatuor pro-
 prios rectos, cōcauos, inanes, tenues & cubitales, foliis cir-
 cūuestitos cōpluribus oblongis, alutis, ex aliis multis, medio
 intercurrente neruo, compositis, Vicia foliis ferè conformi-
 bus, sed tamē virentioribus; quorum singula paruula sunt,
 latiuscula, oblonga, acuminata, dorsoq, aliquātulum emi-
 nente. flores nequaquam in umbellis, neq, etiam ex alis
 foliorum, sed in fastigiis cauliculorum sparsi prodeunt, pul-
 chri, colore cæruleo sed dilutiore splendentes, ex quinq; fo-
 liolis, staminibus aliquot exiguis & candidis in medio, à
 quibus apices parui sublutei dependent. sequuntur capi-
 tula parua in quibus semen minutum. pro radicibus mul-
 ta tenuissima sunt fibrae.

Nusquam suæ spontis in Belgio est, sed aliunde illata.
 plurima æstatis parte floret.

Valerianam, ut diximus, Græcam, & Valerianam pe-
 regrinam, necnō Pseudopbu nostri appellant, tamen si nul-
 lam cum Valeriana similitudinem habeat.

Nullus est vsus; nisi quod horiorum exornet margi-
 nes.

Polium ovaleum, L.

Prod. pempt. 352.



RUBIAE quidem propriè species nulla sunt. Sed si omnes illi foliis similes, ad eam referantur; multa occurrunt; ut Aparine, Mollugo, Gallium, Asperula, Crucjata, quæ omnes foliis Rubiam referunt, & idcirco sylvestres eius species videntur.

Ramulis autem Rubia exit quadrangularibus geniculatis, asperis, crassioribus maioribusq; quàm Aparines: foliis angustis, oblongis, asperis quoque, è singulis geniculis quinque ferè, in radiantis stelle modum dispositis. flores in summis ramulis parui, dilute lutei. semen rotundum, paruum, initio virens, inde rubens, postea nigrum. radices prælongæ, tenui medio nervo, cortice verò carnosiore ac rubente, quo cum lanæ tum & alia, rubro inficiuntur colore.

Seritur Rubia non paucis Italia, Hispania & Gallia, plurimis etiam Belgij locis, pingui facundiq; solo. Dioscorides quardam sue sp̄tis esse tradit: alteram verò in Thebana Gallia, & Raetia Italia, nec non in Caria inter oleas feri.

Valerius Cordus Rubiam etiam iuxta Germaniæ Spiram spontaneam in sepibus nasci refert, sativa per omnia similem, maiore tantum radice.

Æstate floret seminq; facit. Augustor. radices leguntur, quæ resicata & attrita, in vsus et tinctorum & medicina veneunt.

Græcis ἐρυθρόδενον & ἐρυθρόδενον, ut quibusdam placet, appellatur: Latinis Rubia & Rubra: officinis Rubia tinctorum: Paulus Aegineta δακτύλον quoq; nuncupari refert, lib. III. cap. II. δακτύλον, ait, ἢ τῆς τοῦ βαπτέως ἁγῶνται

ἢν οἱ ῥωμαῖοι ἐρευνουσίαν καλοῦσιν. Eandem ibidem χρυσίζαν etiam cognominat. Est tamen & alia Thapsia ferulacea à Rubia multum differens: aliud item Ereuthedanon; (si, mendo exemplaria carent) quod à Theophrasto lib. IX. describitur.

Ereuthedanon
Theophrasti.

Ereuthedanum folium, inquit, habet simile κρησίδος; id est, hederæ, verum tamen rotundius; nascitur humi velut gramen, & loca amat umbrosa. Radicem verò, huius similiter rubicundam, eodem lib. & VII. etiam scriptum reliquit.

Sunt præterea quibus Rubia δρεάνη & dicitur; aliis κιννάδης, à rubicundo colore: Marcellus antiquus scriptor etiam Polygonon appellat. Idem tamen Millefolium sanguinale & Verbenam polygonam quoque facit. Dicitur autem Rubia Itali quidem Rubbia & Robbia: Hispanis Ruia, Roya, & Granza: Gallis Garance: Germanis Grotte: nostratibus Mee, & ubi comminuta sunt radices Mee crappen.

Rubia autem radices, quarum quidem, cum in medicina, tum in iunctura est usus, ut potentiam ac vim haud obscure adstringentem obtinent; ita quoque natura ac temperamento frigida sunt ac sicca. Gustata siquidem acerbum saporem referunt, cum exigua tamen quadam dulcedine primo occurrente, quam acerbam & adstringentem mox excipit qualitas. Quod non modo à nobis, sed & ab expertissimo sui seculi medico Guilhelmo de Saliceto compertum et observatum quoque est. qui pontici eam esse saporis scriptum reliquit.

Commendatur verò passim Rubia radicum decoctum, ruptis, cassis, vulneratis, ex alto præcipitatis: sanguinis fluores reprimere; inflammationes mitigare: offensas quasatque partes ad sanitatem perducere creditur. Miscetur

his

his de causis potionibus, quas vulnerarias recentiores appellant. In quibus tantam earum vim ac efficaciam, & Matthiolus quoque esse refert, ut etiam thoracis & intestinorum lethalia vulnera his curari posse speretur.

Accedit nostræ sententiæ expertissimus ac clarissimus olim Lonanij medicus Ioannes Springus, qui in Rhapsodiis suis scriptum reliquit, Rubiæ decoctum cum Triphe-
ra magna exhibitum valere aduersus fluxum menstruo-
rum, hæmorrhoidum, et dysenteriam: idq; euidentibus ex-
perimentis compertum. quod Rubiæm adstringentem esse confirmat.

At Dioscorides Rubiæ radicem urinam ciere ac mul-
tam crassamq; & nonnunquam sanguinem ducere tradit:
& tantam ei aperiendi vim adesse, ut apposita etiam men-
ses, secundas & fœtus extrahat. Esellit autem eum uri-
næ intensus rubor, vsum Rubiæ mox consequens, quem à
permixto sanguine esse existimauit, qui tamen non aliun-
de est, quàm ab ipso colore Rubiæ.

Radix etenim huius quouis modo assumpta, mox uri-
nam rubicundo insicit colore; non secus ac Rhabarbarum
eandem tingit luteo; substantiam interim eius non per-
mutans, nec crassiorem, quàm antea fuerat, reddens: in iis
scilicet, qui integra sanitate fruuntur. Quod non aperire
eam, sed adstringentis quoque facultatis participem esse,
non minùs quàm Rhabarbarum, citius commōstrat. Pro-
pter adstringendi siquidem ipsius potentiam, colorem serosi
humores aliquandiu retinent.

Adstringentibus enim permixti colores, diutius colora-
tis inhaerent; nec ita citò euanescent. Probè istud norunt,
qui ex florum herbarumq; succis colores colligunt. alumen
etenim vni cum ipsis permiscet, quo in longius tempus
coloris species, alioqui citò peritura, retineri ac conservari
posset.

Dioscorides &
Galenus notan-
tur.

posset. Ex his autem satis constat, extergendi aut aperien-
di potentiam Rubia nullam esse, & Dioscoridem huiusce-
modi vim ei temerè tribuisse: ac post eum Galenum et po-
steriores reliquos, in eius verba iuratos.

Plinius contra, serpentes Rubia ramos cum foliis impo-
ni, ait, & invenire se apud quosdam (quod vanissimum)
morbum regnū sanari hoc frutue, etiam si adalligatus ste-
ctetur tantum.

DE APARINE.

CAP. XXIX.

APARINE tenuibus & quadrangularibus ramu-
lis, foliisq; angustis, orbiculatum radiatis Rubia similis est;
interim minor. flores per se filii, candidi in summis emicant
virgulis. semina concava umbilici effigie, gemma ut pluri-
mum simul radices fibrosæ & tenues. Astera tota est her-
ba, præter euntium vestibis ac laciniis scabritie sua adhe-
ret; linguæ inducta sanguinem ebuit. Pastores hac herba,
Dioscorides refert, coli vice uti, ad eximendos è lacte pilos
si qui in eo substituerint.

Exit Aparine iuxta margines agrorum, & quandoque
in ipsis agris frugibus permixta: item secus vias, scrobes, se-
pes, & inter sentes. Theophrastus & Galenus in Lente eā
coalescere scribunt, & amplexu suo eam suffocare; eoque
modo illi gravem ac molestant. Aestivis mensibus ubique
frequens.

Απαρίνη Græcis: Latinis subinde etiam Lappa et Lappa
minor. Plinius Lappagini speciem esse affirmat. Lappagi-
nes autem ipso auctore, duæ: una aстера Asperugo; altera
mollis Mollugo. Et Aparine quidem Asperugo est.

Lappago, inquit Plinius lib. xxvi. cap. x. similis Gallio,
nisi



Aparine aparine, L.
Dod. Mant. 357

Plinij locus co-
stitutus.

nisi esset ramosior ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperio-
ris succi, grauis odor: quæ mollis est, Mollugo vocatur: si-
milis sed asperioribus foliis Asperugo (exemplaria multa a-
liter sed perperam habent.)

Appellatur præterea Aparine & φιλάρδεον, quasi
hominis amica; quod vestitu eius adhærescat: à nonnullis
& ea de causa φιλάρδεον. Ab Hippocrate, teste Galeno,
φιλίσιον & φιλευτέριον. Nominatur & ὀρεαλόχαρπος, aut
ut alius placet, ἀμπελόχαρπον: Italus Speronella: Hispa-
nis Prelera, aut amor de hortolano: Germanis Klee-
kraut: Gallis Reble, seu grateron: Belgis Kleeferuut.

Modicè autem, ut Galenus ait, extergit et desiccatur, ha-
betq; nonnihil subtilium purgantium. Seminibus, inquit Diosco-
rides, caulium & foliorum expressus succus auxiliatur à
phalangis ac viperis commorisis cum vino bibitus: aurium
dolores succus infusus curat: ac herba cum axungia trita
strumas discutit. Sanguinis etiam abundantiam ex vulne-
ribus reprimere folia imposta, Plinius tradit.

DE MOLLUGINE.

CAP. XXX.

MOLLUGO Aparinen caulibus foliisque, satis refert,
nequaquam tamen aspera, sed laevis & mollis flores albi-
cant. semen rotundum. radices tenues & nullius momen-
ti, repit per terram nisi frutibus vicinis sub iutur.

Reperitur iisdem ac similibus quibus Aparine locis, atq;
eodem tempore.

Mollugo mon-
tana.

Est tamen & alia montana, cuius assurgentes colicu-
li, nullis egent adminiculis, priores sin illi, nisi folio esset la-
uiore. flosculi eius candidi etiam sunt, & perquam exigui.
radix nigricat.



Saxifraga mollygo.
 Bot. pent. 384

In asperis quibusdam iuxta Rhenum ac Mosam montibus nascitur. à Martino Tulemano hanc accepimus, viro nostratum stirpiū & obseruantissimo & studiosissimo.

Vtraq; Lappaginis species est, atque à mollietate & lenitate foliorum Mollugo nuncupari potest. pleriq; Rubiam syluestrem nominant. Sed Rubia suae spontis, à fatua non differt.

Inutiles autem existimantur haec herbae, & nullius vsus.

DE GALLIO.

CAP. XXXI.

GALLIVM tenerius multo est, ac minus quàm Asparinae aut Mollugo, nequaquam asperum. Cauliculi eius tenelli, teretes, pedem aut duos dodrantes alti. foliola exigua per intervalla cauliculos stellatim radiata ambiunt: flores parvuli, frequentes densiq; in summis virgulis, luteo splendent colore, odore suaves. radices tenues fibrae sunt.

Nascitur aprius locis in collibus iuxta margines agrorum, solo latiori.

Reperitur & palustribus locis aliud simile, sed floribus albidis ac nivei propemodum candoris.

Huius Iunio: illius verò Iulio ac Augusto flores vigent.

Gracè γάλλιον, aut potius γάλιον dicitur: à nonnullis γαλάτιον & γαλέριον.

A lacte, cui additū pro coagulo est, nomen habet, quod Gracè γάλα dicitur. Germani Meegerkraut / walfstroo appellant; Galli Petit muguet.

Facultatem autem (quod quidem legitimum ac lutei floris) auctore Galeno, exiccatoriam obtinet & subacrem. flos eius, Dioscorides ait, ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit: miscetur cerato rosaceo, insolatur donec albescat;



Galium verum, L.
Oed. Pent. 258

vescat; & tale acopum est lassitudinibus vrile. radix, eodē teste, venerem excitat.

DE ASPERVLA ODORATA.

CAP. XXXII.

RUBIÆ & *Aparina* hæc similis quoq; est, sed humilior ac odoratior. cauliculi eius breues & pede vix altiores. folia è singulis geniculis sena septenave stellatim radiata, aliquantulum scabra, sed non perinde tamen vt *Aparines*. flores albi. semen paruum, rotundum. radix tenuis, serpens, & stirpem ipsam faciliè multiplicans. Tota herba gratum suauemq; expirat odorem, præsertim in atrius canaculūq; pedibus attrita.

Apud Germanos in syluis locus opacis pingui solo gignitur, Trago teste, sed apud Belgas hortensis: vbi Iunio ac serius floret.

Asperula autem huic similis est, sed tamen non odorata, quam *Caruleam* cognomināt. Dodrātalis herba, mollis, hirsuta, & aliquantulū ramosa; foliis ramulisq; *Asperule*. flores eius carulei in breuibus pediculis è summis virgulis emicant. semen rotundum, paruum, geminatum. radix tenuis, oblonga, rubet.

In Flandria plerisq; agris spontè exit; annua est, sed ex deciduo semine seipsam ferit.

Plinij *Alyssos* à plerisq; creditur, quem ab *Erythrodano* siue *Rubia* foliis tantum ramisq; minoribus differre ait. Talis autem non modò ista, sed et odorata *Asperula* est; sed flos huic albus, illi verò caruleus; & Galenus *Alyssos* florem tribuit caruleum. Differre tamen Galeni & Plinij videntur.

Galenus enim *Alyssen* foliū describit *πρασινόν*, id est,

Maru-



Asperula, L.
Orthocentrus, J. S.

Marrubij; differentibus videlicet multum ab Erythro lani foliis. Suspiciari fortassis hinc licebit, Plinium perperam pro Marrubij accepisse Rubie; atque hinc Alysson Erythrodan foliis scripsisse. Nisi Erythrodanum, cui simile perhibet esse Alysson, non Dioscoridis sed Theophrasti sit Ereuthedanon, quod foliis heteraceis rotundioribus esse in capite de Rubia ostendimus. Atque ita posset idem esse Galeni & Plinij Alysson, sed ab Asperula carulea, & similiter odorata, longè diuersum.

Alyſſos Galeni. De Alyſſo autem Galenus lib. vi. de Antidotis in compositione Antonini Coisic scribit: Αλυσσος ἐστὶ βοτάνη πρασιὰ περιεμμένη τεραχύτερα δὲ ἢ μᾶλλον ἀκανθώδης περὶ τὰ σπείρα· αἴθερ δὲ φέγει κίτρι. Cor. id est, Alyſſos herba est Marrubio persimilis, sed asperior, & magis spinosa circa orbiculos: florem fert ad caruleum vergentem.

Alyſſos Plinij. Plinij autem hæc sunt verba: Distat ab eo (scilicet Erythrodano) qui Alyſſos vocatur, foliis tantum & ramis minoribus. nomen accepit, quod à cane cōmorſos rabiem sentire non potuit; potus ex aceto & adaligatus.

Ceterum Asperulam odoratam appellant pleriq; etiam Aspergulam odoratam; alij Cordislē & Stellariam; Germani Hert; strepdt, waldmeister; Galli Mugue; cōnulli etiam Germanicè Leberkraut, siue leucerrupt, id est, lecorariam siue hepaticam.

Facilitatem hæc Asperula Gallio aliquatenus similem habet, sed tamen imbecillior. fertur in vinum coniecta hilaritatem efficere, cordi ac iecinori prodesse.

DE CRUCIATA.

CAP. XXXIII.

Ad Rubie & Ap. rines similitudinem aliquomodo etiam Cruciatu accedit, sed mollis & hirsuta herba. coliculi



Valeriana cruciata L.
 Bot. Mus. 357



Creosella maritima, L.
Prod. Rhod. 357

culi tenelli quadrangulares, geniculis articulati, folia è singulis internodiis quaterna, decussata, breviora, sed latiora ferè quàm Aparines. flores exigui corona modo verticillatim cauliculos ambiunt, colore dilutè lutei; ad quem è viridi tota ipsa inclinat herba. radices subsunt perquàm tenues.

Iuxta fossas, aquarum riuulos, & quandoque agrorum margines, inter sentes, à Maio in finem vsque Aestatis reperitur; & quidem cum flore.

Cruciatam autem ac Crucialem nominant, à foliorum in crucis formam decussato posita.

Huic autem similis, & alia quædam locis exit maritimis, cauliculis & decussatis foliis eum referens, quam Rubiam appellat marinam. Rubia marina

Cæterum facultate Cruciatam nonnihil videtur habere adstrictionis, simul cum resiccatione. Recentiores inter vulnerarias dictas numerant: & recentes aiunt ramices hac curari posse, decocto eius aliquot diebus epoto, herba verò ipsa loco imposita.

Finis libri primi.

DE

DE PURGANTIBVS HERBIS,

LIBER SECVNDVS:

PRAEFATIO.



ERBAS aliquot descripsimus, radici-
bus suis medicinae utiles; sequuntur nunc
purgantes. Harum autem materies di-
uersa est. sunt folia & herbe. sunt fru-
ctus eiusdem potentiae. idem nonnulla ra-
dices praestant. arborum etiam quarun-
dam ac fruticum, vel cortices, vel fructus co-
periment. Sed
quaecumq; ad arborum & fruticum genera referri possu-
lant, sua proferet pars; nunc tantum herbaceas stirpes tra-
ctamus. Inter herbas autem huius generis, quaedam peda-
mentis sustinentur: aliae nullis egent. Dabit has hic liber:
illas subsequens.

DE ASARO.

CAP. I.

ASARO folia sunt leuia, in virore splendemia, rotun-
diora, latiora tenctoriaq; quam Hedera, & nequaquam
angulosa. flores iuxta radices sub ipsis foliis latitant, ipso-
rum annexi pediculis, sordido purpurascens colore, Hyo-
scyami cytinis similes, sed tamen minores, in quibus tandem
semin' exigua, angulosa, & aliquantulum aspera. radices
multae tenues & graciles, oblique sparguntur, & sibi inni-
cem



A. europaeum, L.
Bot. Mus. 358

*cem implicantur; sapore cum acrimonia quadam haud in-
iucundo; odore grato.*

*Amat montium opaca ac umbrosa loca, & plerunque
sub corylis, vt Cordus refert, inuenitur.*

*Perpetuò viret herba, noua tamen vnà cum flosculis so-
lia Vere promit.*

*Asaron, Græci similiter ἄσaron : Latini etiam Nardum
rusticum, & nonnulli Perpensam vocant. Est autem Per-
pensa etiam Baccharis Plinio, lib. xx. cap. xxi. Macer
Asarum vulgaginem dicit.*

*Est Asaron Græcè (inquit) Vulgago dicta Latinè.
Olim etiam à Magis ἀμαρπῶς, hoc est, Martis sanguis,
& à Gallis Bacchar nominatum fuisse inter spurias voces
extat : atq; inde nata videtur Asara baccare vox, qua of-
fuma vtuntur. Sed alia est Baccharis, & ab Asaro dif-
ferens. Appellatur tamen & Baccharis à Crætea Asarū,
(si modò non legendum est ἄσaron) vt in Florum historia
scripsimus.*

Dioscoridis 1.
cus emendatur.

*Fecit autem hæc vtriusq; nominis confusio, vt non satis
se explicare de Asaro & Bacchare pleriq; potuerint, & in
multis Dioscoridis exemplaribus nonnulla cap. de Asaro
perperam accesserint. Nam quod initio statim in Græcis
exemplaribus occurrit : πᾶς ἐν ὅσῳς σεπαραυατῶν, hoc est,
herba odorata coronariæ, non ad huius Asari, sed ad Bac-
charis pertinet descriptionem. Asarum etenim, vti Plinius
ait, dictum est, quoniam in coronas non addatur. Atq; ita
euenit vt sæpenumero veterum descriptiones deprauata et
confusa reperiantur; quod vt hoc loco manifestum est, ita
f. unde nō perinde facilliter aliis locis animaduerti potest.
Porro Asarum Gallis Cabaret: Germanis Haselwurtz:
Belis Mans ooyen & Haselwoztele dicitur.*

*Vim autem Asari folia excalfactoriam simul & resic-
cantem*

cantem habent, vñà cu n expurgandi potentia; non tamē absq; nonnulla adstrictione. vomitione crassos, pituosos biliososq; humores educunt; & simul inferiorem ventrē commouent; atque in hoc ipsis radicibus potentiores efficacioresq; sunt. Eadem caninosos tumores apposita, ne augeantur aut exulcerentur latiusve serpant continere putantur.

Radicēs excal actoriam similiter vim & resicatoriam obtinent; vtramque quàm folia intensiorem: tenuium sunt partium: vrinas ciunt: menses promouent: facultate, vt Galenus ait, Acori radicibus similes, sed tamē intensiores. Acori autem tenuis cōsistentia, excalfacientes, extenuantes, resicantes, & vrinas mouentes esse tradit. Quæ quidem in exigua quantitate Asari radices, assumptæ, aut aliis permixtæ feliciter exequuntur. Iecinoris idcirco, fellis & lienis obstructionibus, duris scirrosisq; tumoribus, & aduersus inueteratas febres utiles. Sed in maiore quantitate assumptæ, non multo quàm folia minus (tamet si non scripserit Galenus) vomitione potissimum, tum & per inferiorem ventrem pituitam & bilem educunt.

Sit autem radicum in puluerem contritarum (plus minus) drachma oportet: si verò macerentur decoquanturve, duabus, tribus aut quatuor opus erit. folia verò octo aut nouem sufficiunt, quorum cum liquido aliquo contusorum expressus succus exhibetur. radices in vino macerari possunt, sed vtilius in sero lactis aut hydromelite, vt Mesues habet.

Prodest hoc modo Asarum Ischiade laborantibus, & hydropicis, tum & subinde quartana excruciatas, quos vomitione nonnunquam curari ac liberari contingit.



Aloe americana L.

Det. Prof. 359

CAP. II.

FOLIA habet Aloë Scyllæ similis, oblonga, lata, le-
uia, crassa, retrouorsum repanda, vtrinque crenata, aspe-
ra, & retusis aliquot spinulis aculeata, lentotenaciq; succo
plena, inftar foliorum Semperuiui. caulis, vt Dioscorides
ait, Antherico similis est: flos albicans: semen vt Asphodeli.
radix singularis, crassi pali in terram adacti effigie. Tota
herba amarissima est, ex ea quoque succus collectus ama-
rissimus.

Copiosissima hæc stirps apud Indos, & in Arabia, Calo-
syna, ac Aegypto: vnde pellibus infusus succus in Europam
infertur. Nasitur etiam, vt Dioscorides tradit, in Asia
locis maritimis, ac in Andro, sed non valde succo extra-
hendo idonea. Reperitur & in Apulia, & nonnullis Bericæ
Hispaniæ locis haud procul à mari, sed & huius succus inu-
tilis.

Viret autem perpetuò ipsa herba, atque etiam è terra
diu frölescit: præsertim luto radici circumligato & subin-
de rigato. Sic etenim è tabulatis canaculorum suspensa nõ
modò diutinè viret, verum & incrementum sumit, nouaq;
folia protrudit; sed repentem Hyeme locum esse oportet,
congelata enim citò facileq; tabescens perit.

Αλόη Græci, Latini & officina pariter Aloën, tum her-
bam ipsam, tum & eius densatum succum appellant. Di-
citur & stirps ἀμρίδιον, ἡρίδιον, ἔρινον, τραχύνειον; sed
spurii vocibus. ἀμρίδιον autem dici potest, quòd non modò
in terra, sed & extra eam viuat. Galli Percoquet: Hi-
spani Azenar, & herba bauola nominant. Appellatur
verò à recentioribus ipsa herba nõnunquam Semperuiui,
& Semperuium marinum, quòd Semperuiui modo diu
H 2 duret.

duret. Videtur & à Columella lib. x. Sedum nominatum. vbi videlicet remedia contra erucas ostendit;

Profuit & plantis latices infundere amaros

Marrubij, multoque Sedi contingere succo.

Sedi etenim succum inter amaros refert, nullius autē Sedi, quàm huius amarus est.

Aloë autem, videlicet succus cuius in medicina vsus, ad plurimas res utilis est. moderatè & primo ordine calida, sed tercio exsiccans; vehementer amara, absq; mordacitate tamen; & simul emplastica, nonnihilq; adstringens.

Ventrem subducit: interim, si quod aliud, stomacho gratum & conueniens medicamētum. Nam vt Paulus Aegineta scribit, cū omnia purgatiua medicamina stomacho aduersentur, sola Aloë conducit. Et euacuat quidē non elota valentiū, elota verò minū, ventriculum magis roborans.

Bilem flauam educit; sed potissimū, qua in ventriculo primis venis, proximisq; viis hærent, expurgat. Est enim ex numero medicamentorum, quæ Græci ab excernendo stercore *ἑκκροπρωτὰ* vocant, quorumq; vis purgans, non longè vltra ventriculū sese extendit. Aduersatur præterea Aloë putredinibus omnibus; & ab ea, omniq; corruptione omnes corporis partes tuetur atq; descendit. cadauera etiā mortuorum conseruat: ventris tineas lumbricosq; interimit ac expellit: graueolentiam oris, vitio stomachi enatam emendat: ani hæmorrhoides aperit: menses etiam promouet, in exigua quantitate assumpta: creditur ad reliquorū viscerum obstructions & infarctus prodesse. Sunt tamen qui iecinori parum commodam existiment.

Ad purgationē datur eius, plus minus, drachma. subinde oboli tres aut quatuor satis sunt.

Vulnera etiam glutinat ac sinus; vlcera expurgat; & quæ

que agrè ad cicatricem duci possunt, maximè in ano & pudendo, sanat. & valèns, id est, sanguinem supprimētibus, & que cruentis vulneribus adhibentur emplastris vtiliter permiscetur. En. plastica enim sua natura ac substātia his prodest. In ocularia collyria vtiliter recipitur, vtpotè extergens & absque mordacitate resiccans.

Dioscorides terreri eam ait, ad oculorum medicamenta, in testa pura & candente; rudiculaq; subinde versari; donec aequaliter torreatur: lauari item, vt quod est arenosissimum subsidat tanquam inutile, & laue pinguisimūq; assumatur.

Idem Aloën etiam tradit, liuores & sugillata cum melle delere: palpebrarum scabrities, angulorumq; prurigines lenire; dolorem capitis sedare, temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inunctam: capillos fluentes cum vino compescere: rōsillis, gingiuis & omnibus oris vlceribus ex melle & vino prodesse.

DE SENA.

CAP. III.

SENA cubitales erigit cauliculos, nonnullis aliis ramosos; folia verò oblonga, alata, è pluribus vnita, Glycyrrhiza aut Colutea similia. flores ex alarum sinu prodeunt lutei in tenuibus pediculis, à quibus deinde falcati, atque Luna nūtrōq; instar recuruati dependent folliculi, plani atque compressi; in quibus semina oblonga, vuarum seminibus siue vinaceis similia, colore nigricantia. radix tenuis, oblonga & inutilis.

Seritur in Syria & Aegypto, item in Italia, Prouinciæ, ac Narbonensi Gallia. Apud Germanos & Belgas difficulter prouenit. Amat calidas regiones; frigori impatiens. Ob

id Maio demum mense in Italia feri sustinet, neque ultra Autumnum perdurat.

Optima Alexandrina & ex Aegypto aduecta. Inuentio huius Arabibus debetur.

A Serapione Habohanisa, à Persis AbalZemex, vt Mesues exemplar habet, appellatur: officinis Sena dicitur, quo nomine Actuarius Græco, & Latinus posterioribus innotuit.

Est autem Sena, quod ad temperaturam attinet, satis temperata, in medio quasi calidi ac frigidi, ad calorem tamē vergens. sicca verò tertio fermè ordine. purgandi autem per inferiorem ventrem facultatem naturæ humane haud multum molestant obtinet: non citra adstrictionem, quam post purgationem relinquit.

Educit autē pituitosos humores et biliosos, nec nō crassos & melancholicos, si eò faciente aliquo adiuuetur. Vtilissimum in multis morbis purgans medicamentum, quod omni ætati & sexui conuenire potest. Citra violentiam ac noxam purgat. præsertim Anisi semine, aut aliis odoratis similibus vna additus, vel lenientibus medicamentis contraperata.

Dari potest in puluere, sed frequētius dilutum eius exhibetur.

Modus pulueris est drachma vna, dilutum quatuor aut quinque pluresve admittit. Macerari in quouis liquore potest. In febribus ardentibus ac aliis calidioribus morbis in decocto siue diluto refrigerantium temperatur. in frigidis verò & diuturnioribus malis cum excelsa facientibus, aperientibus, aut similibus decoquitur, vel etiam in vino maceratur; quo modo familiaris natura, citra omnē ferè molestiam aluum clementer subducit, crudosq; humores detrahit.

Laudant Arabum plerique folliculos: at nostri folia magis

gis cōmendant. folliculi etenim nisi maturi, status gignunt & torsiones ventris adferunt. Sepe autem ante maturitatem colligi illos contingit, & alias ventorum impetu deturbati facillè concidunt, & eorum pediculis dependentes.


Sunt etiam qui noxiam ventriculo Senam, & ipsum debilitare putant, ea de causa Zinziber aut aroma aliquod adiciendum aiunt, quo roboretur. Tardioris quoque operationis esse Mesues monet, & salis gemma, id est, fossilis adiectione adiuvandam. Et seriùs quidem, quàm fortiora medicamenta facultatem suam Sena exercet; potest tamen non modò fossilio sale, verùm & aliis purgantibus admixtus vtilius exstimulari: simplicibus videlicet, ut Rha Barbaro, Agarico, & aliis: compositis, ut Catholico appellato, vel ex Palmulis, aut ex Rosarum succo, vel alio pro conditione & qualitate, cum morbi, tum agrotantis.

DE GRATIOLA.

CAP. IIII.

CAULEICVLOS Gratiola promit complures do-
drantales & quadrangulares: frequentiaq; circa hos folia
angusta, oblonga, hyssopi vulgaris similia, cuius et ipsa her-
ba effigiem & formam satis refert: nisi quòd non ut illud
erigatur, sed aliquatenus humi repat. flores in tenuibus
pediculis oblongi, è foliorum alis exeunt, è diluta purpura
albidi. capitula sequuntur parua, rotunda, anagallidis pro-
pemodum similia; in quibus semen minutum, radices fre-
quentes, geniculata, graminis modo serpunt, fibrasq; mul-
tas deorsum mittunt. Saporem tota herba insigniter ama-
rum obtrinet.

Nascitur spontè in Italiae plerisq; palustribus, humidis
ac vliginosis pratis, Belgis hortensis est; ubi Iulio ac Au-



G. officinalis L.

Lam. 382.

Sicou. 2. 24

gusto cū flore reperiri potest. Nomen huic recentior et as Gratiolæ dedit, & Gratiæ Dei. Cordus Limnesion appellat: Italorum vulgus Stanca Cauallo Sunt qui Eupatoriū Mesues: Centaurida alij faciunt. Sed Mesues, Auicenna, Grecorum, & Dioscoridis vnum idemq; est Eupatorium, vt alibi ostendimus: à quo hæc herba differt. Centauris verò haud perperam dici potest. Nam cū Centaurij species videatur, & viribus præcellat, non temerè Centauris nuncupari poterit: veluti Centaurij, & quidem minoris, species aliqua. Non est tamen Centauris illa Theophrasti, cuius Plinius lib. xxv. cap. vi. meminit. Hæc etenim Centauris, ipsum Centaurium est magnum. Radices siquidem eius crassas spissasq; decē aut duodecim annis seruari posse Theophrastus lib. ix. refert quales nō alterius, quā magni Centaurij sunt. Scripsimus Centaurium magnū Panacis esse speciem, sed nihil repugnat Centaurida etiā dici. Ab effectu siquidem et præstantia reme ij Panaces: ab inuentore Chironiū Centaurium & Centauris appellatur.

Centauris Theophrasti.

Extant Helleborines præterea et Multiradicis appellationes, inter spurias Centaurij, quæ vulgari Centaurio minori minùs conueniunt; Gratiola verò hæc propriissimè apparent. Veratri enim modo propemodum purgat, & radicibus complurimis firmatur.

Est autem Gratiola vt amarissima, ita etiam temperie excelsa & resiccans eximiam simul expurgandi, cū per superiorem, tum per inferiorem ventrem potentiam obtinens.

Educit verò non modò lentam pituitam, verū et crassam flauam bilem. Prodest aduersus diutinos coxendicis dolores, & aduersus inueteratas febres, siue tertianas siue erroneas; iecur & lienem expurgat, ab obstructionibus liberat; ventris lumbricos pellit; putredinibus aduersatur.

Dosis macerata aut decocta est à drachma vna vel vna & semis; ad duas, vel amplius paulo.

Consolidat & glutinat eadem recentia etiam vulnera imposita.

DE CNICO SIVE CHARTAMO.

CAP. V.

CNICVS caule assurgit sesquicubitali, recto, tereti, duro, atq; lignoso, superiusq; ramoso. foliis munitur oblongis, latiusculis, fastigio acuminatu, & virinq; ambitu aculeato. è cauliculorū summitatibus capitula eminent rotunda, olivæ magnitudine vel maiora: multus acuminatis & acutus squamis compaginata; è quibus flores erumpūt staminei, farcti, saturato luteo colore, ad Croci accedente, splendentes. semina subsunt oblonga, levia, candida, nonnihil angulosa, hordei grano maiora; quorum cortex duriusculus: interior medulla pinguis, candida, gustu dulcis. radix Cnici gracilis & inutilis.

Seritur nonnullis Italia, Hispania, Gallia, & in hortis & agris. Plinius lib. xxv. cap. xv. Italiam Vespasiani principatu hanc ignorasse ait, & in sola Aegypto celebrē; ipsis autem oleo non cibo gratam.

Flores Iulio & Augusto, semen interea perficitur; & eodem quo seritur anno, exinde inarescit.

Κνίκον & κνίκον Græci; Latini similiter Cnicum et Cnecum vocant: officina Chartamum: nonnulli Crocum hortensem, & Crocum Sarracenicum. Itali Zaffarano Sarracinesco, & Zaffarano syluatico: Hispani Alazor & semente de papagaios: Germani Wilden saffran: Galli Safran sauvage. Theophrasto & Plinio Cnecus est urbana & sativa, ad differentiam Aceraetidis, quam sylvestrem



Carthamus tinctorius, L.

Ord. Prim. 382

strem Cnecum faciunt. Vimur autem, ut Galenus ait, semine duntaxat ad purgationes. exaltantis est natura; & quidem primi ordinis; ut Mesues. Tunditur, & ex eo exprimitur succus, qui cum hydromelite aut gallinaceo iure datus, alvum purgat; stomacho tamen aduersatur: Dioscorides auctor. Sed corrigitur, addit Mesues, aniso, galanga, zinzibere, alijsq; stomachicis additis. quæ non modo ventriculum roborant; sed & actionem eius quoque accelerant. Ex huius autem interiore medulla celeberrimū & præstantissimum hydragogon conficitur medicamentū, Diachartamou vulgo nominatum; ad hydropicorum purgationes vtilissimum.

DE CHAMELÆA.

CAP. VI.

HUMILIS ac fruticosa stirps Chamelea, pedalis aut altioris magnitudinis, cōpluribus tenuibus virgulis ramosa. foliis exornatur oblongis & oleæ similibus, sed tamen minoribus & nigrioribus. flores ex alis foliorum exigui, sublutei. fructus inde tricocci, virentes initio, postea rubentes; qui decerpti nigrescunt, oleosamq; pinguitudinem contrahunt olearum instar; sapore acres & mordaces, faucesq; exurentes; veluti & folia ac cortex. radix dura & lignosa.

In Italia & Gallie Narbonensis plerisq; incultis, asperis & desertis reperitur. perpetuo viret. semen. Autumno maturitatem assequitur.

Χαμέλαια quasi humilem oleam Græci appellant: Latini Oleaginem & Oleastellum. Dicitur etiam, sed spuris appellationibus, ὀλεὸς ἁγνός, ἁγνός &, ἡράχλειον βόδιον, & Latine Cicocacium.

Nomi-



Chamelaea *truncata* L.
 Bot. Bont. 363

Nominatur fructus à nonnullis *κόκκος & κνίδιον* : sed hallucinantur, inquit Dioscorides, qui Chamelaeæ fructum *Coccum cnidium* appellant.

Arabum confu-
sio.

Auicenna & Serapio Chamelaam Mezereon vocant, sub quo tamen nomine Chameleonein utrumq; complexi quoque sunt. Ita Chameleam cum Chameleonibus, atque vnà etiam Thymelaam confundentes.

Caterùm Chamelaeæ & folia, & fructus acris admodum, vt diximus, & vrentis vehementerq; calidae facultatis sunt.

Folia, Dioscorides ait, pituitam & bilem detrahunt; praesertim in catapotiiis sumpta; ita vt duæ Absynthij partes ad vnâ Chamelaeæ misceantur, & hydromelite excepta in catapotia cogantur. Non liqueſcunt autem ita in ventre, sed quotquot assumpta sunt, egeruntur.

Mefues ex Mezereon, id est, Chamelaeæ (Syluius tamē Thymelaeæ reddit) foliis similiter catapotiis descriptionem habet, sed Absynthij loco cortices assumit Myrobalanorum luteorum & cepularum, & non cum hydromelite, sed cum Terenisbin, id est, melle aëreo & palmulis acidis, quas Thamarindos vocant, in stillatij Antybi liquore dissolutis efformat : ipsaq; folia prius in aceto acerrimo temperata resicari praecipit. Commendantur catapotia hæc ad hydropicorum purgationes : aquosos etenim humores educunt. Sed violentiam natura inscrunt; idcirco ab iis quantum licet abstinendum.

Addit præterea Dioscorides foliis Chamelaeæ cum melle tritis sordida & crustosa vlcera repurgari.



Dalmanea guianensis, L.
Bot. Beng 364

DE THYMELAEA.
CAP. VII.

THYMELAEA multas tenues ramosas virgas proferit, cubito longiores, foliis circumuestitis oblongis & angustis Lini effigie; angustioribus & minoribus quàm Chamelæa flores candidi, exigui, in summis virgulis acervati. fructus rotundi, initio virentes, sed cùm maturi sunt rubentes, oxyacantha rotundis baccis propemodum adsimiles; in quibus nucleus foris niger, interiore verò medulla candidus. radix lignosa & dura.

In montanis asperis & incultis calidiorum regionum locis exit. Quovis anni tēpore viret, sed fructus Autumno perficitur.

Græci θυμέλαιαν vocant: Syri, ut Dioscorides testatur, ἀτόλινον: Euboenses αἰτώλινον: nonnulli etiam χαμέλαιαν & πυρὸς ἀχίνου, sed improprie: item & κέσπον & κρέωρον. Sed ut Dioscorides ait, folium peculiariter κρέωρον dicitur: fructus verò κόκκον & κρέιδιν. Quæ tamen à Theophrasto κρέωρα appellantur, à Thymelæa differre videntur, nisi nigrum Cneoron Thymelæa sit. Duo enim ait Theophrastus esse κρέωρα genera: vnum candidum, alterum nigrum.

Est autem Thymelæa tota sua natura et foliis ac fructu valdè excelsatoria, acris & vrentis facultatis.

Granum, ait Dioscorides, per inferna bilem, pituitam aquasq; detrahit, si xx. granorum interior pars bibatur; verùm fauces adurit; quare cum farina aut polentaandum, aut in vva acino, aut melle coctò obductum ut deuretur. Idem gritum cum nitro & aceto illinitur iis qui difficulter sudant.

Folia circa messem colligi debēt, & resicata in vmbra reponi. Qui exhibere ea voluerint, contundere debent, &

nervos

neruos eximere. purgat ex iis acetabuli mensura vino diluto in spersa, & aquosa ducit. Moderatius autem purgant lente cocta, et olivibus contritis admixta. Eadem folia irrita, & cum vna acerba succo in pastillos formata, reponitur. Est autem herba stomacho infesta, qua & factus apposita enecat.

DE CHAMELÆA GERMANICA.
CAP. VIII.

GERMANICA cognominata Chamelæa, frutex est surculosus & lignosus, bicubitalis, aut altior si cultura acceperit; tenuis ac dodrantalibus ramulis: foliis oblongis, latiusculis, mollibus, & pallide virantibus. flosculi secundum ramulos exeunt, odorati, colore dilute rubentis purpureæ. bacca rotunda ochri ferè magnitudine, cum maturare rubentes; resiccata nigricant. interior harum nucleus canabris semini similis, medulla refertus candida. radix longa, alitè demittitur.

In plerisque Germaniæ sylvis reperitur vmbrosis, asperis & desertis locis.

Demittit hæc folia ut plurimæ arbores aduētante Hyeme. florum verò germina statim post Autumnū pronit, qui primo mox Vere, & subinde ipsa Hyeme (si clemens fuerit) panduntur. folia post flores exeunt. bacca Aestate maturantur.

Vulgò Germanorum Zeilant/zeidelbast/leutskrant & kellerhals appellatur. officinæ nostræ Mezerion vocant. nos autem Chamelæam Germanicam dicere maluimus. Italarum nonnullos fructum eius Piper montanum nuncupare accepimus. Sunt qui Laureolam & hanc stirpem nominant, sed alia est Laureola, de qua mox agetur.



Daphne *amurensis*, L.

Dod. pinnif. 254

Leuc. toz. 1.9

Quo autē nomine à veteribus appellata, & an ipsis cognita, explicare non est facile. Videtur quidem Cneoron albū Theophrasti esse, sed propter breuitatem huius nihil affirmare licet. *κνώρος*, inquit, duo genera: candidum & nigrum.

Candidum folium habet *σεπτὰ ὀῦντες*, oblongum, figura quodammodo oleagino simile. Nigrum ut *Tamarix*, *καρνοῦσαν*. Humile autem magis candidum est, est *ῥῆζ*, *ἑπτὰ ὀῦντες*, hoc est, odoratum: nigrum verò *ἀστούς*, id est, absq^{ue} odore. radix ambobus quæ altè descendit, grandis: ramuli permulti, crassi, lignosi, protinus ab ipsa tellure aut paulo superius sparsi lenti; quamobrem hisce ad colligandum inuicem modo veniuntur. germinant florentq^{ue}, post æquinoctium Autumni, & multam deniq^{ue} temporis florent. hac Theophrastus.

Cneora Theophrasti.

Et Chamelæa quidem Germanica folio non multum dissimili est oleæ: flos odoratus, cuius, ut scripsimus, mox post Autumni germinæ apparent: rami lignosi, obsequiosi, radix prolixa, altè descendens. Quæ omnia magnam cum Cneoro albo coniunctionem & affinitatem (si non ipsum est) ostendunt.

Est autem stirps hæc in vniuersum etiam vehementer excelsatoria. fructus, folia et cortices acriter admodum sunt, gustata linguam mordicant, & adustionis sensum in faucibus excitant.

Officina Germaniæ & Belgij huius foliū (si quādo opus est) pro Chamelæa vtuntur. Quod citra errorem fieri potest. Nam Chamelæa ista viribus & potentia alteri similis est; quamobrem eius loco substitui potest; & eodem similiq^{ue} modo præparari.

Daphne Laureola, L.

Flod. pempt 365.

Even. herb. 1. 8.



CYBITALI & non rarò bicubitali quoq; altitudine fruticat Laureola, multiq; ramis ampla diffunditur, qui lenti sunt & obsequiosi, crassioresq; cortice vestiuntur: folia oblonga, lata, carnosæ, lævia, nigricantia, splendentia, laurini similia, sed tamen minora & haud odorata; plurima circa ramulorum fastigia, numerosissimæq; : flosculi oblongi, caui, è virore subcandicantes, infra folia : baccæ maturæ nigre, nucleo intus duro, cannabis semini, paulo longiore, medulla interior candida est. radix lignosa, lenta, longa & multiplex, altè descendens. folia, fructus, cortex tam radicis quàm ramorum, acrimonia sua & vrendi qualitate linguam & fauces mordicant, & incendunt.

Reperitur Laureola in montosis, incultis, asperis, umbrosis ac syluosis tractibus, vt apud Lemannum lacum, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosam locis.

Flores præmaturè germinant, paulo post Autumni æquinoctium; Hyeme aut primo Vere perficiuntur: fructus Maio ac Iunio. stirps est perpetuò virens, & aduersus frigora Hyemisq; iniurias obdurans.

A lauri foliorum similitudine *Δαφνοειδής* Græcè dicitur, Latini postiores Laureolam veluti minorem Laurum ex eadem causa appellant. Vocatur & *ἐν πύλαιον*, à speciosa foliorum pulchritudine; item & *χαμαίδαφνὴ* ac *πέπλον*. Alia tamen & *Chamaedaphne*, & aliud quoddam est *Pepylon*.

Huius baccas Piper montanum, veluti Chamelææ Germanica, etiam ab Italis nūcupari sunt qui affirmant. alij à Germanis etiam Zeilande dictum volunt.

Theophrasti Cneoron nigrum esse existimari posset, si

folio esset Myrica siue Tamaricis. Est siquidem ramosa & lenta obsequiosaq₃ stirps, altæ radicis, absq₃ odore, fructu nigro.

Ceterum temperie & facultate similis est Chamelæ Germanicæ, vniuersa sua substantia acris & feruida. Ducit, inquit Dioscorides, per inferna pituitosa siccum aut recens Daphnoidis folium: vomitus & menses cit: comanducatum pituitas capitis elicit: sternutamenta iidem mouet. Purgant etiã seminis eius pota grana quindecim.

DE STAPHIDE AGRIA.

CAP. X.

STAPHIDI agrie caulis est erectus, nigricans, cubito altior: folia magna, profundis incisuris, quandoq₃ septem, subinde paucioribus diuisa, vitis syluestris siue Labruscæ foliorum amula. flores Isatidis colore cerulei. sequuntur folliculi herbacei coloris, magnitudine Ciceris, in quibus semen, siue triangularis nucleus nigricans, pulpa interiore cãdida, gustu valdè acris & saluam ciens: cuius est vsus, radix inutilis.

Nascitur in opacis. In Istria, inquit Matthiolus, Dalmatia, Apulia & Calabria frequentissima prouenit. Apud Germanos non nisi in hortis sata reperitur. Maturescit & nigrescit cum vindemia.

Græcis σταφίς ἄγρια (Galenus ἀσταφίς ἄγρια legit) nonnullis τριφύλλον, σήπον, φειροκτόνοι, φθειρίον, ἀπάνθρωπον, πλουιδές, ψευδοπαδές, quæ tamen voces inter nothas referuntur. Latinis herba Pedicularis, & Peduncularia, vt Marcellus habet. Plinius lib. xxvi. cap. xiiii. vnam Taminiam nominare videtur. sed lib. xxiii. c. i. falsò vnam Taminiam dici scribit. Astaphis agria, inquit, siue Staphis, quam

quam vuam Taminiam aliqui vocant falsò. Dicitur & nonnullis Pituitaria, & Passula montana. in officinis Staphisagria : ab Italia Staphisaria . ab Hispanis Yerua pioleta, Caparas, yeruapiolheyia : à Gallis Herbe aux poulx : à Germanis Teufkraut : Belgis Lupscrupt / & Lupspcedere.

Sunt autem semina siue grana Staphidis agrie natura intensè admodum excoalscientia, acris & non absq; vrendi quidem potentia.

Crassa purgant per vomitum quindecim in aqua mulsâ trita ac data. sed qui biberant, ambulare debent; & diligenter animaduertendum, ut aqua mulsâ assidue detur, quodd pericula strangulationis adferant, et fauces inurant. Dioscorides auctor. Atque hanc ob causam à medicis, cum ad vomitum ciendum, tum ad alia intra corpus assumenda medicamenta, abdicata sunt. Plinius sed nec ad ori pituitam siccandam, eis vtendum censet; propter ancipitem, inquit, strangulationem, & quia fauces ladunt. Eadem siquidem commanducata copiosum quoq; eliciunt pituitâ; & dentium dolori hoc modo, praesertim aceto incocta, occurrunt.

Cum aceto autem trita & illinita pedunculos siue pediculos necant, & vestes ab eo tadio liberant. Dioscorides etiam prurigini ac scabiei ex oleo inuncta auxiliari refert.

DE RICINO.

CAP. XI.

RICINVS instar parua arboris citò assurgit, caulem erigens crassum, quinum senumve cubitorum, arundinis modo intus fistulosum ac concavum, aliquantulum articulatum, superius ramosum, ex obscura purpura nitentem



Ricinus Communis

Wald. p. 104. 367

tem & glabrum; candido videlicet deterſo, tenui inſtar farine puluere, quo veluti conſperſus ſubinde apparet. folia ampli ſunt, diuſa, anguloſa, ſiculneis ſimilia, ſed maiora, at nequaquam aſpera, verum leuia, è quorum alis pediculi prodeant doctantales, flores & fructus racemoſos ferentes. flores muſcoſi pallentes, citò collabuntur. fructus foris liuidus & maculoſus, interiore medulla candida, in molliſter aculeatis triquetris capitulis prouenit, quibus per maturitatem ſiſſis ac rimas faciētibz, cum impetu exilit. radix multiſida ac multis coherens fibris.

In Aegypto frequens olim fuit, & adhuc eſſe exiſtimatur, vbi ex ſemine oleum exprimitur, ſœdum cibi, vt Plinius ait, ſed lucernis, vnguentis & emplaſtris vrile. Seritur & in hortis, tū apud Germanos, Gallos; tum & alibi, non modò ad ſpectaculum, verum etiam aduerſus talparū iniuriā. quas ſerent Ricinum fugere. Annua in Germania ſtirps eſt. perſcitur eodem quo ſata eſt annò. ſemen, ſi Aeſtas calida fuerit, Autumno maturatur. In calidis regionibus multos reſtat annos, vbi in tantam excreſcit altitudinem, vt ad conſcendendum ſcalis opus quandoq; ſit: vt quidē Petrus Bellonius Singularium lib. primo tradit.

A Latinis Ricinus, à Græcis verò κρότων dicitur: ab animali cuius formam fructus eius reſert. Sunt autem κρότωνες, Crotones. inſecta quadam nullis membris diſcreta, nullum cibi habentes exitum, colore liuida, qua canibus præſertim adherent, in globum continuè creſcentia, donec plenius ſaginata ſpontè decidant. Aegypti Ricinum ρίχι nominant: Herodotus ριχιάσπιον. Plinius Trixim & Sesamum ſylueſtre dici teſtatur: vulgò Palmam Chriſti, item Cataputi um maiorem; nonnulli Pentadaſtylon appellant. Germani Wunderbaum / treutebaum, & fructum Eckenkozn: Belga Wunderboom / mollencruyt: Palme

de Christ Galli : Itali Girasole : Hispani Figuerra de Linferno : Arabicè Kerugha & Keruagh. fructum Interpreter Mesues Granum regium vocat.

Ceterum Ricini grana triginta numero, putaminibus purgata, trita ac pota, pituitam, bilē, & aquam per aluū deiciunt, & vomitiones mouent. Sed ingrata admodum & laboriosa huiusmodi purgatio, stomachum valenter subuertens. Tusa & imposita grana ibi dicitur, id est, varos & epholidas expurgant. solia cum tenuissima polenta & farina, oculorū oedemata & inflammationes sedant, mammaeque turgentes cohibent; & per se aut cum aceto imposita herysipelata restingunt: auctor Dioscorides.

Eadem ferè de granis istis Ioannes Mesues habet, sed quinq; aut septem, vel ad summum quindecim numero tantum exhibenda tradit: eademque ex iure veteris galli, coli iuncturarum & coxendicis doloribus vitia; & cum aqua casei vel lacte caprino hydropicis prodesse.

Oleum, inquit Galenus, quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quoque digerit.

Stirpem eam, quam D. Deus Iona Propheta iuxta Niniven pro umbraculo preparauit, & quae subito à verme corrosa collapsa est, Ricinum fuisse, vndeque quoque doctissimus ac clarissimus D. B. Arias Montanus in commentariis suis, in Ionam cap. 1111. euidenter ostendit, & auctor Hebraeus dicit, cui *ziku* vicinum est.

DE TITHYMALIS.

CAP. XII.

TITHYMALI genera, Dioscoride, Plinio & Apuleio auctoribus septem sunt. Primus Characias siue masculus;



Euphorbia amygdaloides, L.
 Bot. Beechey 388

Euphorbia characias, L.
Orch. pemb. - 3. 1. 1.





Dot. pens. 36p.



Euphorbia senecifolia, L.
Dodd. Pers. 369



Tithymalus myrsinites, L.
Bot. Beech. 369

Euphorbia paralias, L.
Prod. Porph. 328





Tithymalus helioscopius, L.
 Ed. Mant. 391



Euphorbia cyparissias, L.
Ord. Scroph. 39.



Euphorbia platyphyllos

Ed. Lind 392

culus; alter Myrtites siue Myrsinites, sœmina; tertius Paralius; quartus Helioscopius; quintus Cyparissias; sextus Dendroides; septimus Platyphyllos. Theophrastus tres tantum enumerat: Paralius videlicet, marem, & sœminam Myrtitem.

Characias Tithymalus.

Characias Tithymalus siue mas, caules promit cubitales, teretes & rubentes. foliis circumuesti tot tenuibus, oblongis angustisq;, & longioribus maioribusq;, quidem quàm oleæ, at amygdalinis angustioribus: una in cacumine larga, amplâ, & iunci odorati ferè modo effusa, quæ concava quadam sursum spectantia proferit vasculis siue acetabulis similia, è quibus flosculi sublutei, dein triquetri exeunt capitula parua, in quibus semina. radix dura fibras habet multas.

2 Est verò & altera huius species, foliis antedicto similis, foliis tamen durioribus. caules quoq;, nonnihil sed tamen minùs rubent. comæ altior, & qui hanc fert caulis foliis haudquaquã vt prioris exuitur; illius enim, folia ferè semper comam facientis desinunt. vascula, flores, semina & radices satis conueniunt.

3 Ad hoc genus pertinere etiam videtur non caule rubēs, sed exalbidus ac candidus Tithymalus. caules eius teretes & ramosi, cubito non rarò altiores: folia oblonga quoq;, & angusta, albida, tenuiaq;, lanugine pubescentia: umbella contractior flosculi parui, luteoli: semina trigemina in acetabulis, vti aliorum.

4 Iam & quartus quidam est Characias, foliis similiter oblongis, angustisq;, paulo quàm primi aut secundi minoribus, albicantibus etiam candidisq;, sed minimè lanuginosis. umbellæ viridi sublutea, quæ priùs quàm explicatur, oblongioris fructus, veluti amygdali, rudimentum præ se fert, concolor tamen reliquis foliis. flosculi & semina

aliorum

aliorum similia. radix altè demittitur.

Quintus Characias foliis similiter est oblongis, mucro-
natis tamen & circa annexum latioribus, & dilutiorè co-
lore virentibus, per ambitum crenatis; (vnde serrato cog-
nomen.) umbellæ angustiores sunt. acetabula, flosculi, se-
minaq; respondent.

Myrsinites Tithymalus siue scæmina, ramulos siue cau-
liculos a radice habet complures, dodrantes, haud tamen
erectos, sed plurima parte procumbentes: folia verò circa
hos brevia, lata, acuto & pungente nonnihil cacumine,
Rusci siue Oxymyrsmes satis referentia, sed lævia & can-
dida: flores in umbellis exiguis; & semina aliorum similia.

Myrsinites Ti-
thymalus.

Parathio Tithymalo, hoc est, maritimo, cauliculi quini
senive erecti assurgunt cubitales, tenues, dilutè rubentes,
quos multa, parua, angusta, oblonga vestiunt foliola, in-
star Lini; sed candida densioraq; rotunda sed minimè am-
pla in cacuminibus umbellæ; in quibus flores & semina
perinde ut aliorum.

Parathius Tithy-
malus.

Helioscopius Tithymalus teretibus, tenuibus, dodran-
talibus, nonnihil rubentibus assurgit coliculis, ampla, laxaq;
umbellæ comosis. folia habet pauca, latiuscula, breviora;
minoræ, tenuioraq; quàm Portulacæ sativæ: flosculos et se-
mina parua, effigie præcedentium. radix tenuis est. fertur
hic comam cum Sole circumagere: vnde illi nomen.

Helioscopius Ti-
thymalus.

Cyparissio foliola quidem sunt oblonga, sed perangusta,
& quàm Ezula minoris angustiora, satis ad Picea acce-
dentia, molliora tamen ac tenuiora. cauliculus nonnihil
ruber, dodrante subinde altior; ramulos effundit complures;
in quorum medio umbellæ cum acetabulis purpurascen-
tibus, floribus seminibusq; perpusillis. radix fibrosa.

Cyparissius Ti-
thymalus.

Huius & species quedam minor reperitur, palmū mo-
do alta; tenuibus cauliculis: angustissimis, oblongis foliolis;

umbella exigua; flosculis luteolis; seminibusq; minutis.

Dendroides Tithymalus.

Dendroides Tithymalus arboris specie fruticat, supernè amplius & multum comosus. ramuli eius subrubent, circa quos sunt folia tenui Myrtosimilia. fructus qualis Characie: vt quidem Dioscorides. Plinius hunc comosissimum ex omnibus maximè, cauliculus rubentibus, & seminis copiosissimum esse tradit. Bellonius verò ad duorum hominũ altitudinem crescere, et caudicem habere crassitudine cruris humani memoriæ prodidit.

Platyphyllon Tithymalus.

Platyphyllon Verbascio similẽ esse Dioscorides: Plinius verò nec vllius latiora folia esse ait. Videtur autem hic esse, quem diligentissimus ac clarissimus Carolus Clusius in Valentia Hispania regno à se repertum scribit, pedalis videlicet altitudinis, foliis circa cauliculos amplis, ad Isatidis nouellæ formam accedentibus, viridibus & aliquantulum carnosis: flore è luteo purpurascente, acetabulisq; insidente, vt reliquorum Tithymalorum.

Ex omnibus autem his succus effluit, acris, mordax, candidus, et ferè lactis similis, quacunque eorum parte vulnerata.

Reperiuntur verò Characia Myrsinites & Cyparissias in Belgij subinde hortis; alibi spontè asperis & incultis locis exeũt. Paralius maritima loca amat, ac nõ modò in Italiae aut Hispania, sed & in Hollandia, Zelandia, reliquaq; inferioris Germaniæ maritima ora, locis incultis, aridis & præaltis subinde nascitur. Hic ad hortos translatus, luxuriantibus cauliculis & in longitudinem excrecentibus, rarioribus efficitur foliis.

Helioscopius hortis olitoriiis frequenter molestus; circa vrbes & rudera etiam exit; aut circa agrorum margines; vbi & Cyparissias alter quandoq; reperitur.

Dendroidẽ in petrosis locis exire Dioscorides prodidit:

in Creta Bellonius : Aloisius in Tuscia, Liguria, & prope Masiliam. Matthiolus Dendroidem extra Terracinam agri Neapolitani urbem offendisse se referi inter sacra antiquissimi specus, planta arborescentis effigie; & in Tergestino littore haud procul Timano fonte in saxosis quibusdā rupibus. Qui tamen ab eo exhibetur, nequaquam ampla est coma aut Myrti solius, sed oblōgis & Characia amulis pingitur. Florem semeng, Tithymali aestate perficiunt; nōnulli seriūs, aliū citiūs, in quibusdam regionibus priūs, in frigidioribus tardiūs. Myrsinitis sarmentosos cauliculos nō simul, sed alternis annis fructificare Theophrastus tradit.

Latini, Plinio auctore, Lactariam & Lactucā caprinā πιδύμαλον nominant; à lacti sin illi humore, qui secto aut vulnerato folio, caule, aliāve parte defluit. Reperitur & Lactoris. Cornelius Celsus lib. v. c. vii. Lactucam marinā appellat: Lactuca, ait, marina, quæ à Græcis πιδύμαλος nominatur. Non tamen omnis Tithymalus; sed marinus ita propriè vocāndus. Tithymalū autē Itali Tithymalo: Hispani Leche tresua: Germani Wolfs milch: Belgæ Wolfs melck, i. lupinum lac; Galli Herbe à lait nominant.

Χερνίκας, i. vallis, etiam κορυττός καὶ πιδύμαλος cognominatur. κορυττός, ab effusa & ampla coma; αμυγδαλοειδής, à foliorū figura, amygdala similī. Huius tertis à nobis tradita species, ea esse videtur, quæ à Matthiolo pro Dendroide exhibetur. quartā nōnulli perperam Myrsiniten faciūt. In magno autem versantur errore, qui quintam Characiam Hippophacem esse existimant. Nam Hippophæes frutex est spinosus, foliis olea, multū à Tithymalis differens.

Hippophæes.

Myrsinitis siue scemina fructus κάπουρ, i. nux, Theophrasto auctore appellatur: vnde huic Tithymalo κορυττός cognomen: ut quidem Plinius.

- 3 Παράλι & siue marinus Tithymalus, à Theophrasto
 κόκκ & appellari refertur; à nonnullis etiam πιθυμάλις aut
 μήκων dicitur. Est autem μήκων quoq₃ papauer.
- 4 Ἡλιοσκοπιον Latini Tithymalum Solsequium aut La-
 cluriam Solsequiam vocant.
- 6 Δενδροειδὴν, λεπτόφυλλον & tenuifolium etiam appel-
 lant.

- 7 Πλατύφυλλ & à plerisq₃ κορυμβιτὴς dicitur.
 Caterùm Tithymali omnes vincentem habent acrem
 calidamq₃ facultatem, inest verò & amaritudo.

Validissimus eorum est liquor: secundum locum tenent
 fructus & folia. sed & radix dictarum facultatum parti-
 ceps, sed non ex æquo: vt quidem Galenus. Et habet quidē
 non modò Characiæ sed et reliquorum omnium succus, per
 inferna purgandi validam vim atque potentiam. Bilem,
 pituitam & aquosos humores ducit etiam in exigua quā-
 titate sumptus; sed ventriculum vehementer conturbat, et
 interna viscera inflamat; quam ob causam ab eius vsu
 docti ac prudentes medici abstinent.

Foris etiam non tutò adhibetur. vt enim vehementer
 acris & mordax, ita quoq₃ facile partem, cui illinitur, cor-
 rumpit: & tanta quidem eius vehementia, vt etiam oleo
 permixtus, quod tamen acredinem illius retundit, adustis
 pilorum radicibus, corpus depile reddat; si identidem &
 sæpe eo inungatur.

Fructus & folia tametsi mitiora, in aquam stagnalem
 iniecta celerrimè pisces in vertiginem agi ac semimortuos
 in aquæ superficiem ferri efficiunt: auctore Galeno.

DE HIPPOMANE.
CAP. XIII.

Ex Tithymalo Theophrastus de historia stirpium lib. ix. Hippomanes appellatū apud Arcades fieri refert, quod optimum, inquit, cōfici apud Tegeam nouimus, maximeq; in pretio haberi. Sed alij auctores aliter sentiunt: omnes tamen veneficium esse affirmant.

Theocritus stirpem esse Hippomanes, qua equi in furorem aguntur, ἐν τῇ φαρμακευτρῖα cecinit his verbis:

ἵππομανὲς φυτὸν ἐστὶ παρ' Ἀρκάσι. τῷ δ' ἐπὶ πᾶσι
καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν' ὄρεα, καὶ δαὶ ἵπποι.

Virgilius & Tibullus poëta, virus ab equarum inguinibus defluens, quo tempore amoris furore & insania feruntur, ita nominant; & ille quidem Georgicon lib. III. sic scribens.

Hinc demum Hippomanes, vero quod nomine dicunt

Pastores, lentum destillat ab inguine virus
Hippomanes, quod sæpe malæ legère noueræ.

Tibullus verò lib. II. Elegia IIII.

Et quod, vbi indomitis gregibus Venus afflat amores,

Hippomanes, cupidæ stillat ab inguine equæ.

Et hoc vero nomine appellari Virgilius ait, volens, interprete Seruio, herbã abusiue Hippomanes dici, ab equorum furcre & insania.

Aristoteles libro VI. de historia animalium, cap. XVIII. defluentem etiam à genitalibus equarum humorem Hippomanes appellari refert. Equæ, inquit, tempore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent, iacent caudam crebrius, vocem immutant, humorē emit-

runt suis genitalibus, similem genitura, sed multo tenuiorem quam mares, quem Hippomanes nonnulli appellant; non quod pullis nascentibus adheret. Hoc ipsum tamen quod pullis nascentibus adheret, postea cap. XXI. Hippomanes etiam esse asserit. Cum equa, ait, peperit, statim secundas denorat, atq; etiam quod fronti pulli nascentis adheret, Hippomanes dictum, magnitudine minus carica parua, specie latiusculum, orbiculatum, nigrum: hoc si quis praecepto odorem moueat, equa excitatur, furitq; agnito eo odore. Et sane equis amoris innasci veneficium, Hippomanes appellatum, in fronte carica magnitudine, colore nigro, quod statim edito partu denorat scata, partum ad vbera non admissura, si quis praeceptum habeat, Plinius lib. V. cap. XLII. etiam scribit, tamen si lib. XXVII. cap. XI. equarum a coitu virus esse concedat.

De hoc vero & Iulius Solinus Polyhistor. cap. XLVII. ubi ait, in equarum partu amoris nasci veneficium, quod in frontibus referunt recens editi, fuluo colore, caricis simile, ἵππωνες nominatum. Quod si praeceptum statim fuerit, nequaquam mater pullo vbera praeber fellicanda.

Columella Hippomanes venenum esse tradit, quod equinae cupidini similem amorem mortalibus accendat. quale autem illud sit, unde fiat, sumaturve, non explicat.

Accedit Plinius, qui Hippomanes tantas in veneficio vires habere lib. XXVIII. affirmat, ut affusum aris mixtura in effigie equa Olympica, admotos mares equos ad rabiem coitus agat.


De quo Pausanias lib. V. ubi intra Altin Olympica locum, Phormidis Menalij Olympica dona, & duos ab eo Ioui Olympio equos dicatos recenset. Incisa est, ait, in prioris equi latere, inscriptio versu nullo adstricta: Phormis posuit Arcas Menalius, nunc Syracusanus. Huic equo Hippomanes

pomanes infusum tradunt, Magi hominis astu, quò esset intuentibus miraculo. Magnitudine ille quidem & specie inferior est equis multis intra Altin positis, & deformiorè cauda præcisâ reddit : sed illum equi mares non Vere tantum, sed planè quavis anni parte appetunt. irrumpentes enim vel effractis vinculis intra Altin, vel è rectorum manibus elapsi, illum inuadunt, nihil minus furenter, quàm si viuentem pulcherrimâ equam gregalem adreretur. Hactenus Pausanias. Cuius quidem verba, & similiter aliorum veterum, occasione Hippomanis, quod ex Tithymalo fieri Theophrastus memoria mandauit, hoc loco adducta.

DE TITHYMALO TUBEROSO,
SIVE APIO.
CAP. XIII.

TUBEROSVS Tithymalus exiguos promit cauliculos, aliquantulum rubentes, tennes ac teretes; circa quos exigua & parua foliola, forma quidem foliorum Hyperici aut huiusmodi Rutæ sylvestris, at minora, Chamaesyces æmula. umbellæ in fastigiis rare, in quibus acetabula; flosculi pallentes lutei; semina asperiuscula triquetra, vi aliorum Tithymalorum; minora tamen. radix tuberosa pyri modo turbinatur; inferiore parte angustior; foris nigricans, interius candida. Manat ex hoc lacteus quoque succus, quacunque eius vulnerata aut lesa parte.

In Apulia Italia provincia gignitur, nec non in Græcia ac vicinis insulis, vt Creta, Lemno, aliisq³, & quidem illic locis montosis. Exit vno loco longioribus cauliculis; alius, tenerioribus brevioribusq³. Huius quandoque maior : illius verò subinde minor est radix. Memini siquidem me ab excellentissimo clarissimoq³ viro Iacobo Antonio Cortuso patri



Euphorbia afensis, L.
Vod. plant. 323

tritio Patavino, duas olim huius plantas accepisse. Vnius radix maior crassiorq³, folia verò & ramuli minora: alterius verò radix minor, sed ramuli longiores, & folia paulo maiora.

Hunc Tithymalum Græci ἀπὸν à figura & similitudine pyri nuncupant. dicitur quoq³ & ἰχθῆς, & à Gaza Latine Carica, quod ἰχθῆς, id est, caricam siue scū aridam radix referat: itē & χαμαῖζελαν & siue terrestris glans, & à figura quoq³. Sunt tamen & alij χαμαῖβαλάνοι Germania familiares ac edules, de quibus in historia Frumentorum scripsimus. Bellonius χαμαῖπύδα modò in Græcia Apion dici scribit.

Facultate autem & temperamento Tithymalus iste, siue Apios, vehementer calidis ac siccis est, reliquis Tithymalis similis, ac perinde quoque humano corpori molestus ac noxius.

Pars radice superior, Dioscorides ait, sumpta vomitione bilem pituitamq³ educit: quæ ad radicem inferior, per aluum. Tota vtrunque purgationes mouet.

Succus sesquiboli pondere, vtraque etiam parte purgat. Hydropicis, inquit Plinius, datur acetabuli mensura.

DE EZVLA SIVE PITYVSA.


CAP. XV.

EZVLAE duæ sunt, Maior & Minor.

Maior fruticosa stirps est. caules eius complures, teres, supra cubiti altitudinē longè assurgunt. foliis vestiuntur oblongis & angustis, Tithymali Characie minoribus. umbellæ angustiores sunt. flores seminaq³ Tithymali. radix ampla, ramosa, crassioris corticis, succe lacteo plena; vri & tota ipsa stirps est.

Minor

Saportia palustris, L.
 Prod. pempt. 374





Euphorbia esula, L.
 var. *perfoliata*, 374.

2. Minor priori similis, caules tamen eius breviores tene-
rioresq₃; folia etiam oblonga, angusta, acuminata, mino-
ra: flosculi fructusq₃ respondent; radix tenerior, lignosior,
tenuioris corticis; tota lacteo similiter succo redundat.

Reperitur maior in collibus quibusdam Germania apri-
cis circa Scaphusiam & Basileam, in Apulia quoq₃ Gar-
gano monte, Matthiolo teste. Minor asseris & incultis
nonnullis etiam Belgij locis exit. Utraque quandoque ad
hortos transfertur. viriusque vinax est radix, sed caules
Hyeme marcescunt, Vere novi erumpunt, Aestate fructus
facturi.

Ezulam alij Esulam, Arabes Alscebran aut Alscobran
& absque articulo Scebran appellant. Videtur Græcorum
πύρρον; præsertim quæ minor est. Nam hæc solis πύρρον
sive Picea satis est æmulis, Cyparissia Tithymali maioribus
latioribusq₃. Atque huius etiam maiorem reperiri speciem
Dioscorides testatur: cum videlicet fruticem hunc quibus-
dam in locis σπόδα ἐν πελάγῳ, id est, valde magnum inue-
niri tradit: satis innuens duas eius species existere.

Ezule etiam nomen à πύρρον luxatū esse potest. Sub-
latis etenim duabus prioribus syllabis, remanet ἔζον, cuius
diminutivū vsula, & mutata vocali prima, Esula. Nico-
laus Myrepsus Ezulam Chamapitten lib. de antidotis pri-
mo; compositione xxx & cxxx. nominat. Et potest mi-
nor haud absurdè Chamapitys dici, folio videlicet πύρρον
referens.

Sunt autem Ezule Tithymalorum quoque species, ve-
luti & Galenus de Pityoussa testatur. Hanc quidam, in-
quit, speciem putant esse Tithymali, quod succum habeat
ut illi, quodq₃ similiter illis purget, ceteraq₃ omnia viribus
illis sit adsimilis.

Mesues Ezulam purgatorium rusticorum esse scribit;

& maiorem viscera interna exulcerare, atq; eam ob causam perniciosam : parvam praestantior, hoc est, minus nocivam. Ipsa tamen minor acrimonia & purgandi facultate maiore haud inferior.

Vtraq; impensè calida, acris & exulcerans, ventriculog₃ molestissima.

Errant nō parum, qui cortices harum radicum, in medicamentorum compositionibus Turbith loco substituere temerè audent.

Error quorundam.

DE LATHYRI.

CAP. XVI.

LATHYRIS Tithymalorum etiam numero ascribenda; vepote tota candido & lacti simili succo turgens. caules promit proceros, altiores cubito, digiti crassitudine, intus inanes, multis alis superius ramosos. folia secundum caulem oblōga, angusta, amygdalinis similia, ceterum longiora lenioraq; ; in ipsis verò ramulis breviora latioraq;. flores in fastigiis exigui; fructus tres coherentes loculi, maiores quàm Tithymalorum, minores quàm Ricini; in quibus semina rotunda, interiore medulla candida. radix nullius vsus, fibras aliquot habet.

In omnibus autem regionibus obuia Lathyris, praesertim in hortis, in quibus nasci gaudet, & frequenter reperitur.

Ad Apis Græcis, vulgò Cataputia minor : Italis Catapuzza : Germanis Springkraut / springkorn / treikornet : Hispanis Tarrago : Gallis Espurge : nostris Springcrup & spuergie, dicitur.

Huius autem facultas asimilis etiam est Tithymalorum, vehementer videlicet expurgatoria, & acris; nisi quòd semen, inquit Galenus, gustantibus videatur dulce, quòd sanè etiam maximam purgatoriam vim obtinet.



Euphorbia pepulacea
Det. Griseb. 375

DE PEPLIO.

CAP. XVII.

DODRANTALIS herbula Peplus est, lacteo & ipse succo manans, Helioscopio Tithymalo assimilis, cuiusquæ quædam veluti species, sed omnibus partibus minor. cauliculi subrubent: folia exigua in rotunditate oblongiuscula, infernè maiora, supernè minora: coma circumata: semina tribus loculis discreta, sed minuta; radix tenuis, fibrosa. In hortis & vineis exit, & subinde in agris neglectis aut non cultis.

Æstate viget, in Hyemem usque perdurat. Colligitur inquit Dioscorides, mensibus, siccaturque in umbra.

Πέντα. & Græcis appellatur; vulgò Eryula rotunda. Ruellius Vineale Renelium à Gallica dictione nominat. Gallis siquidem est Reneille matten de veignes: Germanis Teufel; milch. Dicitur & σύκη & μικρὸν ἀφρώδης, ut quidem inter notha ascribitur. In linguarum verò Hippocratis expositione etiam χαμαίσυκη. Est tamen omninò alia χαμαίσυκη, de qua mox.

Facultatem autem Peplus reliquis Tithymalis, quorum & species, assimilè obtinet, calidam videlicet, acrem, mordacem, & cum violentia expurgatricem. Testatur Galenus lib. de simplic. medic. facult. his verbis: Peplus quidam verò μικρὸν ἀφρώδης, & hic frutex parvus succum habet similem Tithymali, cum in aliis, tum quia purgat, ceu illi.

DE PEPLIO SIVE PEPLIDE.

CAP. XVIII.

Accedis Tithymalorum & Lactariarum generibus & Peplion humi procumbens, & nequaquam aliarum modo assur-



Peplion sive Peplis
rad. (Linn.) 376

assurgens herba, & Lacteo similiter succo turgida. ramuli eius teretes, subinde purpurei, quandoq; herbacei coloris. folia Pepli & Portulacæ sylvestris æmula, sed prona parte rubentia. semen exiguum in triangularibus parvis valvulis veluti Pepli, sub foliis reconditur. radix pusilla.

In maritimis, ut Dioscorides ait, maxime nascitur.

Appellatur verò non modo *πέπλιον*, verum & *πέπλις*, et utroque quidem nomine à similitudine Pepli. Dioscorides *πέπλις* nomen ad Hippocratem refert, ab alio & *ἀνδράχην ἄγρια*, id est, Portulacæ sylvestris, dicitur, quòd scilicet Portulacæ huius modo sparsum per terram repat, foliisq; ipsam referat: eam nempe quæ spontè & non sata in hortis & alibi gignitur.

Respondet Peplion istud viribus reliquis Tithymalis. Dioscorides etiam colligi, reponi, dari & condiri Pepli modo ait: Galenus succū habere validum non admodum utilem: semen utilius, sed *πυρρῶδες*, hoc est, feruidum, similiter Pepli modo purgans. Exemplaria Galeni *πυρρῶδες*, id est, flatuosum habet, sed nos Cornarj emendationem amplectimur, & *πυρρῶδες* legimus.

DE CHAMÆSYCE.

CAP. XIX.

CHAMÆSYCE supina humi procumbit, & Peplidis modo nascitur, ramulis tantummodo numerosioribus tenerioribusq; qui teretes, rubentes, et in rotundi orbis speciem dispersi iacent. folia perpusilla, Pepli minora, rotundiuscula, lentibus ipsis forma & magnitudine paria, sub quorum alis fructus tricocci exigui. radix tenuis est. candidum & lacti similem succum hæc herba non minus quàm Tithymali vulnerata emitit, ipsorum etiam generi

affri-



L 4

Entolobos ghamæsyce
Endl. f. camp. 387

ascribenda. Reperitur, ait Dioscorides, in squalidis, aridis & petrosis.

Χαμαίσυκην appellant, id est, humilem Sycen. Dicitur autem σύκη non modo sicus, sed & Peplus, ut iam antea meminimus: unde Chamæsyce, quasi humilis aut terrestris Peplus, quem folio & facultate omnimodè refert. Appellatur verò hæc etiam μύκων ἀπρώδης, veluti ipse Peplus.

μύκων ἀ-
πρώδης.
ὑρακλεία.

Μύκωνα autem ἀπρώδην Dioscorides herbam esse tradit ab aliquibus ὑρακλείαν appellatam: caule dodrantali: foliis valde exiguis, σπεθίς siue Lanariæ herbe: & fructu iuxta ipsa candido: sed & totam herbam ipsam albam & spumeam. De eadem & Theophrastus lib. ix. Meconem Heracliam folio asserens esse Struthij, quo lintea candidantur, fructuq; albo. Sed totam herbam candidam esse non adiecit. Purgandi vim vterque huic Meconi tribuit, & vomitione expurgare: comitialiq; morbo obnoxiiis hæc purgatione prodesse. Suspiciari hinc posset aliquis, non aliam esse μύκωνα ἀπρώδην et ὑρακλείαν, quàm vel Peplum vel Chamæsyce, & separatis locis, sub diuersis nominibus de eadē stirpe Dioscoridem egisse: nisi ipse Theophrastus hūc scrupulū videretur eximere. qui μύκωνα hanc in numero aliarum μυκωνῶν, id est, papauerum habet, & post κεραττὴν ac ποιάδα reposuit. quod legitimam μύκωνα ἀπρώδην siue ὑρακλείαν, papaueris esse speciem, & propriè Papauer spumeum Latinis dici ostendit; & à Peplo & Chamæsyce differens.

Est autem Chamæsyce viribus reliquis Tithymalis assimilis. Galenus abstergerendi simul & acrem, ait, vim possidet. Itaque acrochordonas & myrmecias, caules eius teneriores in modū cataplasmatiss admoti, quiq; ex eis profluat liquor, auferunt.

Quod quidem & reliqua omnes Lactaria enumerata possunt,

possunt, sed quemadmodum iam antea monuimus, vsus earum periculo non caret, veluti neque huius.

DE EUPHORBIO.

CAP. XX.

EUPHORBIO oblonga, crassa, & virentia sunt folia, in rotunda ac tereti figura angulosa. Cucumerem vulgò, sed Galeno Melopeponem nuncupatum referrent, si non anguli, & eminentiores, & albicantibus spinis plurimis, duplici ferè ordine, obsiderentur. Effluit ex his vulneratis liquor vehementer acris & mordax, facile concreescens.

Dioscorides Euphorbium, inquit, Libyca arbor est, *υεφ-
δινοςειδης*, id est, serulacei generis, aut serula speciem referens, quæ in Maurousiorum Tmolo reperitur, succo refert. & acerrimo; quem cum timore colligunt eius regionis homines, ob eximium eius feruorem.

Plinius herbam esse Euphorbium ait, & è monte Atlante extra columnas Herculis portari.

Differentes autem & multum dissidentes montes Tmolus & Atlas sunt. Nullus Tmolo nomine in Libya, aut Mauritania mons à Geographis refertur. Est Lydia mons Tmolus in Asia minori. Potest in exemplaribus Dioscoridis pro Atlante perperam Tmolus substitutus esse.

Græci pariter cum Latinis *εὐφώριον* vocant. Plinius vno loco herbam feminino genere, Euphorbiam appellat. Succus etiam Euphorbion, & quidem officinis quoque, est.

Iuba Regi Ptolomei patri, qui primus vtrique Mauritania imperauit, inuentio huius ascribitur, à cuius medico Euphorbo nomen accepit.

Natum fuit anno M. D. LXX. Bruxella in amœnissimo ac diuissimo horto Io. Boisseti, viri, ut generosissimi, ita do-

Euphorbia affinis L.
Bot. Penins. 398.





Cacalia Antevphorion, L.
Ed. Pers. 378

Etissimii. à quo vnum terræ commissum folium, in plura multiplicatum est, & radicem demisit in obliquos ramulos diuaticatam.

Ioannes Leo in *Aphrica historia* lib. ix. ex vno folio, aut vt ipse nominat, fructu, xxv. aut xxx. quandoque prouenire scribit; è quibus maturis & vulneratis succus effluat Lacti similis, qui lentorem contrahens concreascit, atq; inde colligatur.

Euphorbium autem, succus nempe concretus quo utimur, vehementer calidus, & vt Galenus ait, caustica siue vrentis facultatis & tenuium partium est: quarto quidem ordine calidum & siccum.

Cum oleo violæ luteæ, vt quidem Mesues, sed & alio quouis, vel etiam vnguentis permixtum, refrigerata citò calfacit: aduersus stupores, tremores, conuulsiones, nervorum resolutiones conuenit: prodest etiam contra diuturnos coxendicium dolores.

Intrò assumptum, vt Aëtius, Paulus, Aëtuarus, et Mesues referunt, aquas & pituitam per inferna ducit; sed vnâ quoque non modo fauces ac os, sed & ventriculum, iecur, reliquaq; viscera accedit, exurit atq; erodit, vniuersumq; corpus inflammat.

Obid, inquit Mesues, minus tenuiter terendū, & permiscendum eius acrimoniam obtundentibus, calorem remittentibus, & lubricantibus: quorum tantam esse oportet copiam, vt eius superficies vndequaue contegatur.

Sed difficile est Euphorbium, aliis ita vel inuoluere, vel permiscere, vt non exurendi suam vim exerat. Nam & plurimo contemperatum oleo, subinde foris inunctum, vesicas excitat; corpore præsertim mollioribus. quam ob causam tutius est intrò corpus non admittere.

Tunditur ipsum etiam cum molestia, nisi naribus diligenter

genter obstructis ac communitis. Si quando enim acrimonia eius ad nares peruenerit, mox pruriginem, sternutationesq; excitat, ac deinde ardere intenso, copiosum pituitam ac muccum, tandem verò & sanguinem elicit: lachrymis non deficientibus.

Aduersus autem Euphorbij acrimoniam, remedio indigenus fertur esse herba, quæ ab effectu & contrariis facultatibus Anteuphorbij nomen accepit. Cauliculos hæc emit ἀντεὺ φόρ-
βιον. cōplures, rotundos, virentes; atque circa eos folia quæ Portulacæ. radix multas quoque habet propagines. succo & hæc abundat, sed nequaquam acri, verùm lento & refrigerante, ardorem ac acrimoniam Euphorbij retundente.

De hac veteres scripsisse nondum obseruare licuit. Videtur tamen ad Telephij species referri posse.

Crenit & istud Anteuphorbion doctiss. Ioanni Boisorto, eodem quo Euphorbium anno: atque vnà cum eodem periit.

DE TRIPOLIO.

CAP. XXI.

TRIPOLIO nostro folia exeunt oblonga, lata, leuia, virètia, crassiuscula, Glastii foliis perquàm similia. caulis rectus, dodrante altior, fastigio in alas diuiso; in quibus flosculi elegantes, medio disco lutei, orbiculato verò ambitu carulei, Asteris Attici florum æmuli, qui in pappos candidos contabescentes abeunt. radix oblonga, cortice induratur crassiusculo.

Nascitur, inquit Dioscorides, Tripolium locis maritimis, quæ vnda alluit, recedensq; demittit. Ac talibus quidē in Belgij quibusdam maritimis nostrum reperitur: vt in
Zelan.

Zelandia insulis. Neque videlicet in mari, neque in sicco, sed locis, quæ æstuans mare allidit, recedens, refluens, retroq³, commeans deserit. Translatum ad hortos diutine viget, sed luxurians grandescit, & in fibras radices commutat. Aestiuus mensibus flores facit.

Fabulosum est, quod à Dioscoride ascribitur, tradi nēpe vno die ter colorem floris eius mutari; & manē album, meridie purpureū, vesperti ποικίλον, id est, phæniceum. Sed tamen tres florum colores vno die reperiri posse, veritati haud repugnat. Nam cū flores, omnes nō simul, sed partitūtim & sensim perficiantur, tres facile contingit florum colores obseruari: incipientium nempe, completorum, & deficientium. Nondum patentes aut completi, subpurpurei sunt; perfecti patentesq³, quales scripsimus; deficientes papporum candidam ostendant lanuginem.

Τριπόλιον, à nonnullis etiam Ἰνχὴν, ab aliis μύρις appellatur: vt quidem inter nothas voces refertur, posset Aster marinus, aut Amellus marinus non ineptè dici. Arabs Serapio Tripolium Turbith nominat, & post eum Auicenna. Actuarius tamen Græcus, Alypi siue Alypia radicem Turbith esse existimat. Mesues verò herba ferulacea radicem iudicauit. Habent officina & suū Turbith non modò à Tripolio, verū & ab Alypo differens, nequaquam etiam ferulaceum. Quod à Garcia ab horto proregis India medico in Aromaticum historia, quam clariss. ac doctiss. Carolus Clusius Latinam dedit, describitur, ex qua historiam eius in subsequens transtulimus caput.

Caterū Tripoliū radix, vtī Galenus ait, gustanti acris est, et facultate calida in tertio excessu. Dioscorides radicē in vino potam duarum drachmarum pondere, per alium aquam ducere refert: itemq³, vrinam. Conciditur etiā ad alexipharmac.: siue venenis resistentia medicamenta.

TURBITH planta est radice neq³ magna neque longa. caulis dodrantalis subinde longior, digitalis crassitudinis, hederæ modo per solum repit. folia profert Althea: flores etiam similes è candido rubentes, nonnunquam omnino exalbidos.

Utilis autem medicinae caulis duntaxat pars inferior, radici proxima, quæ gummosa. Atq³ huius cortex est, quæ officina ostendit; crassior videlicet quidam ac inanis, caudicis inferioris exterior cortex, medio exempto.

Laudatur vacuum, arundinosum fragile & plani corticis Turbith: deinde cui gummi adhæret concretum, quod gummosum dicitur; & albidum.

At gummosum non est semper sua natura, Garcias ait, sed Indi, quia viderunt à gummositate optimi Turbith notas à nostris peti, solent eius stirpem ac cauliculos prius quam colligant, aut contorquere, aut leuiter vulnerare, ut liquor efflueret. quo tandem densato atq³ concreto, cauliculos gummosos auferunt. Reperitur verò & quandoq³ absque contorsione gummosum factum, sed tamen, quò facilius liquor emanare posset, vulnerari ac contorqueri solet. Candidum etiam fit, eodem auctore, in Sole resiccatur: in umbra etenim nigrescit.

Prouenit in maritimis, verum non aded mari vicinis locis, ut vnda eius allui queant, sed duabus aut tribus inter dum à mari leucis sine miliaribus distantibus; & quidem in incultis & potius humentibus quam siccis.

Nascitur autem in Cambaya, Surrate, Dio insula, Bazaim locisq³ vicinis, & in Guzarate, vbi plurimum, atq³ vnde magna copia in Persiam, Arabiam, Asiam minorem,
&

& Lusitaniam effertur. Praefertur autem in Cambaya natum.

Arabibus, Persis, & Turcis Turbith appellatur: in Guzarate verò Barcaman; in Canara prouincia, cuius ciuitas Goa, Tiguar.

Habetur ab Indis medicis pituitam deiiciens ac expurgans medicamentum; cui si febris abest, adiicere solent Zingiber; alioqui absq³ hoc ex decocto pulli gallinacei aut cum aqua exhibent.

Mesues Turbith calidum esse refert ordine tertio, & crassam lentamq³ pituitam vacuare, atque hanc è ventriculo, thorace, neruis, atq³ remotioribus artubus educere; sed tardioris facultatis esse, & ventriculū subinde eo subuertere perturbariq³, quo circa zingiber, mastichen, aliaq³ aromata ei permiscenda; addi & oleum amygdalorū dulcium, vel ipsa amygdala, aut saccharum, ne corpus huius vsu extenuaretur aut emacresceret: ab aliis item cum palmulis, amygdalis dulcibus, aliisq³ temperari, inde componentibus antidotum (elactarium aut electuarium officinae appellat) quod *drachma* dicitur, officini ipsis et medicis exercitatis in vsu frequens.

Datur ipsius Turbith drachma (plus minus) vna, ad summum due. In decocto verò aut diluto tres quatuorve admittantur.

DE EBULO.

CAP. XXIII.

EBULVS foliis muscario, fructuq³ sambuco persimilis est, sed caudicem non facit lignosum; caules tantummodo herbaceos profert hybernis mensibus contabescentes. angulosi hi sunt, ac frequentibus articulis geniculati, sambuci

buci nouellis ramulis ac propaginibus respondentes. folia ex interuallis geminata, ampla, ac veluti sambuci ex pluribus ad crassum neruosum pediculum commissis coalescunt, quorum singula oblonga sunt, lata, & margine serrato amygdalinis ampliora maioraq³. flores in umbellis candidi. fructus siue acini subrotundi & rutilo colore nigricantes, in quibus semina parua oblonga. radix longa, digitalis crassitudinis, minimè lignosa.

Exit passim locis humetibus, incultis, sectus vias et margines agrorum, pingui latoq² solo: aridum, sterile, siccumq³ respuit.

Flores Aestate, bacca Autumno maturantur.

Græci χαμαιάκτῃν, id est, humilem sambucum, nominant. Dicitur & ἐλισσακτὴν, ἄγριον ἄκτῃν, καὶ ἐνδοικὴν. Latinis est Ebulus & Ebulum: Germanis Artich: Belgis Hagedich: Gallis Hieble: Hispanis Yezgos.

Temperamentum autem Ebulus calidum quidem ac siccum, utrumq³ ordine tertio; & facultatem non modò, quam ei Galenus tribuit, digerendi exiguam; sed & purgandi per aluum eximiam et validam habet. efficacissimæ radices sunt. folia digerendi ac discutiendi potentia præstant.

Educunt autem radices non modò pituitam, verum et aquosos potissimè humores: vtilis idcirco ad hydropicorū purgationes: sed tamen correctæ & vbi vires suffecerint. Purgant enim cū molestia: ventriculum subvertunt: interioraq³ viscera omnia perturbant. Malè omnibus vsus earum succedit, quibus hepar obduruit; ut quando ex regio morbo Ascites successit. Quamobrem nec temerè, nec nisi valdè robustis ex Ebuli radicibus medicamentum, aut potio danda. Decoquitur in vino radix, si causa morbi frigida, & febris abest: aliàs pro affectus natura temperanda

potio est. Expurgant & acini & semina, sed clementius multo ac minori cum molestia, praesertim prius aceto infusa, ac deinde semine anisi vel aliis aromatis una permixtis.

Foliis tumores oedematosi discutiuntur, cataplasmati vel somenti additis.

Dioscorides Ebuli radices vterum ait mollire, aperire, & affectus circa ipsum corrigere, ad infessus decoctas: folia recentia & tenera inflammationes mitigare cum polenta imposita; commodè item ambustis & canum morfibz imponi: auxiliari podagricis cum adipe taurino aut hircino.

DE CUCUMERE SYLVESTRI ET ELATERIO. CAP. XXIII.


SYLVESTRIS Cucumis humi prorepentibus sarmentosis caulibus & subrotundis foliis sativum amulatur; & eum quidem qui Galeno sativus est (vulgò Melonem appellant) vtriusq; tamen asperioribus. flores sublutei sunt: fructus oblongi, asperi, oblongis glandibus maiores, alioqui forma satis similes, sativis verò Cucumeribus longè minores; qui maturi vel vltro, vel leuissimo contactu defiliunt, semen cum liquore eiaculantes: radix crassa, candida, multiplex. Tota stirps vehementer amara, veluti & reliqua omnia sylvestria Cucumeraria.

Elaterium.

Paratur ex fructu huius Elaterium dictum medicamentum, cuius colligendi cōficiendiq; rationes ac modos Dioscorides pluribus verbis refert.

In plerisq; calidis regionibus in ruderibus, sabulosis aliisq; incultis locis reperitur. apud Germanos hortensis. semel autem satus, pluribus inde annis facile renascitur;

non



M 2

Cucumis sylvestris, L.
 Ord. pump. 382

non tamen è radice reuirescens, sed ex seminibus sparsis proueniens.

Circa Autumnum fructus maturantur; atque eo tempore, ad Elaterium conficiendum colligendi.

Græcis est *τίκτος ἄγριος* : Latinis agrestis & erraticus Cucumis etiam appellatur : officinis Cucumer asminus. Sunt qui Cucumerem anguinum vocent. Sunt tamen inter satiuos & hortenses vulgò habitos Cucumeres oblongi ac recurui, quos anguinos cognominant. Italis Cocomero saluatico : Hispanis Cogumbrillo amargo : Germanis *Wild cucumer* : nostris *Wilde conommeren* : Gallis *Concombre sauua*ge dicitur. Elaterium siue ἐλατήριον officina corrupta voce Elacterium nominant.

Est autem densatus iste succus ex secundo ordine excalsfacientium, Galeno teste, & subtilium partium. exter-
gendi item digerendiq; vim obtinet.

Folia Cucumeris syluestris, radices earumq; cortices, uti vehementer amara, ita similiter quoq; excalsfaciunt, et abstergunt, sed minùs tamen quàm Elaterium. Expurgat autem istud Elaterium bilem, pituitam aquososq; humores; & quidem valenter; ac non modo per inferiorem ventrem, sed quandoque per superna.

Modus Dioscoridi est à semiobolo ad obolum, pro vitium portione.

Cit idem menses in pessa subditum. Naribus cum lacte infusum oculorum in morbo colorem emendat.

DE COLOCYNTHIDE.

CAP. XXV.

COLOCYNTHIS per humanam strata Cucumera-
riorum modo reperit, eam quem Citrulum Cucumerem no-
stra

stra atas appellat proximè referens, cuius & sylvestris est species. folia eius lata aliquot incisuris dissecta, flores in luteo pallescunt. fructus globosus cortice integitur tenui, lutei ubi maturunt coloris, quo ablato interior candida spongiosa medulla ad medicinæ usus resiccatur; unà cum in cæcis conditis seminibus parvis, & sordentis coloris. Ingentis amaritudinis hæc medulla est; similiter & semē, totaq; ipsa omnibus suis partibus stirps.

In calidis regionibus seritur & perficitur Colocynthis; sed in Germania ac Belgio agrè ad maturitatē peruenit.

Appellari solet à Barbaris ac in officinis Coloquintida. Græcis est κολοκύνθις, & quandoq; σικωνία. Atque hinc Hierà διασικωνίας aliquādo inscripta reperitur, quæ aliàs διακολοκυνθίδος & dicitur. Est tamen & σικωνία Cucumis agrestis, de quo præcedente capite. Latini interpretes pro Colocynthide crebrò Cucurbitam reddūt sylvestrem. Differens tamen hæc à Colocynthide est. Cucurbita siquidem sylvestris Græcis κολοκύνθος αἴγρια vocatur, & satiua similis est: scandit ut satiua vicina adminicula: folia eius similiter lata & indiuersa. fructus parvis cucurbitulis similes, duri ac lignosi admodum corticis. medulla interior aded succulenta, ut resicari nequeat. amara interim tota, uti Colocynthidis & agrestis Cucumeris.

Cucurbita sylvestris.

Est autem Colocynthis veluti tota sua natura, omnibusq; suis partibus amara, ita calida quoq; ac sicca secundo gradu eorū intensio. atq; idcirco expurgare, abstergere, aperire, & quæcunq; amarissima efficere posset, nisi validior eius per inferiorem ventrem euacuandi ac purgandi facultas reliqua eius opera, ut Galenus ait, præuerteret.

Tam valenter siquidem hanc vim exercet, ut non modò pituitam & bilem citissimè copiosissimèq; educat, verum & ab intestinis, venarumq; mesentericarum osculis re-

feratis, sanguinem & cruenta subinde eliciat. Ita vt hac de causa nec temerè, nec nisi grauissimo aliquo vrgente morbo, ea sit vtendum; neq; etiam nisi lento aliquo ac glutinoso permixta, quo videlicet vehementia eius reprimatur; malefica vis obtundatur; & celerius per aluum permeante, intestina minùs abradantur. Admisceri Mastiche aut gummi Tragachanta, Mesues admonet.

Formantur & ex ea pastilli cum Mastiche, gummi Arabico ac Tragachanta, et Bdellio. Ex his Mastiche etiã adstringentis facultatis euidenter particeps est. Præstant autem lenta ac glutinosa, adstrictionem nullam aut exiguam habentia. Adstringentibus siquidem huiusmodi valida ac fortissima medicamenta coercita ac refrenata, maiore deinde violentia ac molestia, vim ac facultatem suam peragunt. Quæ verò adstringentia permixta nõ habent, faciliùs minoriq; cum labore opus suum perficiunt. Quales sunt Pilulæ, à Rhasi lib. ix. ad Almanzorem Niacæ appellata. Quæ cõponuntur ex Colocynthide & Scammonio duobus fortissimis; ac tercio Sagapeno, quod lentore suo intestina oblinat, & ab vtriusq; iniuria defendit.

Quæ quidem compositio tametsi fortissima, & qua nec temerè, nec citra vrgentem vehementer necessitatem vtendum, facile tamen ac citra magnas molestias expurgat, & cum minoribus torsionibus, quàm plerq; mitiora clementioraq; medicamēta, Mastichen aut alia quæ adstringunt, admittentia.

Atque h. inc ob causam verisimile est à Cochiis catapotiis Galenũ lib. i. de medicamentis secundum loca, Mastichen & Bdellium reiecta voluisse, quæ tamen præceptor eius Quintus iisdem addere antea solitus fuerat.

Vtilis autem Colocynthis non modò ad purgationes, in quibus Vertigini, Hemicrania, Cephalæ, Apoplexi, morbo

comi-

comitiali, Asthmati, intestinorum cruciatibus, aliisq; pertinacissimis morbis succurrit; verum & foris nequaquam aspernandas vires præstat.

Valet ad aurium tinnitus & sorditates oleum cum ea decoctum. idem lumbricos & ventris tineas interimit ac pellit, aluumq; non raro mouet vmbilico imoq; ventri admotum.

Acetum quod eius decoctionem admisit, collutione dentium dolores sopit, auctore Mesue.

Semen ad mortuorum corporum conseruationem ac condituram vtile; præsertim Aloë & Myrrha admixtis.

DE HELLEBORO SIVE
VERATRO ALBO.
CAP. XXVI.

VERATRI apud veteres duo genera sunt: Album, & nigrum.

Sunt autem albo Veratro folia magna, lata, maioris siue latifolia Plāraginis, aut potius Gentiana similia, maiora, magis venosa, lirate striata, ac quasdam plicas habentia: rectus & ferulaceus caulis, prælongus, multis inferius foliorum tunicis obuolutus, quas inarescens demittit; superius verò plures proferens spicas; in quibus flores non magni, è senis angustis striatis foliolis herbaceo colore candicantes; quorum singulis tres aut quatuor succedunt angustæ, parue siliquæ veluti sēsami. in his semen latum & candicans. Radix crassa, candida, haud longa est, cū multis adherentibus fibris, quibus etiam subinde propagatur.

Huius & alia species est floribus nigricantibus, foliisq; caulem præsertim amplectentibus, angustioribus; alioqui antecedenti similis.

V. album, L.

Arch. pharm. 383



Gaudet Veratrum album montanis & asperis; & non modò in Græcia, Italia, aut aliis calidioribus regionibus, verùm & in Germania ac Heluetiorum montibus vires. vivit & in hortis.

Floret Aestate; mēsis aut sub Autumnnū legendæ sunt radices.

Nominatur Græcis ἐλλέβορος λευκός, & quandoq; citra aspirationem ἐλλέβορος λευκός: Latinis Veratrum album. Sunt qui ἀσκήδα, ἄτομον, πηνάτοραξιν, γόνον ἡράκλῃ, πολυείδον, ἀναφύτον etiam nuncupent: aliis Sanguis Herculis dicitur: Germanis Weiß; nies; wurtz: nostris Witte nieswoztele: Italis Elleboro bianco: Hispanis Verde gambre blanco, & yerua de ballesta: Gallis Ellebore blanche.

Ex tertio est ordine excafacientium ac desiccantium, auctore Galeno.

Vomitione purgat; varios humores educit; & quidem magna cum vi & molestia summa. quocirca dari non debet, nisi vbi longi valentesq; morbi sunt, spesq; ex aliis remediis adempta sit: ut Paulus Aegineta scribit. apud quē & nonnulli exhibendi eius ac propinandi modi extant. Sternutationes huius radices pulvis quoque excitat, naribus exceptus; & inter πνευματικά siue sternutatoria valentissimus est.

Dioscorides Veratrum istud menses etiam ducere, & fœtus enecare in pessa appositum refert; & mures interficere cum melle & polenta subactum. Plinius phthiriasin hoc emendari addit.

Serapias helleborine, L.

Det. pamp. 384

S. latifolia, L.

Det. hist. 2.13



DE HELLEBORINE.

CAP. XXVII.

VERATRUM album effigie refert Helleborine, ea de causa à nobis appellata, sed humilior tamen ac minor multo. caulis eius erectus ad pedis ferè altitudinem assurgit: folia lata, similiter venosa & striata, vii Veratri albi, sed paruula. flores secundum caulem ordine quodam digesti, foliacei, albicantes medio aliquantulum prominente subluteo, quibus oblongæ non tamen magna succedunt veluti siliquæ, aliquantulum striatæ, in quibus semina minutissima. radices subsunt fibrosæ, Veratri albi tenuiores.

Reperitur locis haud siccis ac umbratis; & cū flore quidem Iunio ac Iulio.

Helleborinem non improprie dici ac nominari posse, ipsa cum Veratro albo similitudo testatur. Nam Sylvestre ac spurium quoddam eius genus esse videtur.

Dioscorides quidem ἡλληβορίνην δαμνίσκον λέγων, hoc est, paruum fruticulum esse ait, habentem ἐλάττω φύλλα, id est, minima folia. Plinius verò lib. XXVII. cap. IX. Helleborinem parvam tradit herbam, exiguis foliis. & lib. XXIII. cap. XX. parvis foliis. Et parua quidem nostra hæc Helleborine, & herba, & δαμνίσκος. δαμνίσκος siquidem herbam cuius cauliculus rectus assurgit, etiam si unicaulis sit, Dioscorides non raro nuncupat. Nam & Polygonaton quod singulari caule, & attollitur, & nascitur, δάμνον facit. πολυγόνατον, ait, δάμνον μάλιστα πύρεον. folia autem huius non quidem minima sunt, sed comparatione Veratri albi parua re vera sunt, ac dici debent. Et Plinius non minima, sed exigua & parua tantum esse scribit. Ostendunt & hæc nostra Helleborines, cum ea quæ à Dioscoride ac Plinio describitur, similitudinem maximam, sed tamen legiti-

legitimam esse, in tanta ac tam obscura veterum breuitate, difficile fuerit affirmare.

Dicitur autem Helleborine Dioscoridi ac Plinio etiam ἐμπαικτὶς, sed vnde hoc illi nominis, non patet. Veratrum album etiam ἀσπίς reperitur, vt diximus, appellatum. Si pro ἀσπίς legi posset ἀκτὶς, existimari posset ἐμπαικτὶς, quasi ἐπὶ ἀκτὶν dictam, quod videlicet Veratro albo superaddatur. Vt etenim Theophrastus lib. ix. miscetur in potione ex Veratro albo, vt vomitio bene succedat, Helleborines semen. πῦτό δ' ἐστὶ πικρόπικρον, addit, id est, hæc herbula quadam est. Atque coniecturam ita facere, sed certi assequi nihil datur: veluti etiam haud constat eandem Theophrasti & Dioscoridis Helleborinem esse. Dioscorides siquidem, vomitionem adiuuare eam, quod Theophrastus asserit, non scripsit; sed tantum aduersus lethalia medicamenta, & iccinoris affectiones bibi. Plures autem esse possunt Helleborines. Nam & Centaurium minus superius diximus Helleborinem quoque appellari.

Ceterum nostræ Helleborines qualis sit temperies aut facultas, compertum nondum habemus.

DE VERATRO NIGRO.

CAP. XXVIII.

VERATRI nigri tria sunt genera, præter illud tamen quod à Dioscoride describitur.

- I Primum folia promit ex pluribus collecta, quorum singularia oblōga, lata, lauia, & duriuscula sunt veluti Lauri, sed margine vtrinq; à medio sursum versus serrato: caule caret. flores in pediculus palmum altis è radicibus erumpentibus, magni, initio albidis, deinde purpurascens, postremò virentes, cum videlicet è mediis staminibus lu-

teis



Helleborus niger L.
ord. perib. 388



Veratrum nigrum
Bot. temp. 388

reis exorta siliqua increuerint. Quatuor aut quinque coniuncta Sesami modo ha nascuntur; in quibus semen. Radices subsunt multis crassis nigrisq₃ fibris capillata; in quibus medius tenuis neruus.

Alierius Veratri folia prioris emula sunt, sed angustiora, nigriora, ambituq₃ toto serrato. caulem istud habet ² pedem, plus minus, altum, in ramulos cacumine diuiso; à quibus flosculi deorsum nutantes dependent minores; colorus è pallido herbacei. radices fibrosa aliquanto tenuiores, minus nigricant.

Tertium Veratrum caules habet proceriores & subinde crassiores: folia quàm secundi angustiora, quorum & ³ ambitus vtrinq₃ serratus: flores magnitudine secundi: siliqua parua sesamacea: radices fibris multis vti aliorum coherentes subnigricantesq₃.

Nascuntur Veratra hac in montibus asperis & petrosiss. Duo posteriora in Germania ac Belgio frequentiora.

Floret primum circa natalem Dominicum, si Hyems clemens mitiq₃ fuerit; aliàs mox soluto gelu: proximum genus paulò serius: tertium circa Ver, & ipso Vere.

Veratra autem hac esse nigra, satis inter recentiores cōuenit, sed tamen ad quem veterum auctorum referri debeant, non aequè expeditum. Differentes siquidem Veratri nigri descriptiones penes hos reperiuntur. Theophrastus siquidem folio laurino Veratrum nigrum esse ait, & fructu sesamaceo. Dioscorides verò foliis Platani ac Sphondylii, Cniciq₃ semine ipsum depingit. Qua vt evidentem differentiam; ita & hac Veratra, ad Theophrasti accedere, cū Dioscoridis verò Veratro parum conuenire ostendunt. folio siquidem Laurum, & potissimum primum, fructu verò Sesamum referunt. vti nigrum Veratrum facere Theophrastus scribit: Platani aut Sphondylii folium nequaquā
(vt

(vt Dioscorides) *amulantur*. Appellatur autem *Veratrum nigrum* Græcis ἐλλέβορος μέλας. à nonnullis μελαμπόδιον item: πολύρριζον, μελανόρριζον, πρῶτον, κυράνιον, aut potius ἀντικυράνιον, ἑκτομον, aut ἑκτομον: Italis *Elleboro nero*: Hispanis *Verde gambre negro*.

Appellatur verò *Melampodion*, quia *Melampodem* inuentorem habeat, qui *furentes Præti filias* primus eo purgasse, & ad sanitatem mentis restituisse creditur. Hunc *Dioscorides* pastorem; alij diuinationis peritum tradunt.

1 Quod autem inter hac genera primum, vulgò à Germanis *Christwurtz*, & à nostris *Heplich kerstcrup* nominatur; idcirco videlicet, quòd *Hyeme clemente* circa natalem Domini nostri Iesu Christi diem floreat.

2 Alterum genus *Pseudohelleborum* & *Veratrum nigrum* adulterinum ante nos etiam *Fuchsius* nuncupauit. Pleniꝰ Consiliginem esse volunt; quia huius radicibus iumentorum quadrupedumq; morbis nostræ ætatis agricolæ medeātur, haud dissimili quàm Consiligine veteres *Mulomedici* modo: vnde & à nostris *Diercrup* dicitur. Sed idem possunt & *Veratri albi* radices; vt quidem *Abserytus* & *Hierocles* Græci *Hippiatri* tradunt; vti latius in cap. de *Buphtalmo*, in *florum historia* scripsimus.

3 Tertium genus Germanis *Reulzkraut* nominatur, i. *Peduncularis*, pediculos etenim interimere creditur. Placeat nonnullis *Aconitis* istud genus annumerari. Neq; enim pediculos tantum, sed, veluti *Aconitam*, & oues aliq; animalia necare comesum fertur. Verum hoc non modò istud, sed & reliqua *Veratra nigra* possunt: qua de causa & inter *Veratri* genera hoc tertium retinendum videtur.

Ceterum *Veratrum nigrum*, vt quidem *Galenus* sentit, candido calidius ac amarior est, ex tertio similiter ex-calfacientium & resiccantium ordine.

Pituitam,

Pituitam, bilem flauam, sed & atram potissimum ac melancholicos omnes humores deorsum ducit; non tamen citra molestiam ac difficultatem. Idcirco non nisi robustis ac validissimis, vt Mesues suadet, exhibendum. Prodest autem ex Veratro nigro purgatio insanientibus, maniacis, melancholicis, comitiali morbo afflictis, elephantiacis, quartana laborantibus, & omnibus breuiter quos vel atra exagitat bilis, vel melancholicus humor molestat.

Modus exhibitionis, Actuarius lib. v. ait, sunt scriptuli tres, paulo plus minusve, tenuium fibrarum è radicibus pendentium, in aqua paululum maceratarum; deinde cortice detracto, ac in umbra siccato, proiecta q³ tenui, qua ipsi subest medulla. Datur autem ex passo & oxymelite; verum suauitatis gratia, quadam ex odoratis seminibus sunt inferenda. Si verò efficaciorē cupis purgationem, Scammonij pauxillum aduicito. Hac ille.

Praestat autem inter hæc genera primum; deinde secundum; tertium minus efficax habetur. Extergit verò Veratrum nigrum etiam alphas, lichenas, lepras, ac psoras: in fistulam callosam inditus, callū duobus aut tribus diebus, vt Galenus ait, detrahit.

DE VERATRO NIGRO DIOSCORIDIS. CAP. XXIX.

ISTUD Veratrum nigrum, vt Dioscorides scribit, folia habet viridia, Platano similia, sed minora, ad Sphondylii folia accedentia, sed fissa magis & nigriora, subaspera. caulis asper est: flores albi purpurascētes siue εὐπρό-
κοποι, schemate racemosi, & in ipso fructus Cnico similis. radices subsunt tenuēs, nigrae, veluti à quodam capitulo cepa simili dependētes, quarum & vsus est. Atque ita



Asb. antia. nigrum, L.
Pod. pempt. 383

verba ipsa Dioscoridis sonant; è quibus manifestum, aliud omnino ab eo Veratrum nigrū describi, quàm à Theophrasto, de quo capite antecedente.

Conuenire autem cum hac Dioscoridis descriptione satis apparet, quod & alias & modò, pro Dioscoridis Veratro nigro expressimus. folia etenim in primis eius lata, aliquot eminentes angulos, & viring³ incisuras habent, instar foliorum ficus, vitis, aceris; qualia platani esse abundè constat; sed tamen prædictis minora. ad Sphondylii folia satis etiam accedunt, non quidem tota ac integra, sed singularia eorum (ex quinq³ enim tetius folij Sphondylii cõpositio est) profundioribus tamen fissuris diuisa. eadem saturato colore nigricant, & aliquantulū aspera sunt. Caulis rectus est, pede altior, nonnihil striatus; quo superius in ramulos diuiso, complures prodeunt veluti latiores calices, discorum instar; qui simul racemi quandam referunt effigiem; præsertim cauliculi flaccescentibus, ipsisq³ deorsum mutantibus. quam et lati calices multiplicibus flosculis aliquo quoq³ modo exhibere videntur. E singulis siquidem, flosculi cõplures simul facti, veluti Scabiose, exeunt. Sunt candidi hi, diluto colore nonnihil purpurascentes, siue, vt Dioscorides ait, λευκοὶ ἐμπροσθέν. Semen inde in iisdem subnascitur calicibus, candicans, oblongum, ferè vti Cnici, sed tamen minus & tenuius, ac non perinde læue. Radices etiam subsunt nigra, quàm alterius nigri Veratri tenuiores, ab vno exiguo capitulo confibratæ: in nouellis quidem plantis. Nā in veteribus ætate multiplicatis à pluribus demittuntur.

Reperitur in Germania plerisq³ montibus, & aliis incultis ac asperis locis. In hortis viuax est. Dioscorides etiā in asperis, editis & frientibus locis Veratrum nigrū enasci scribit: optimumq³ quod ex eiusmodi locis accipitur. quale

est, inquit, quod ex *Anticyra* petitur. Florcet autem istud *Veratrum nigrum* non Hyeme, sed aestiuis mensibus. Toto autem anno herba vires.

Recentiorum pleriq³ *Astrantiam* nigram: alij *Saniculam* fœminā nominant. Differt tamē multum ab *Astrantia*, quæ & *Imperatoria*, umbellifera herba. *Sanicula* etiā perquā parum similis est. Nobis diu visa est, non quidem *Theophrasti*, sed *Dioscoridis* *Veratrum nigrum* esse. Respondet forma, ut retulimus: cōueniunt etiam vires. Nam & atros aliosq³ humores radices huius expurgare, testes habemus in *Germania* nōnullos exercitatisimos medicos, qui hu melancholicos purgatos feliciter ad sanitatem reducere. Quod sententiam nostram, & *Dioscoridis* *Veratrum nigrum* esse confirmat.

Tribuit autem huic omnes etiam eas nomenclaturas *Dioscorides*, quæ superiori ascriptæ sunt. Semen verò eius, ait, in *Anticyra* *Sesamoides* vocari, eiusq³ ad purgationes vsum esse. Si modò genuina & non vitata est lectio. Videtur autem non omnino integra. Nam si *Sesamoides*, ut *Plinius* ait, & vox ipsa testatur, à *Sesami* similitudine nomen habet, improprie huius *Veratri nigri* semen, non *Sesami*, sed *Cnici* amulum *Sesamoides* nuncupabitur. Iam et *Sesamoides* sui generis stirps est. Ex his aliunde hac verba *Dioscoridi* accessisse suspicandum: & fortè ex *Theophrasto* translata. Scribit siquidem *Theophrastus* lib. 1x. *Anticyrenses* fructu *Veratri*, qui *Sesamo* similis sit, purgari: *Helleborum*, inquit, non solum radice, sed etiā fructu vrile est. Siquidem in *Anticyra*, ut fertur, fructu eius purgantur. Deinde inferius: *Anticyrenses* fructum *Sesamacei* *Hellebori* dare solent, qui *Sesamo* similis est. Quibus verbis *Theophrastus* *Veratri* fructum *Sesamo* quidem simile refert; sed *Sesamoidem* peculiariter ac proprie dici non affirmat.

Dioscoridis locus deprauatus.

firmat. Sed ad Veratrum nostrum nigrum reuertamur, cuius facultates similes esse alterius Veratri nigri, comperum esse iam scripsimus. Ad omnia tamen efficacius habendum, antecedente capite descriptum; quo verisimile Anticyrenses precipue vsos; penes quos, prima summaq; propinandi Veratri, apud veteres semper fuit auctoritas.

DE SESAMOIDE EX DIOSCORIDE ET ALIIS.
CAP. XXX.

INCIDIMVS in Sesamoidum mentionem: Veratro potentia ac viribus proxima sunt, & expurgantium numero: oportunitudinecirco eorum historias ex Dioscoride & aliis hic repetere. Duo autem ea sunt: Vnum magnū: alterum paruum.

In magni autem Sesamoidi descriptione inter veteres non satis conuenit. Plinius lib. xxii. cap. xxv. ἡριγέρωντι, i. Senetioni similem herbam scribit: Oribasius ex Rasarij quidem conuersione, Ruta similiores facit. Sesamoides, inquit, maius folia habet Ruta similia, longa: florem album: radicem gracilem, ignauam: semen Sesamo simile, gustu amarum.

Sesamoides magnū.

Dioscoridis verò exemplaria vtriq; herbæ Sesamoides istud comparant. εἰσιν ἡ ὅρα, ait, ἡριγέρωντι ἢ πυγάνῳ, φύλλα μακρά, αὐτὸς λεύκον, πλὴν ἡ ἰχρὴν ἀπρακτός, σπέρμα ὁμοίον σιτάμῳ, παρὸν ἐν τῇ γούρῃ, id est, Similis est herba Senetioni aut Ruta: folia longa: flos albus: radix gracilu, inefficax: semen simile Sesamo, amarum in gustu.

Sive autē Dioscorides, sive alius huius descriptionis auctor exiiterit, oculata fide Sesamoides magnū non agno-

Notatur Dioscorides.

uisse videtur; sed ex aliorum scriptis tantummodo descriptionem eius collegisse: atq; idcirco disiunctiva particula *⁊* vsus, ignorans videlicet cui simile Sesamoides magnū esset: Senerioni ne an Ruta. Vtriq; autem simile esse, vix possibile. Sunt etenim dissimiles multū Senerio *⁊* Ruta, qualiscunq; etiam ea sit, siue graueolens, siue altera Hyperico similis.

Recentiores inter quos Io. Ruellius *⁊* nonnulli post eū, Sesamoides magnū existimant, quod à Theophrasto Veratrum nigrum describitur. Cognominat enim ipsum Sesamaceum siue σισαμοειδές, Anticyrenses, inquit, fructum Sesamacei Veratri dare solent. Accedit Dioscorides, qui Sesamoides magnū apud Anticyrenses Veratrum (si modò genuina lectio) vocari refert: *⁊* Galenus in lib. de simplic. med. facult. ubi Sesamoides magnū Anticyricum Veratrum esse scribit. Anticyrense siquidē Veratrum est, cuius Theophrastus meminit, *⁊* de quo cap. xxvii. Sed istud neq; Senerioni, neq; Ruta simile est, *⁊* non modò semine, sed *⁊* radice efficax est. Sesamoidis autem radix ἀπρακτόν, hoc est, ignaua, *⁊* nullius vsus. Crediderim ego nōdum repertum Sesamoides, *⁊* propter eam quam ostendimus difficultatem, non facile agnoscendum.

Dicitur autem σισαμοειδές, ut Dioscoridis *⁊* posteriorum exemplaria habent, in Anticyra ἐλλέβορον. Causa additur, quoniam Veratro albo in purgationibus misceatur. At propter hanc causam fortasse rectius ἐλλέβοριν nuncupatur. Nam Helleborines semen Theophrastus ait purgationi ex Veratro misceri, quod haud aliud quàm ipsius Sesamoidis esse verisimillimum est. Hippocrates enim, Strabo *⁊* Dioscorides non aliud admisceri scribunt quàm Sesamoidis semen. In σισαμῶν, ait Strabo, nascitur σισαμοειδές, cui permixtum praparent Octaum Helleborum.

A Sefami autem forma & similitudine Sefamoides nomen, ut Plinius ait, accepit.

In abstergendo, excalfaciendo, deficcandoq; simile Veratro vim, Galeno auctore, obtinet. Purgat pituitam & bilem supernè, Dioscorides refert, quantum tribus digitis capi potest, tritum, acceptum cum Veratri albi sesquibolo, in aqua mulsa.

Eadem de hoc ferè Hippocrates sub finem lib. de victus ratione in morbis acutis, at tamen non cum aqua mulsa, sed cum aceto mulso siue oxymelite exhibet. Sefamoides, ait, sursum purgat. potio eius est drachma media in aceto mulso trita. commiscetur etiam Veratri tertia portio- nis pars, & minùs suffocat.

DE SESAMOIDE PARVO,
EX DIOSCORIDE.
CAP. XXXI.

SESAMOIDI parvo, ut Dioscorides habet, dodrantes sunt colliculi, folia habentes Coronopo similia, hirsutiora tamen ac minora. in summo cauliculorum capitula sunt florum subpurpureorum, quorum medium album; in quibus semen Sesamo simile, amarum & κίρρον siue rufum: radix tenuis. nascitur locis asperis.

Nonnulli κερώνιον σισυμοειδὲς λευκόν, alij σήσαυον ἄγριον, Galenus σισυμοειδὲς λευκόν; & semen eius amarum qualitatem continere, multumq; amarum esse, excalfacere, rumpere, extergereq; scribit.

Dioscorides, purgat, inquit, pituitam & bilem deorsum semen acetabuli mensura potum cum aqua mulsa. Idē. impositum cum aqua tubercula & tumores discutit.

DE RHEO SIVE RHA.
CAP. XXXII.

DE forma aut magnitudine vel ipsius stirpis, vel foliorum florumve Rhei, nihil quidem apud veteres proditum reperitur. radicum modo similitudinem nonnullam, cum substantiam & colorem Dioscorides expressit, sed tamen eius tantum, quod in iis, quæ supra Bosphorum Thracium, ac Pontum Euxinum, vel etiam Maotidem paludem locis provenit.

Varia autem non parum radicum Rhei magnitudo, & ut verisimile, ipsius quoque totius stirpis, pro regionum, soli, calig, differentia, quæ (ut subinde repetendum) magna sæpenumero in stirpibus mutationis ac differentie cause sunt.

Minor ac tenuior est Pontici Rhei radix: crassior verò multoq, maior, quæ in officinis venundatur.

De Pontico autem Rheo sic Dioscorides: Rha, quod nonnulli Rheon, gignitur in iis quæ supra Bosphorum sunt locis: unde affertur. radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rubicundior, æqu, id est, inodorata (ut quidem exemplaria habent) laxa, aliquantulum levis. Optimum est, quod terebines non sensit, glutinosum gustu, cum remissa adstrictione, & quod commaducatum ochra modo pallescit, crociq, colorem aliquem refert.

Eadem ferè & de hoc ipso Plinius lib. XXV I I. cap. XII. in nonnullis tamen non tam dissidens, quam enarians. radicem non Centaurio magno, sed Costo nigro similem: & ritam aut mansam non εὐχρηστα, sed vini colorem reddere tradit. Est autem vinum non nigrum, aut rubens, verius quidem & potens lutei & ad crocum vergentis coloris: veluti Creticum, & alia eiusmodi. Costi Indici radix

dix Dioscoridi nigra est. Sed tamen potuit & pro Centaurij magni, per errorem Costi substituta esse. Verba eius hæc sunt:

Rhacoma adfertur ex his quæ supra Pontum sunt regionibus. radix Costo nigro similis, minor & ruffior paulo, sine odore, calfaciens gustu & adstringens. Eadē trita vini colorem reddit ad crocum inclinantem.

Officinarū autem Rheonra lix est multo maior, crassior, & amplior quàm Centaurij maioris. quæ soris nigricans: interius verò, recens quidem, cum varietate quadam coloris dilutè ex purpura rubet; vetustior ex subluteo sordet; sed amplius à teredinibus exesa: in mandendo aliquātulum glutinosa ac viscosa croci colorem refert; quem papyro aut alteri candida rei illita manifestiorem exprimit. substantia eius, neq; dura solidave, neq; gravis; sed leniuscula, ac inter duram cōpactāve ac raram veluti media, nonnihil fungosa: odorata etiam & gratum spirat.

Adfertur ex Sinarum (vulgò Chinarum) regione, quæ est versus Orientem, supra Indiam, etiam eam, quæ extra Gangem: haudquaquam verò ex Scenitarū provincia (ut plerique temerè existimant) quæ in Arabia est sælici, & longè à Sinu abest.

Appellatur vulgò Rha barbaram, aut Rha barbaricū, à nonnullis Reubarbarum, quod ex Africa & Arabia, quas Barbarias etiam vocant, aduehatur. Rectius Punica & Arabes Raued Sem nominant: à Sinensi provincia: unde in Indiam, Persiam, Arabiamq; ac postea in Europam inferitur. Eiusdem speciei cum Pontico est, quod Græci φάρμακον & φάρμακον: Plinius Rhacoma; Cornelius Celsus, & etiam Paulus Aegineta Ponticam radicem appellat; Mesues Raued Turcicum.

Est veriusq; eadem similisq; substantia: color idem recensium:

centium: idem inueteratorū: commansa glutinosum lentorem parem, eundemq³, croci videlicet amulum, colorem reddunt: & odor quoque Pontico, & quidem haud est insuauis. Id quod euidenti certoq³, experimento cognitū habemus. Nam huius radicem ab excellentissimo viro Iacobo Antonio Cortuso, amico nostro olim accepimus, haud graui odore suaueolentem.

Dioscoridis loci
suspectus.

Dioscoridus tamen exemplar ῥέον, id est, odore destitutum Rha esse habet. Sed pro ῥέον, fortassis rectius legendum ῥέον. Nam cum veteres omnes Rheo tenues aëreasq³, quasdam confiteantur adesse partes, odorem quoque vnā esse innuere videntur. Tenuis etenim aëreasq³, substantiæ odor comes esse solet. Odorata enim tenuia sunt essentia. Neque nos ab hac sententia Plinius absterreere debet. Potuit enim ipse, ut & aliās, in deprauatum incidisse codicem. Nam & ab illo tempore nonnullis locis corrupta ac deprauata fuisse Dioscoridis exemplaria, si non aliunde, vel ex sola Orchios descriptione manifestū, apud omnes posteriores qualis apud Dioscoridem, extans: corrupta videlicet ac deprauata: ut cap. de Orchi in florum historia ostendimus. Vtunque autem est Ponticum Rha, non est odore destitutum.

Rha fluuius.

Fluminis autem Rha sibi nomen adoptauit, in cuius supercilii, ut Ammianus Marcellinus ait, nascitur. Oritur Rha ex Hyperboreis Septentrionis montibus, & per Asiaticam Sarmatiam defluens, in Caspium siue Hircanum labitur mare.

Mistam autem Rheon, & substantiam, & temperaturam ac facultatem obtinet. Sunt eius partes quadam terrestres, adstringentes & resiccantes: alia tenuiores, aërea, calida & purgatoria.

Laudatur à Dioscoride ad inflationes, stomachi imbecillitatem,

cillitatem, & omnes eius dolores, conuulsa, lienofos, hepaticos, nephriticos, tormina, vesica & thoracis vitia, præcordiorum distensiones, vteri affectiones, coxendicum dolores, sanguinis sputationes, respirationes difficiles, singultus, dysenterias, calidæ passionis, circuitus febriles et venenatorum morsus: tollere etiam liuida & impetigines cū aceto illitum ait. Galenus etiam ruptis, conuulsis, & orthopnæ prodesse: sanguinemq; spuentibus cōferre scribit.

De expurgatoria autem facultate neuter quidquā scripsit. Non fuit Rhei ad purgationes illo seculo vsus. Quod in eo tenue ac aëreum, intendere eius adstringendi potentiam Galenus existimauit. Nec enim, inquit, reluctatur terrestri frigido, tenue aëreū; immò eò quòd deducat, & in altum perducatur, valentioris effectus causa existit. Cū tamen hoc ipsum aëreum ac tenue purgatoriam, ac obstructiones adaperiendi vim obtineat.

Paulus Aegineta primus videtur Rhei expurgatoriam facultatē exploratam habuisse. lib. enim primo, cap. XLIII. vbi Terebinthinam inter ea, quæ sanis aluum subducunt, enumerat. At cū magis, ait, subducere eam cogitamus, Rhei momentum admiscemus. Subsequenti Arabes ad vltiorem ipsum medicine vsum perduxere, per quos quoq; illud, quod è Sinarum aduehitur regione, receptum. Præstantius istud est: Ponticum siue Turcicum debilius, nō tamen purgandi vī destitutum. Reperitur & quoddam in Tartaria vrbe Samarcandar, sed improbum, & non nisi iumentorum purgationibus vrile: ait Garcia ab horto.

Optimum autem est recens, à teredinibus non exesum, & decoctionē non expertum. Vt enim Galenus, Anicenna, & Mesues, decoquuntur recens, & expresso succo, iterum resiccatur. Tale purgatoria facultate omni, aut quasi destitutum est, & magis adstringit.

Separantur enim maceratione ac decoctione huius facultates. Calida, tenuis, purgatoria & aperiens in humorem transfertur, remanente reliqua terrestri adstringente substantia. Densius istud est, Croci non, aut parum inscit colore; & amissa eius varietate, subnigro sordet: facileq; à terebinib; perforatur.

Expurgat autem Rheon per inferna bilem flauam, & quandoq; pituitam in proximis viis harentem.

Vtilis ac commoda ex eo purgatio omnibus quos bilis flaua infestat, vt laborantibus & acutis & tertianis febribus, ictericis, hepaticis; confert in pleuritide, peripneumonia, angina, insania, furore, renum, vesica & omnium internarum partium inflammationibus, & praesertim cryspelaceis affectionibus, tam externis quàm internis.

Vtilissimum certè Rheon iecinori & felli laborantibus maleq; affectis. prater enim quòd biliosos prauosq; expurgat humores, & ab obstructionibus meatus expediat, robur quoque maximum ipsis visceribus confert: ita vt haud temerè, Rheon vita hepatis, à nonnullis dictum videatur. Commodissima enim ac vtilissima talia esse iecinori medicamenta, Galenus xi. methodi asserit: quae videlicet mixtam habent cum expurgandi & aperiendi, adstringendi potentiam.

Modus exhibitionis à drachma vna ad duas: macerati verò ab vna cum media ad tres. Datur aut maceratur in calidioribus quidem morbis cum Cichorij Intybi aut alterius natura similis, diluto, aut stillatitio liquore, vel etiam lactis fero. Si verò calor abest, ex vino dari potest.

Exhibetur quandoque & tostum, sed ita vt nulla eius pars vel minimum sentiat adustionis. tale dysentericis & coliacis auxiliare. expurgatis siquidè vitiosis humoribus, aluum deinde reprimi ac cohibet.

Sistit idem, eodem tostum modo, & superfluentes menses, sanguinisq; vndequaq; fluores, praesertim per vesicam, sed in exigua quantitate, et cum adstringenti aliquo permixtum. Innoxium, inquit Mesues, Rha medicamentū, omni tempore, omni aetati salubre: atq; pueris & gravidis.

DE CONVOLVULIS,
ET IIS QVÆ ALIIS
INNITVNTVR STIRPIBVS,
LIBER TERTIVS.

PRAEFATIO.



DE PROXIMVM à Purgantibus ordinem spectāt vicinis sese implicantes, & amplexu viuentes. Sunt enim inter has multa purgatoria vi valdè efficaces. Sunt & alia non tales; sed quia in circumuol- uendo scandendoq; similes, illis coniun- genda erant, exceptu tamen leguminibus & cucumera- riis, vel ad frugum, vel ad olerum historiam pertinentibus. Tertius igitur hic liber stirpes habet adminiculis egentes; vicinis sese implicantes; aut propè adstantibus innitentes.

Convolvulus Scammonium, L.
Prod. plant. 39,



DE SCAMMONIO.
CAP. I.

SCAMMONIO multi ab una radice exeunt longi, tenues & viticulosi cauliculi, quibus vicinos frutices, pedamentave iuxta posita conscendit, ac multis in cumvolutionibus amplectitur. folia eius lata & acuminata, levis Smilacis amula: flores similes calathi quoque forma, candidantes, paulo minores. radix subest longa, crassa, candida interius; ex qua succus colligitur, qui densatus ad medicinæ usus servit.

In calidis, pingui exit solo, veluti in Asia Mysia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Bellonio teste.

Verisimile est, ubi sua spontis est, citò & plurima deinde Aestatis parte florere: nam & in Belgio Aestivis mensibus subinde cum flore videri potest.

Græci σκαμμωνία, Latini ferè Scammonium nominant; ita appellantes non modò stirpem ipsam, sed & densatum concretumq; succum. Dicitur & à nonnullis σκαμμορία πίζα, ab aliis κολοφώνιον. Officina succum crudum quidè Scamoneam: in Cotoneo verò malo decoctū Diagridium vocant: quasi δακρύδιον, i. lachrymulam.

Purgat autem hic succus per inferiorem ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentorum potentia cedens. Nulla enim parte, ut Oribasius ait, superatur ab iis quæ agitant & commouent.

Efficie istud non vehementer aliqua calida facultate; sed alia quadā latente totius substantia proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuicumq; siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, aut alium ingratum

gratum saporem communicat. Quamobrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderatius calida & sicca habendum.

Extergit autem & educit potissimum bilem flauam; serofos item tenuesque humores, & quandoque pituitam, ventriculo tamen magis quam reliqua omnia medicamenta, ut Paulus tradit, noxium est Scammonium. Mesues vero non modo ventriculo graue atque molestum, verum & intestina ipsum abradere; interna viscera erodere; venarum ora dilatare; totiusque sua substantia essentia cordi visceribusque reliquis obesse sentit. Immoderatum & minus opportunum idcirco eius usum animi sequuntur deliquia, ventriculi subuersiones, alui fluores, dysenteria & tenefimi.

Occurritur his malis, eodem auctore, si Scammonium in Cotoneo malo decoquatur; & muccagine Psilij, Prunorum carne aut succo, aliisque lenti similiter succi permisceatur: addita Mastiche aut aliquo ex moderatè astingentibus.

Plinius noxam eius tolli posse affirmat admixta aloë: Scammonium, inquit, dissolutionem stomachi facit, bilem detrahit, aluum soluit, præterquam si adiiciantur aloës drachma duæ, obolis eius duobus. Quod & Oribasio probatur, Synopseon lib. primo: & collectionum Medicinalium lib. vii.

Veteres Scammonium in malo Cotoneo etiam decoxerunt, sed omisso Scammonio ipsum malum edendum præbuerunt, quod absque stomachi subuersione aluum subducit: ut lib. primo de facult. alimentorum Galenus scribit: & III. de simpl. med. facult.

Officina Scammonio in pomo preparato vtiutur, quod, ut diximus, Diagridium vocat, & compositionibus omnibus ferè crudi ac non præparati, Scammonij loco admiscet.

Parantur in iisdem antidota siue electaria duo, satis familiaria, vnum ex Psilio, cuius auctor Mesues; alterum ex Prunis, quod ad Nicolaum refertur inuentorem. Quæ ad ipsius Scammonij temperationem & correctionem excogitata sunt; & ad febres ardentes ac tertianas, adeoq; omnes ex flaua bile morbos commendantur. Mastichen & Bdellium cataportus Cochis, quæ satis magnam Scammonij quoq; admittunt quantitatem, ademit Galenus lib. primo de medic. secundum loca. quod & in cap. de Colochyntide admonuimus, vbi de Mastiche aliisq; adstringentibus, quæ ad correctionem vehementius purgantium admisceri solent, latius egimus.

Modus autem Scammonij vel etiam ipsius Diagridij, vt quidem Mesues scribit, à granis est quinque ad x. aut xii.

Seruari potest, eodem auctore, ad annos quatuor. Plinius post bimatum parum vtile censet. Vsus, ait, bimo; nec antè nec post vtile.

DE SMILACE LÆVI MAIORE.

CAP. II.

SMILACIS herba duo apud veteres genera reperiuntur: asperum vnum: laue alterum. De illo posterius, de læui nunc agetur.

Huius autem species aliquot sunt, quæ vno hoc capite comprehendi quidem possent; sed quia cuique sua nomenclatura, singulas seorsum explicabimus. Eius autem quæ læuis propriè dicitur, vna maior: altera minor est species.

Maior viticulosis ac sarmentosis cauliculis longis ac tenuibus sursum ac deorsum arboribus, fruticibus, vicinisq; sepimentis obuoluitur circumligaturq; folio est lato, her-



Smilax laevis
 W. Sp. 1. 1844
 D. d. 1. 1844

deraceo, sed molliore laeuigatioreq³. flores exiliunt candidi, copiosi, rotundi, calathi effigie, colore candidissimi ac lilia emulantes. semen angulosum, sordido colore nigricans, exiguis sylvestribus Lupinis propemodum simile, capitulo ex tenuibus membranis, continetur. radices longae, crassioribus cirrus similes, intus candidiores, hac illac per obliquum infra terrae tamen superficiem feruntur.

Reperitur passim circa fruteta & sepes. quae semel comprehendit loca, egerrimè deserit: adeò pertinacis vitae radices sunt.

Aestiuus mensibus copiosi dependent flores, nitore conspicui.

Græcis σμίλαξ λεία; Latinis laevis Smilax: à Galeno & Paulo Aegineta etiam μίλαξ λεία. Laevis cognominatur, quòd sarmenta eius nullus horreant spinis.

Differt ab hac Dolichus, qui & Smilax hortensis; item & σμίλαξ arbor, quam Latini Taxum nominant. Recentior ætas Smilacem hanc, volubilem maiorem, Campanellam, funem arborum, conuoluulum album, & Smilacem leuem maiorem vocat. Plinius similiter lib. xxi. cap. v. Conuoluulum etiam nominat. Existimatur quoque Ligustrum, non quidem frutex, sed de quo Martialis Epigram. lib. primo, scribens in Procillum:

Quædam me cupit inuide Procille

Toto candidior puella cygno,

Argento, niue, lilio, ligustro.

Et Virgilius Ecloga secunda, hoc carmine:

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Seruius siquidem Virgilij interpres Ligustrum ait, florem candidissimum sed vilissimum. Inter candidissimos autem nullus hoc flore neglectus magis est, aut vilior habetur.

Quòd si etiam Ligustrum à ligando nomen sortitum, Smi-

Lax hac verè Ligustrum. vicinis etenim omnibus circumligatur ac circumuolutionibus plurimis implicatur. Germani Windekraut: Belgæ Winde & Wjange: Galli Liferon, liser nomināt. Italica est Vilucchio maggiore. Hispanis Yedra campana.

Viribus autem hanc Galenus asperæ Smilaci quodammodo similem esse iudicat. Semen si cum Dorycnio bibatur, insomnia multa turbulenta efficere fertur: auctor Dioscorides. Plinius nullius efficaciam esse herbam censet.

DE SMILACE LAEVI MINORE.


CAP. III.

LAEVIS *Smilacis minor species, maiorem satis refert, sed humilior, tenerior, ac omnino minor: tenues illi quoque & viticulosi cauliculi; nonnulli quorum humi repunt; alij herbas frugesq; scandunt, & crebris eas voluminibus reuinciunt: folia oblōgiora, hederaceis minora, mollia ac lenia: flos similiter calathoides, nonnihil odoratus, plurima parte albidus, relucente tamen in eo diluto rubētis purpuræ colore, & radiantis stellæ effigie. semen subsequitur exiguum. radices tenues, candidæ, veluti prioris sparguntur.*

Gignitur in cultis aruis frequentius, non rarò tamen et in neglectis, ac secus margines agrorum: frugibus pluuioso præsertim calistatu molestæ. floret vnà cum maiore.

Recentiores Volubilem minorem, & Conuoluulā minus appellant: Germani Klein Windekraut, id est, Kleyn Winde: petit Liferon Galli: Itali Vilucchio minore. Lenis Smilacis speciem esse, neq; aliò referendā, satis manifestū. Non desunt tamen, qui Helxinem esse velint cognomento Cissampelon. Sed pro hac nos aliam ostendimus.

Non



Smilax laevis minor

O 3 1844. 11 1/2

Det. parent 393

Non est etiam Chamacissus; quod quandoq₃ suspicari. Tamen si etenim foliorum, ramulorum, & radicum figura & color descriptioni, quæ passim extat, conformes appareant: & flores quia speciosi ac elegantes Leucoiis aliquo modo comparari queant: atque huic ~~κίον~~ nomen non minus quàm Cissampelo conveniat, non idcirco tamen Dioscoridis Chamacissus. Vires quoq₃ adesse oportet, quæ in hac Smilacis specie desiderantur. Chamacissus calida & amara folius est, hac verò nec amaritudinem nec caliditatem ullam obtinet: gustata siquidem qualitatem nullam exerit, magis frigida quàm calida. Quod hanc nullatenus Chamacissum esse, abudè ostendit. Ignava autem est, nullusq₃ vsus herba.

DE HEDERA TERRESTRI,
SIVE CHAMÆCISSE.

CAP. IIII.

TERRESTRIS Hedera humilis est herba; à terra nō at tollitur; vicina nō petit adminicula sed multis incerta lōgitudinis, tenuibus, viticulosis, aliquantulū angulosis, geniculatis & quandoq₃ subrubentibus cauleculis reptat, hac illac se diffundens. folia eius non magna sunt, sed lata, rotundiuscula, corrugata, hirsuta, marginibus serrata, è singulis crebrò bina. flores cucullati, hiantes, maiores quàm Chamadryos, è caruleo purpurascētes. radices perquam tenues & fibrosæ, subalbidis paulo nigriores. Odore tota est graniusculo, & sapore amara.

In cultis pariter ac incultis locis reperitur, ac sæpenterò vmbrosis, iuxta sepes, parietes, & hortorum areas.

Viret non modò Aestate, sed & Hyeme, quouisq₃ anni tēpore; ab Aprili autem in multam Aestatem flores facit.

Hederam;



04

Platanus hederacea
Ord. Gen. 394

Hederam terrestrem vulgò appellant, id est, χαράδισον; item & Coronam terra; Germani Gündelrebe; Belgæ Onderhauc; Galli Lierre terrestre.

Chamacissum autem veterum esse, pleriq³ recētorum non admittunt. Repugnare etenim apparet foliorum figura, cauliculorum longitudo: florum non modò figura, sed & sapor. Chamacisso siquidem (ut quidem passim extantia exemplaria habent) folia sunt Hedera tenuiora, oblonga; cauliculi dodrantes; flores similes Leucoiis candidiores, tenuiores, gustu valde amari. Huius verò herba folia rotundiora, nequaquã vti Hedera laevis; latè serpentes & oblongi cauliculi: flores à Leucoiis differentes, & minus multò quàm folia ac exiguum quid tantum amaricantes.

Sed potest ipsa descriptio corrupta esse, ac pro Μαρρότερα, perperam Μαρρότερα legi; & quæ sequuntur verba: πικρὰ πρὸς τὴν χεῖρον ἰσχυρὸς: posterius esse translata. Facilis & non rarò occurrens huiusmodi ex vno elemento in alterum lapsus est; & transponuntur quoque quadam aliquãdo voces à transcriptoribus. Facit in hanc sententiam quod Dioscorides folia Ischiadicis commendat, ac regium morbum expurgare scribat. Si enim flores amariores, his potius quàm foliis, præsertim purgandi regium morbum, potentia erat tribuenda; veluti Galenum fecisse legitur, quem potuit corrupta Dioscoridis lectio decipisse.

Correctionē autem hanc si descriptio admittat, poterit vulgaris terrestris hedera, veterū esse Chamacissus. Folia respondebunt hederaceis minora, tenuiora, & admodum amara. Ramuli multum foliosi sunt, qui licet longi ac prolixi, dodrantem tamen vix progrediuntur, quin radículas desigāt, ita ut ab ipsis radiculis dodrante haud sint longiores.

Flores etsi Leucoiis figura dissimiles, possunt tamen non minus,

minus, quàm alij quidam differētes Leucois quoque comparari. Color enim aut venustas floris, comparationis occasionem subinde præbet. Antirrhini flos, Dioscorides ait, similis Leucoio: Sparti luteus veluti Leucoij: Plinio candidus Conuoluuli flos Lilio non dissimilis: Est flos, ait libro xx i. cap. v. non dissimilis Lilio, in herba, quam Conuoluulum vocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac veluti nature rudimentum Lilia facere condiscētis. Sunt & ita huius terrestris hederae candidiores, ac tenuiores, quàm purpurei Leucoij flores. Recognita autem ac restituta Chamacissī descriptio talis est:

Χαμακισσὸς φύλλα ἔχει ὁμοία λευκοῖς μικρότερά δ' ἐκ
λεπτότερα πολὺ, καὶ πικρὰ πρὸς τὴν γεῦσιν ἰχυρῶς, κλω-
νία σπειραμαῖα περίπλεα φύλλων ἀπὸ τῆς γῆς ἡ δ' ἂν δὴ
λευκοῖς ὁμοία λευκότερα καὶ λεπτότερα, id est: Chamacis-
sus, siue hedera terrestris solia habet hederis similia, mino-
ra tamen, & tenuiora multò, & in gustu valde amara:
ramulos dodrantales foliis refertos à terra quinque aut
sex: flores Leucois similes, candidiores ac tenuiores. Huic
haud dissimilem Chamacissī, Plinius quoque habet descri-
ptionem lib. xxi i i i. cap. xv. sed tamen nonihil etiam
deprauatam. Delenda autem sunt hæc verba: Spicata est
Triticimodo. Vera lectio sic habet: Chamacissus ramulis
quinis ferè foliosa; cùm floret, existimari posset alba viola,
radice tenui.

Plinij locus ca-
rigatus.

Extant verò & apud Plinium & alia Chamacissī. Est siquidem Chamacissus hederae species, quæ nunquam à terra attollitur, ἐπίγειος dicta. Item Chamacissus vni-
folia, quæ pro Cyclamino tertia sibi demonstratam li-
bro xx v. cap. ix. refert.

Chamacissī item nomenclaturæ varia inter nothas oc-
currunt,

currunt, & aliquot quidem dissimilium stirpium inter se
 cōfusa; vt: Χαμαιλεύκη, κρίσος ἀκαρπος, σεληνίτης, γῆς ἐ-
 φανος, hederā pluuiatica. Chamaleuce autem propriè Tus-
 silago est. κρίσος ἀκαρπος, hederā sterilis. Setinitis appella-
 tio multis communis est: γῆς ἐφανου, siue Corona terra
 nomen huic verè debetur, folioso siquidem veluti serio latè
 sparsis ramulis terram coronat. Hederā pluuiatica rectè
 etiam appellari potest: nam per pluuiosam calī tempesta-
 tem maximè luxuriat.

Ceterum facultate hederā terrestris calida & sicca
 est, & quia amara, abstergere, & viscera ab obstructioni-
 bus liberare potest. Aduersus tinnitus & surditates com-
 mendatur auribus imposita. Matthioli arugini eius suc-
 cum permixtum cuniculosis ac fistulosis vlceribus vtiliter
 adhiberi refert.

Dioscorides Chamacissi folia Ischiadicis trioboli pon-
 dere in aqua cyathis tribus ad dies quadraginta aut quin-
 quaginta pota auxiliari refert: eademq; morbum regiuni
 expurgare similiter sumpta, ad dies sex aut septem. Ga-
 lenus omnem (vt diximus) facultatem floribus tribuit:

Chamacissi flos, ait, cū sit admodum amarus, iecur
 obstructione liberat, daturq; ex coxendice laborantibus.

DE SOLDANELLA.

CAP. V.

LÆVIS Smilacis generibus venit etiam ascribenda
 Soldanell. i. spargit hac per terram graciles, viticulosos,
 subrubentes cauliculos, circa quos in longioribus pedicu-
 lis, folia hederacea, lenia, splendentia, sed lata, & subro-
 tunda. flores calathi formam similiter referūt, diluto pur-
 pureo



Convolvulus arifolia L.
Bot. Beech 395

purco colore subrubent semen in rotundis folliculis nigricat. radix oblonga tenuis. Saporem herba amarū ac subsalsum à natali cōtrahit solo. Nascitur enim in maritimis.

Reperitur verò non modò in Italia, aut Gallia, verum & in Zelandia insulis, Flandriæ, ac Hollandiæ littoribus. Aestivis mensibus floret.

Dioscoridis locus
corrigatur.

Recentiores Soldanam & Soldanellam vocitant: Belge Zeewinde, id est, Convolvulum marinum. Dioscoridi est $\kappa\phi\acute{\alpha}\mu\epsilon\lambda\eta\ \delta\alpha\lambda\alpha\tau\sigma\acute{\iota}\alpha$. In cuius exemplaribus, & hic $\mu\alpha\kappa\acute{\rho}\alpha$ perperam pro $\mu\alpha\kappa\acute{\rho}\alpha$ vnius litteræ lapsu legitur: ut & ante nos alij quoque admonuere.

Calida autem & sicca temperie Soldanella est, & tertio quidem excessu, vti amara salsilaginem cum acredine quadam referens, gustabilis eius qualitas ostendit.

Aluum purgat; cruda & aquosa detrahitis; hydropicis censetur vilis: aduersatur tamen ventriculo: torsiones & molestias adfert: plus subinde incommodi, quàm auxiliij confert.

Testatur hæc quoque Dioscorides. Tota, inquit, herba stomacho incommoda est, acris, aluum maximè soluit, cocta in ciboq; sumpta. Coquunt cum ea quidam, ad obtundendam acrimoniam, pingues carnes.

DE CONVOLLVLO NIGRO SIVE HELXINE CISSAMPELO.

CAP. VI.

AD SMILACIS levis genus pertinet quoque quod Convolvulum dicitur nigrum. Huic pertennes multæ cirrhorum instar subrubentes viticulae, quibus fruticibus, omnibus quacunque contingit vicinis, sese crebris circumvolu-



Polygonum convolvulus, L.
ovif. Persp. 396

lutionibus implicat: ab imis ad summa proserpens. folia lata sunt longa, & acuminata hederae foliis molliora, tenuioraq₃. flores exigui racematim coherent, candiduli. semen triangulare velutifegopyri, sed minus & nigro resplendens colore, tenuibus, subrubentibus membranis, veluti glumis integitur. radix exigua brevisq₃ est.

Iuxta sepimenta & frequenter in vinetis reperitur.

Vindemia tempore semen perficitur, ex quo, nec aliunde, primo vere succrescit. Germanis Schwartzwinde, id est, Conuoluulum nigrum, aut Volubilis nigra dicitur: nonnullis Volubilis media.

Dioscoridi ἐλξίνη κασάμπελ & Democrito in Geoponicis, μαλακόκισσος &: Latine, Mollis hedera. Cissampelos autem cognominatur, non modo ad differentiam alterius Helxines, quae & Parietaria; verum quod & vitibus crebris amplexibus saepenumero circumuinciatur.

Reperitur huius & multò alia, in exemplari quo Marcellus Vergilius vsus est, descriptio, & appellationes complurimae: sed Ruelli & Cornarij editiones magis probandae. Plinius lib. XXI. cap. XVI. non de hac Helxine, sed de Ixine scribit. Exemplaria perperam Helxine pro Ixine habent. Ixine verò Chamaleon albus.

Facultatem autem Conuoluulum istud nigram cõperatam aut probatã hoc tempore nullam habet. Dioscorides foliorum Helxines Cissampelos succum, vim habere ait soluendi aluum si bibatur.

Plinij locus animaduersus.



Campana cærvilæ, L.
 241. p. 196

ACCEDIT leuium Conuoluulorum numero oportune etiam Campana vulgo nuncupata Laçura, id est, cærulea. Longos, teneros, viticulososq³, hæc promit cauliculos, quibus pone posita quaecunque conscendit & amplectitur, crebris sese ijs implicans voluminibus. folia lata sunt & angulosa, mollia, vetustis angulosis hedera foliis maiora, non in totum leuia, sed nonnihil hirsuta. flores veluti Smilacis leuis, instar campanule, sed per oras angulosi, & colore in cæruleo purpurei. semen nigricans radices tenues & fibrosæ. Peregrina hæc stirps, & aliunde illata, sub finem æstatis, si calida feruēsq³ fuerit, in Belgio flores facit.

Campana, vt diximus, Laçura, & Campana cærulea à recentioribus nuncupatur: aut Conuoluulum cæruleum. Existimatur Ligustrum esse nigrū, cuius meminisse Columella lib. x.

Fer calathis violam, & nigro permista Ligustro
Balsama cum Casta neclens, &c.

Si etenim Smilax leuis maior album est Ligustrum, haud improprie Campana ista, nigrum appellari poterit Ligustrum. Nam è cæruleo purpureus color subinde niger dicitur, veluti viola nigra.

Sunt autem qui hanc Campanam granum Nil Auicenna esse volunt, de quo cap. CCCVI. Quod quidem differt ab eo Nil, quod describitur CCCCXII. cap. Istud enim Isatis Græcorum est: illud verò peregrina ac Indica stirps, vt non modò Auicenna, sed & Serapio testatur. Sic autem Auicenna: Granum Nil quid est? est Chartamum Indum. Serapio verò Habal Nil est granum Indicum; cap. videlicet CCLXXXIII. vbi & ipsum his describitur verbi:

Planta

Planta eius est similis planta Leblab, id est, Conuoluuli, adherens arboribus duobus brachiis vel tribus: habet ramos & folia viridia, & è radice cuiusq; folij est flos coloris purpurei, similis Campanulis in figura sua; & quando cadit flos, dimittit semen in vaginis (lego capitulis) in quibus sunt tria grana, minora granis Staphisagria, leuia. Cui descriptioni conformis Campana hac LaZura est.

Non desunt verò & alie Conuoluulorum species, quæ ad Nil Auicenna quoq; referuntur; quarum semina superioribus annis, vir clarissimus Iacobus Antonius Cornutus ad nos misit. Caules vtriusq; prælongi, veluti alierū Conuoluulorū vicinis perticis circumuoluti; & vnius non paucis breuibus spinulis asper, alterius verò absq; vllis. folia leuia, lata, haud angulosa; & eius quæ spinis caret, prona parte candicante: flores elegantis purpurei coloris: semina nigra, leuia ac resplendentia. Et possunt & hæ quoq; species esse Nil. plures etenim eiusdem generis reperi nihil prohibet.

Ad hoc genus referendum etiam videtur, quod ex America allatum Mecobacha appellatur. Conuoluuli siquidem Mecobacha. species est: folia eius magna, hederacea: flos pulcher: semine nigrum, splendidum, capitulum membranaceis implicitum: radix longa, crassa, interimq; candida; quæ resiccata & denarij pondo vnius aut duorum exhibitæ, aluum ducit, biliosa ac pituitosa expurgans. Vnde & Scammoni species esse, & nec temerè quidem, creditur. Potest & Nil & Scammonium Americanū esse. Nam & ipsum Scammonium haud aliud, quàm species Smilacis leuis radice crassa.

Ceterum Nil, vt Auicenna quidem, calidum & siccum est ordine primo. A Serapione verò inter tertij ordinis calida & sicca reponitur.

Expurgandi vim habet, ducit crudos crassosq; & pituitosos & melancholicos humores: pellit ventris lumbricos et ascaridas. sed ventrem conturbat, & nauseam facit: vt Auicenna. Tardè officium præstare Serapio scribit; apud quem plura requirenda.

DE SMILACE ASPERA.

CAP. VIII.

SMILAX aspera multis aculeatis ac spinosis horret exilibus ramulis, quibus per sepes, frutices, ac vicina quæq; ambiendo amplexandoq; ab imis ad summa repit. folium eius est hederæ, absq; angulis acuminatum, minus ac durius quàm leuis Smilacis; quandoq; candidis maculis notatum. flores candidi, odorati. fructus in exiguo racemo instar Labruscæ, cum ematurruit rubens leuiterq; mordax, in quo semen punico colore nigricans, simile cannabis. radix longa, aliquantulum nodosa, dura, & in plures diuarricata ramulos.

Exit locis asperis, incultis, circa sepes, margines agrorū, in montibus & conuallibus: In regionibus quidem calidis, vt Italia, Narbonensi Gallia, Hispania, Africa.

Flores Verè, fructus Autumno vel antè paulo maturescit.

Σμίλαξ τραχεία Græcis appellatur. Γαζα Theophrasti interpres Hedera[m] Ciliciam nominat, veluti & Plinius, qui & Nicophoron cognominatam scribit lib. xxiiii. c. x. Hetruscis Hedera spinosa, & Rubus ceruinus dicitur: Hispanis Castellanis, vt auctor Lacuna, Zarza Parilla; quasi Rubus viticula. Zarza siquidem, eodē teste, Rubum; Parra autem, Matthiolo interprete, vitem; & Parilla paruam vitem siue viticulam significat. Dicitur & ἰσάππης, λυκάνθεμον,



S. aspera, L.
Vod. pent. 398

καυθεμον, κυνόβατον, ἀνίκαντον, ἡλιόφυτον, ἀναπλικόν, διπ-
κόν, ἐλίσκη, & Mergina.

Zarfa Parilla.

Nonnulli, quam ex Peru America provincia aduectam radicem recentiores Zarfam quoq₃ Parillam nuncupant, huius Smilacis radices esse affirmant. Et similem quidem huic Garcia Lopi^{us} Lusitanus, sed tamen eandem esse non concedit. Reperiuntur saepenumero similes, quae tamē vel minimo aliquo discrimine differunt. Differentiam etiam calⁱ, soli^{q₃}, diuersa constitutio adfert.

Zarfa Parilla Peruuiana peregrina est, & è noui orbis siue America provinciis infertur. Quae autem illinc aduehuntur, licet etiam in Europa natis similia videantur et sint, viribus tamen non raro differunt. Neque enim soli calⁱ, soli^{q₃}, diuersitas, ad formam modò commutationem aut alterationem facit; sed plurimum etiam ad qualitatum virium^{q₃}, remissionem aut intentionem confert. Calidis locis enata potentiora ferè odoratiora^{q₃} sunt: frigidis minus. Quaedam pernitiōsa translata mitescunt, & vtilia redduntur. Ita Zarfa Parilla Peruuiana tametsi Smilaci asperae siue Zarfae Parillae Hispaniensi similis, temperati tamen calⁱ occasione, tum & ipsius soli genio, longè efficacior est, quàm vel in Hispaniis aut etiam in Africa nata.

Sunt autem Zarfa Parilla ex America radices (quae sola aduehuntur) longae, et tenues, tenuioribus vulgaris Glycyrrhizae radicibus similes, ab vno complures dependentes quandoq₃ capite, in quibus medius durior nervus; sapore sunt exiguo, & odore non perceptibili praeclat^e. Feruntur gigni in Honduras Peru provincia. Nomen à similitudine asperae Smilacis acceperunt.

Apud indigenas suum ei nomen, quod Latinis spinosam quoq₃ vitem sonat, Garcia Lopo teste.

Calidi autem & sicci temperamenti sunt, partium^{q₃} adeo

adeò tenuium, vt earum decoctum quàm facillimè sudorem prouocet. Articulorū capit isq̃, diuturnis doloribus frigidisq̃, affectionibus auxiliantur; omnibus item malis, citra tamen febrim, profunt, quæ sudore tolli ac curari possespes est.

Sufficiunt ad curationem pauci dies, leuiore morbo: maius aut diuturnius malum, diuturniorem curationem postulat.

Quæ verò ex Hispaniis aut aliundè Zarza Parilla, siue Smilax aspera adfertur, minùs efficax est. Commendatur hæc à Dioscoride & Plinio aduersus venenā.

Huius folia, inquit Dioscorides, aduersus lethalia medicamentā antidota sunt, siue antè, siue post pota.

DE BRYONIA ALBA ET NIGRA.

CAP. IX.

BRYONIÆ duæ sunt (præter syluestrem nonnullis dictam Bryoniam:) yna alba: altera nigra cognominatur.

Alba Bryonia multa longa & tenuia sarmenta promittit: I clauiculos siue capreolos habet instar vitis: folia eius lata sunt, quinquangularia, & ad similitudinem vitium diuisa, sed asperiora, hirsuticra, candidioraq̃: flores exigui, candidi, racemosi: fructus in vitis paruis, quarū acini initio virent, maturi rubent. radix fragrans est, longa & crassa, altè descendēs, ex albido sublutei coloris, gustu perquam amaro et ingrato. Sepimenta, dumos, frutices scandit & superat, non tamen aliorum modo circumplicando se, sed clauiculis suis vicina omnia apprehendendo, isq̃, se diuersimodè innectendo ac implicando.

Similis huic Bryonia est nigra. tenuibus siquidem & 2 viticulosis cauliculis, foliis, capreolis, floribus, vuarum acinorumq̃,



B. alba, L.
Ord. pent. 400

horumq; figura, radicis mole & quantitate priorem refert. Sed acini per maturitatem nigricant. radix quoque foris subnigra, interiùs buxeo pallet colore. Arbusculorū hac sepium dumorumq; ramulos fastigiūq; capreolis suis quoque tantum comprehendit, in omnes partes latè sese velut prior explicans.

Candida siue alba Bryonia multis in Belgio locis reperitur; similiter in Sueuia ac Rhenana Germaniæ prouincia; & passim in Italia, secus vias ac agrorum margines.

Nigram gignunt Hestia, Saxonia, Westphalia, Pomerania, Misnia, vbi candida non prouenit, vt Valerius Cordus scriptum reliquit.

Viriūsq; flores Maius, vnas verò Autumnus suppeditat.

Prior Græcis ἀμπέλ & λευκή, id est, vitis alba. & ἀμπέλ & quidem dicitur, non modo quòd foliis vitem reserat, verum etiam quia fructum in exigua vna, acinis licet raris, similitudinem conformatum producat. Dicitur & βρώνια λευκή, ἐπιστάφυλον, χελιδόνιον, μέλαθρον, μέλαθρον, ἀρχέως, ἀρωγός, ἡ κέδρος: A Plinio etiam Maodon; ab Arabibus Alphefera; à Matthæo Syluatico Viticella: in Thesauropauperum Rorastrum. Apuleius Apiastellum, Vuam Taminiam, Agrisolum & Dentariam appellat: Germani Strichwurtz / hundsaurbs / hunsrebent / reussels kirschen: nostri vulgarem appellationem sequētes, Bryonie: Galli Couleuree: Itali Zucca saluatica: Hispani Nueza blanca, & Norca blanca.

Alterà Græcis ἀμπέλ & μέλαινα, ἡ βρώνια μέλαινα: 2
Latinis Vitis nigra, Bryonia nigra: à nonnullis χειρώνας & ἀμπέλ & κυράριον. Galenus propriè βρώνια vocari ait. Idem Plinius affirmat, qui & à nonnullis Chironiam, γυννάριον, ac ἀπρώτιαν dici, refert. Chironia autem cognominatur à Chirone inuentore. Est Chironis, inquit Plinius,

nus, inuentum ampelos, quæ vocatur Chironia.

I Facultate autem Bryonia alba omnibus suis partibus calida & sicca est, tertium gradum, præsertim caloris excedens, cum expurgandi potentissima vi, per quam non modo biliosos ac pituitosos, sed et aquosos humores educit.

Asparagos, qui prima germinatione prodeunt, si decocti edantur, aluum & urinam ciere Dioscorides scribit. Galenus verò ab omnibus pro more per Ver edi, ait, eduliumq; esse stomacho propter adstrictionem gratum. Quod de vitis sylvestris, siue Tami quidem; sed nequaquam de huius germinibus veritatem habet. Nam alba Bryonie asparagi, siue prima germina nequaquam adstringunt; sed aluum vehementius commouent; stomachoq; grauem molestiam inferunt.

Galenus notatur.

Dioscorides item radicis succum Vcre exprimere, bibiq; cū aqua mulsa, pituitamq; ducere, ait. Ducit autem non modo succus, sed & radicis decoctum pituitam, bilem flauā, ac serosos aquososq; humores; & quidem validissimè; vñ ventriculum ita se penum erò perturbans, vt et eosdem vomitione reddi procuret.

Conferre huiusmodi vehemens purgatio hydropicis posse speratur. & quos comitialis morbus, aut capitis diuturna & pertinaces vertigines detinent. Sed tamen epilepticis non quotidie, vt Dioscorides monet, exhibenda: subinde etenim dedisse satis erit molestum. Validum enim, vt diximus, est remedium, violenter purgans, & naturam inferens.

Extrahit eadem radix mortuos fœtus & secundas subdita, idemq; in infestibus decocta potest. Cutim eadem extergit & erugat: maculas solares, varos, lentigines, cicatrices nigras, cum etuo & Chia terra ac sanograceo depurgat; aut in oleo decocta vsq; dum colliquescat. Tollit sugillata:

lata: digitorum pterygia compescit: cum vino imposita inflammationes discutit ac abscessus rumpit: educit & ossa trita ac imposita: miscetur & commodè erodentibus medicamentis: auctor Dioscorides.

Fructus ad scabiem et lepram facit illitus & impositus, eodem auctore. Galenus iis, qui coria densant, utilem perhibet. Plinius lactis abundantiam facere scribit. Videtur tamen magis lactis generationi aduersari. Nam acris est, & eo vellera ac coria, Dioscoride teste, depilantur.

Nigra Bryonia supr. dicta, ut Galenus ait, ad omnia 2 similis, nisi quòd imbecillior.

DE BRYONIA SYLVESTRI,
SIVE TAMO.
CAP. X.

VITIS sylvestris longos, lignosos, mediocris crassitudinis, rimosi corticis, instar sarmentorum vitis, obscure subrubentes viticulosos promit coliculos, quibus vicinis quibusvis multis se amplexibus circumuoluit ac crebris intorquet circuitibus ab imis ad fastigium scandens. capreolus siue viticulis caret: folia hederacea, mollia, splendentia, Smilacis lauis haud absimilia: flores candidi, exigui, muscosi, odorati, racematim dependent: vuae paruae sunt: acini virent, maturi cocci modo rubent: radix crassa, longa & magna, succo glutinoso & lento plena; aded ut friata digitis adhereat.

In syluis opacis & similibus locis asperis, praesertim ubi aquae subsunt, gignitur: reperitur & sub Corylis prope Argentinam: ut Kybeus prodidit.

Martio mense asparagi siue prima erumpunt germina: flores Maio: vuae circa vindemia tempus maturantur.



Tamus communis, L.
Ord. pent., 401

Græci hanc ἀμπέλον ἀγρίαν, id est, vitem sylvestrem dicunt. Differt tamen non parum à Labrusca siue vite vinifera sylvestri, quæ & ἀμπέλον ἀγρίαν. Præbuit virisq; ὁμοῦσι Plinio occasionem, ut satis de his se explicare nō potuerit. lib. xxi. cap. primo: & utramq; inter se confuderit. in quo sunt & Arabes notandi.

Dicitur verò & hæc sylvestris Bryonia, Latinis Tamus: fructusq; eius Vva Tamaria, Italis Tamaro. Vva Taminia autem, etiam Staphisagria est: sed hanc falso ita nuncupatam, Plinius inquit. Germanis est Schmarwurtzel. Allobroges Latiram vocem retinent, & Tamum quoque aut Tanum appellant. Plinius Salicastrum etiam vocat: Ruellius Sigillum B. Maria, in officinis quibusdam nominat refert.

Non est hoc loco refellenda eorum sententia, qui Cyclaminum alteram hanc esse volūt. vel sola enim radicis magnitudo facile hos redarguit. Cyclamini siquidem radix ἀγρία, id est, nullius usus ac exigua, huic autem magna & multi usus. Cum eo magis videtur agendum, qui ἀμπέλον siue ἐπωρίαν μέλαιναν esse pertinacius tuerar: nisi reperta, & ab eo conspecta legitima Bryonia nigra, sententiam mutaturum speraremus. Sed tamen quid vetat & in huius errorem animaduvertere, & Tamū nō esse Bryoniam docere? Caret capreolis Tamus: fructum non nigrum, sed pulchre rubentem gignit. Bryonia verò nigra capreolos habet instar vitis. et acinos profert nigros. Ostendunt hæc differentiam satis evidentem. Sunt autem Tami siue sylvestris Bryoniae radices calida & sicca ordine tertio: fructus adsimiles facultate attamen mitiore. Veraque abstergunt & digerunt.

Dioscorides radices ait, aquosa detrahare & hydropicis utiles; si in vino quod aquam marinam admixtam habeat,

beat, feruefiant; & cum aquæ cyathis duobus bibantur: fructus siue acinos, cum à Sole, tum & alias cutis maculas expurgare.

Abstergit autem non modò maculas, verùm & sugillatarum partium liuores citissimè idem digerit ac resoluit: quod & radices impositæ possunt.

Recente enata germina, muria condiri atq; inter cibaria recipi, Dioscorides refert. Inferri mensis & nostra ætate in Hetruria, Matthioli scribit. Idem quoq; in Hispania Betica fieri alij asserunt.

Dicuntur à porcis huius radices quari, erui ac cum voluptate mandi, neque minùs esse grata, quàm Cyclamini orbicularia, quæ inde panis porcini nomen indeptæ sunt. Si quis autem hanc ob causam Cyclaminum alteram esse cõtenderit, hunc & plures alias Cyclaminis annumerare oportebit. Neq; enim huius tantummodo, sed & multarũ aliarum stirpium radices quarunt, eruunt, audivissimeq; deuorant porci, quarum nullæ ad Cyclamini genera pertinent. Temerarium idcirco fuerit, Tamum Cyclamini speciem asserere, quòd eius radices porcino generi gratae sint.

DE CHRISTOPHORIANA.

CAP. XI.

TAMETSI Christophoriana ex earum non sit genere, quæ adminiculis egent aut amplexu viuunt; quia tamen viuas fert, ἀμπελὶς se facillè annumerari permittet.

Cauliculos hac promit teneros, pedem longos aut altiores non multò: folia circa hos & è radicibus, ex pluribus commissa, particularia quorum lata, acuminata, & ambitu serrata, in virore candicantia: flores tenues, muscosi, candidi, in fastigiis cauliculorum veluti in spicam conditi:
fructus



Actaea spicata, var. *nigra*, L.
Bot. Beech. 402

fructus rotundis paulo longiores, per maturitatem nigri-
striam lineamve ab una parte ostentantes, vuarum acinis
alioqui similes, & in una modum coherentes: radix cras-
siuscula, non absq; fibris, foris nigricans, interius buxi colo-
re lutea, riuax ac diuturna, quotannis cauliculos & folia
regenerans.

Plerisq; Germaniæ & circa Rhenum Mosamq; locis,
in sylvis præsertim montosis, hæc occurrit.

Flores Maio, sed fructus Augusto aut seriùs perficitur.

Nostra ætas Christophorianâ, & S. Christophori her-
bam vocitat. Sunt qui Costum nigrum dicant: alij ma-
lunt Aconitum bacciferum nominare. Costo autem nihil
habet respondens. Aconitis autem arnumerari contigit,
propter perniciosam et Aconito similem, quam habere cre-
ditur, facultatem.

Fertur enim exitialis, ac non minùs noxia quàm Aco-
nitum.

DE DULCAMARA.

CAP. XII.

DULCAMARA vitis modò lignosa promit sarmē-
ta, & ab iis ramulos complures, quibus scandendo vicinis
sepibus fruticibusq; innititur. cortex nouellorum ramulo-
rum viret; sed vetustiorum ipsorumq; caudicum æsserior
cineritio subcandicat colore, extirsecus quidem; nam in-
teriùs pulchrè etiam viret. lignum fragile, medullam fun-
gosam habet. foliis vestitur oblongis, leuibus, mucronatis,
Smilacis minoribus, circa pediculum appendices vtrinq;
paruas ferentibus. flosculi in muscariis exigui, haud ma-
gni; ex quinque foliolis angustis, colore quandoque albidis,
Gesnero tesle; in Belgio vt plurimùm in caruleo purpurei;
in



Solanum dulcamara, L.
 Dist. fruct. 602

in quorum medio luteus prominet apex : bacca oblongioris formæ, molles, lenti & ingrati gustus, eleganti corallij colore rubent : radix modica multis fibris committitur.

Aquosa & rigua amat, circa scrobes & fossas frequenter reperitur.

Folia Vere erumpunt : flores Iulio exeunt : Augusto bacca siue acini maturi.

Posterior ætas Amarum dulce, Amarodulcem, & Dulcamaram, & Græcè γλυκύπικρον ἢ γλυκυπικρὶδα nominat. Germanicè *Te lenger* / *te lieber*, *hynskraut* ; Belgæ *Alfrance*. Sunt qui vitem syluestrem Dioscoridis esse existiment : alij Solani speciem faciunt, Solanum lignosum aut fruticosum cognominantes. Sed vitem quidem syluestrem, iam antea ostendimus esse Tamum ; Solano autem simile nihil habet. falluntur idcirco maximè, qui Solanum rubrum, aut Solanum fruticosum appellant ; ac eius baccis loco acinorum Solani vnguentorum nonnullorum refrigerantium compositionibus admiscet. Est enim fructus huius nequaquam frigidus vt Solani, sed calidus, vt mox dicetur. Plus similitudinis cum Cyclamino altera habet. folium respondet ; caules licet non manifestè articulati, non tamen absq, geniculorum specie ; in flore alicubi candido ; & fructu acinaceo corymborum hederæ modo dependente nihil desideratur ; neq, in ipsis similiter radicibus verè ἀχρῖσσις. Nā præter quod tenues, nullam quoque vtilitatem conferunt.

Describitur Cyclaminus altera à Dioscoride his verbis :

Folia habet hederæ similia, sed minora : caules crassos, ποτατώδεις, id est, geniculatos ; vicinis se arboribus ἐλικοειδῶς, id est, modo capreolorum vitis, circumligantes : flores candidi, odorati : fructus vt acini vuae, similis hederæ, mollis, sapore leuiter acris & viscosus : radix ἀχρῖς & siue inutilis.

Cyclaminus altera.

Dicitur

Dicitur autem Cyclaminus altera, Dioscoride restat, κισσόφυλλον & κισσάνθεμον. conuenit utraque appellatio Dulcamara. nā foliis, floribus & fructibus hederam amulatur.

Caterum facultate, & foliis, & fructu calida, resiccās, abstergens & digerens est. Fertur foliorum decoctum iecinoris fellūq; obstructiones reserare, & aduersus regium morbum vtiliter bibi. Ruptis verò & ex alto præcipitatis, aut cæsis etiam succus vtilis habetur. Creditur siquidem concretum alicubi in visceribus sanguinem dissoluere, & partium læsarum sanitatem procurare.

Hieronymus Tragus è ligno minutim conciso vini decoctum conficere docet, quod ictericos & per vrinam, & per inferiorem ventrem clementer purgare refert.

Hand dissimiles istis Dioscoridēs quoq; Cyclamino alteri facultates asseribit. Fructus, inquit, drachma vnius pondere potus, cum vini albi cyathis duobus, ad dies quadraginta, splenem liquat; ita ut per vrinam & alium absinatur. Bibitur ad orthopneam: reliquias à partu purgat.

DE VITALBA.

CAP. XIIII.

CAULES sarmentosos, multos, crassos, ramosos, gemiculatos, aliquantisper rubentes, & subinde lentos ac obsequiosos edit Vitalba; sepius dumūq; se implicans, atq; irretiens, vicina omnia appetens ac superans. folia ad vñū neruum è quibus ferè coalescunt; eorum eminenti vno; quæ lata sunt hederaceis similia, nequaquam ramē angulosa, verum per circumferentiam nonnihil crenata; flores in racemi aut umbella formam digeruntur candidi & odorati, florum Myrti amuli; senien subnascitur exiguum trianguli

lari specie, capillaceam tenuisq; pluma instar incanant veluti cristam gerens; gustu acre: radix fibrosa, haud magni momenti.

Secus margines agrorum inter vepres & sentes crebro reperitur, apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi latum secundumq; solum.

Julio mense huius flores: fructus plumis suis incanescetes Autumno dependent.

De huius nomine inter recentiores concertatio quaedam est. Fuchsius vitem nigram siue Bryoniam nigram: Matthiolus Clematidem alteram facit. Legitimam autem Bryoniam nigram superius ostendimus. Ad Clematidem vero alteram accedere, atq; eius speciem esse, negari non potest. est tamen & alia, ab hac differens, inferius explicanda. Germani Aigen & linen appellant: Galli, Raellio teste, Viorne. Non est tamen frutex ille, qui Gallis Viorne & Latinis Viburnum dictus est.

Facultate autem acris & calida hac est, vsum tamen nobis compertum, non habet vllum.

DE FLAMMULA.

CAP. XIII.

FLAMMULÆ duæ sunt: vna adminiculis eget: altera assurgit nullius indiga sustentaminis.

I. Prior lentos obtinet & perquam obsequiosos, sarmentosos cauliculos, cortice virenti vestitos: folia minora sunt quam Vitalba, incondita, ad vnum coniplura pediculum, qui capreoli sæpenumero munere officioq; fungens, vicinis se circumplicat: flores candidi sunt: semina exigua coherentia, canescentibus quoque plumis, minoribus tamen ac brevioribus exornata, pro radicibus tenues sunt fibra.

Spontè



Chenopodium flammula. L.
Det. J. Presl 1845



Eleusine indica,
Det. Pers. 406

Sponte sua in Belgio nusquam exit, sed hortensis est. flores sub Augustum, semen serius succedit.

Flammula nomen à recentioribus accepit, habita fuit pro Clematidis alterius specie, sed tamen et semine & florum cum figura, tum colore & magnitudine ab ea differt.

*Altera Flammula foliis est amplioribus maioribusq³, Vi- 2
talba similioribus, quam & candidissimis flosculis, tum et semine plumaceam cristam gerente; in fastigiis cauliculorum eminentibus, refert. cubito cauliculi altiores; per se consistunt; sursumq³ arriguntur. Rarissima hac nostri est, & hortensis tantummodo.*

Vere noua promit foliola, & cauliculos: Aestate flores: Hyeme solæ reliquæ sunt radices.

Ab acri & mordaci eius qualitate & hanc Flammulã recentis atq³ huius ætatis docti appellāt. Matthiolus hanc eam esse existimat, quam Platearius lib. de simplici medicina cap. primo litera F, Flammulam nominat, & calidã siccãq³ quarto statuit gradu. Est tamen & Flammula quadam Ranunculi species, cuius in exulcerando vesicasq³ excitando nota palàm est facultas; de qua citius, quàm d' hac, scripsisse Platearium crediderim.

Nihilominus vtraq³ harum Flammularum multum a cris & valdè calida est, ipsa tamen Flammula Ranunculo, mitiores istæ videntur.

DE CLEMATIDE DAPHNOIDE.

CAP. XV.

CLEMATIS Daphnoides, longa, gracilia, rotunda, iuncorum instar tenuia, & geniculis intersepta, spargit sarmenta; quibus per terram serpit, radículas etiam subinde, sed tamen varius defigens. folia sunt lenia, la-



Vicia minor, L.
Dod. p. 406

riuscula, oblonga, forma quidem Laurinis similia, sed multò minora: flores secundum folia, quinque, foliolis patentes, inferius fistulosi, Buglosi floribus maiores; colore ut plurimum carulei; quandoque candidi, rarius rubentes; odoris nullius aut exigui; radices tenuissima fibra.

Rigua & aquosa querit loca, amat sylvas. viret perpetua in hortis fronde; ubi flosculi eius subinde multiplicatis luxuriant foliolis.

Huius & alia maior reperitur species, quae multo longioribus repit viticulis, & foliis est floribusque multo amplioribus, ceteris priori similis. Peregrina haec, & aliunde aduecta.

Vigent utriusque flores Martio, Aprili, Maio, & non raro serius.

Κληματὶς δαφνοειδὴς à Græcis dicitur: Clematis quidem, quia instar κληματῶν repentes proferat cauliculos: Daphnoides verò, cum à Lauri soliorum figura, tum & ad differentiam alterius, vel etiam altiarum. Nam Plinius plures eius nominis refert lib. xxiiii. cap. xv. ubi & hanc Aegyptiam cognominat. Est & alia, ait, Clematis Aegyptia cognomine, quae ab aliis Daphnoides, ab aliis Polygonoides vocatur, folio Lauri, longa tenuisque. Polygonoides verò vox inter nothas appellationes etiam in Dioscoridis exemplaribus reperitur. Præter hanc sunt etiam κληματὶς χαλκήρεως, aut potius κληματὶς χαλκήρεως. Alio autem loco Plinius lib. xxi. cap. xi. Vincam Peruinca & Chamedaphnè appellat. Vinca Peruinca semper, inquit, viret in modum Lauri (exemplaria perperam Linea habent:) foliis geniculatim circumdata, copiosa herba, inopiam tamen florum quandoque supplet. haec à Græcis Chamedaphnè vocatur. Describitur tamen ab eodem, & à Dioscoride, & alia Chamedaphnè, de qua alibi. Officina hanc Clematidem

Plinij locus corrigatur.

matidem Peruincam nominant : Itali Prouenca : Hispani Peruinqua : Germani Jugrun & singrun : Belge Wincoozde/maegden eruyt : Galli Lisseron.

Temperamento autem hac aliquantulum calet, sed tamen infra secundum gradum consistit, tantum abesse ut vrat aut exulceret : siccit verò multò amplius, adstringit quoque nonnihil. Alui profluvii & dysenteris, Dioscoride & Galeno auctoribus, prodest: dētiumq; dolores commansa mitigat.

DE CLEMATIDE ALTERA.

CAP. XVI.

QVÆ alterius Clematidis nomine à veteribus describitur, prolaxis admodum & tenuibus, geniculatis, subrubentibus sarmentis per arbores, frutices, perticas, pergulas, pedamenta scandēdo in altum prorepat : folia complura, prioris Flammula modo diuisa, sed tamen maiora latioraq; : flores perquàm elegantes è longis & tenuibus dependent pediculis, Clematidis Daphnoidis nonnihil referētes, sed tamen maiores, & ex quatuor tantum foliis per summa latioribus coacti, colore saepe caerulei, quandoque rubentes, staminibus aliquot mediis. semina plana, lata, rotunda, acuminata in globulum congeruntur. radices prolixæ, tenues, in omnem partem sparguntur.

Gaudet Soli expositis, sed tamen non omnino aridis, leto & haud irriguo solo melius proficit. Apud Belgas hortensis, in Hispania verò ac similiter in Britannia iuxta sepes & agrorum margines spontè exit.

Augusto mense, & quandoque Iulio, flores : semen Septembri perficitur.

Κληματίς ἑτέρα, & à nonnullis ἐμπύπτις, Latinis Ambuxum;



25

C. verticillata
dist. h. 1846

xum; vt Dioscoridis historius spuria addita habent: Hispanis Gormadera, quasi Vomitoria, dicitur.

Acre & vehementer exulcerans huius est folium, causticam, vt Galenus ait, vim obtinens: in quarti est ordinis excalfacientium initio.

Dioscorides folia imposita lepras remonere refert; semen verò tritum cum aqua pura vel mulsæ potum, pituitam & bilem deorsum ducere.

DE VINCETOXICO, SIVE ASCLEPIADE. CAP. XVII.

VINCETOXICO plures assurgunt teretes, lenti, ac frangi contumaces pediculi, cubito vno aut altero altiores, qui non rarò cacumine vicina admittacula aliquot circumitionibus amplectuntur. folia lata, oblonga, leuia, in acutum desinunt, angustiorum hederae foliorum figura. flores parui albicant, cum suauitate quadam grauitè odorati; sequuntur siliquæ oblongæ in mucronem attenuatæ; candida intus lanugine; & semine plano, oblongioris forma, subruffi coloris, ad Securidacæ accedente. radices tenues fibrosæ, numerosæ & graueolentes.

Reperitur & huius species, cauliculis crebrò longè procerioribus, perticas in proximo consistentes, ad quinq; aut sex cubitos multiplicatis voluminibus conscendens; cuius flores nigri; folia verò, siliquæ & radices vti prioris.

Vtraque species hortensis Belgio est, & nigra quidem rarior. alibi in montanis, asperis, saxosis, apricis frequentior.

Circa Iunium flores; sub Autumnum è maturis siliquis lanugo dependet.

Nomen Vincetoxico recentior dedit atas. Ruellio Hederæ



Asclepias vincetoxicum, L.
Bot. hump. 407.

deralis est: Germanis Schwalben wurtzel/ Swalutwe wortel; id est, Latinis Hirundinaria.

Dioscoridis habetur Asclepias, cuius est descriptioni cōformis, quod sententiam approbat. Tergiuersatur Matthiolus, et Vincetoxicum differens ab Asclepiade affirmās, radices & folia negat odore commendari: flores ait virus non redolere: semen non esse Securidaca: in exemplaribus nonnullis, ubi de foliis, dictionem μακρά; ubi verò de radicibus, πολλὰς non reperiri. Sed exigui ac nullius omnino momenti hæ rationes. Radices odoratas & similiter flores, maximeq; locis montosis nemo cui incorruptum odoratus organum esse negauerit: folia odore commendari, Dioscorides non asserit: non omnia βαρύσμεα virus redolent, graueolentia enim omnibus haud aequè magna est. semen tamen si non exquisitè quadrangulū, plana tamen oblongaq; figura, magnitudine item & colore satis Securidaca refert. Voces μακρά & πολλὰς omisse quid Matthiolo cōferre poterunt? folia hederacea sæpenumero longa, veluti Periclymeni & aliorum: & tenues radicle frequenter multiplices. Verba autē Dioscoridis ita se habent: Asclepias ramulos producit longos, circa quæ folia μακρά siue longa, Hederæ similia: radices multas, tenues, ἐυώδεις, id est, odoratas; florem graueolentem: semen vt Pelecini siue Securidacæ. Nasçitur in montibus. Extant inter spurias huius & κισσὸς ac κισσοφύλλον nomenclatura, quarum vtraque Vincetoxicorectè conuenit.

Facultate autem Vincetoxici radices calidæ sunt et sicca. venenis aduersari creduntur.

Dioscorides Asclepiadis radices cum vino epotas auxiliari scribit torminibus, & aduersus serpentum ictus: folia verò imposita ad mammariū & vteri raxondeias, i. malas difficulterq; curabiles passionēs, prodesse.



Cynanchum aculeatum
 Bot. Beech 408



P. grance, L.
Ind. penst. 40 f.

DE PERIPLOCA SIVE APOCYN.
CAP. XVIII.

PERIPLOCÆ duæ reperiuntur: vna cognomen nō-
dum inuenit: altera Repens dicitur.

Prior Periploca longis, tenuibus, viticulosis ramulis, ad-
minicula ponē posita Smilacis modo ambit: folia quoque
Smilacis ac Hedera sunt similia, sed odore grauiā, digitis
presertim attrita; flores in exiguis umbellis rari, albidī: si-
liquæ quales Vincetoxici, sed maiores, papposa et intus la-
nugine, qua semen conditur nigricans planumq;: radices
fibrosæ sub terra latius serpentes, & subinde progermi-
nantes.

Repens dicta Periploca, & ipsa amplexicaulis est, pro-
xima pedamenta etiam scandēdo ambiens ac circumuin-
ciens. caules eius longi, rotundi, lenti, geniculati, subrubet:
folia lata, longiora, nonnihil venosa. flores haud magni
quinq; foliolis albicant. siliquæ torosa, aliquantulum re-
curua, vt plurimum geminata, prioris siliquis maiores, mi-
nores tamen ac acutiores quā Rhododendri; in quibus
semen oblongum, duriusculum, nigricans, & molle, candi-
da, tomentoq; similis lanugo, qua inarescentibus disilien-
tibusq; siliquis in conspectum prodit. radices fibrosæ, haud
tamen vti prioris progerminantes.

Vtraque vulnerata liquorem fundit: prior copiosorem
minus candidum atq; non raro flauescentem: Repens per-
torem & candidiorem.

Peremnant huius caules defluentibus foliis (vnde repen-
ti fortasse cognomen) illius verò intercidunt, solis Hæmæ
superstuitibus radiculis.

Rara vtraq; Belgio, & quidē, vt Matthioli scribit,
etiam Italia; ex Syria isthuc adferuntur.

Periplocas huius ætatis docti appellant. ad Dioscoridis Apocynum referēdas satis videtur manifestum, præsertim eam quæ prior est. Appellatur autem ἀποκύνον etiam κυνοκρανὴ, ac Brassica canina. Sed & alia tamen est Cynocrambe Mercurialis sylvestris species.

Est autem Apocyni exitialis atq; perniciosa potissimum quadrupedibus vis. Nam, vt Dioscorides, huius folia cum pingui pani commixta, canes, lupos, vulpes, & pantheras obiecta interimunt; resoluuntur enim protinus eorum cæxendices.

DE LUPVLO.


CAP. XIX.

LUPVLVS amplexu viuū, et perticas aliāq; admicula circumligando se scandit. cauliculos promit longissimos asperos & hirsutos: folia quoq; aspera, lata, vitis aut potius Bryonia albæ similia; veruntamen nigriora & paucioribus incisuris diuisa. flores è summis virgulis racematim dependent, folliculosi, squamatim instar exiguorum conorum compacti, colore subalbido, ad luteum vergente; odoris grauis. radices tenues, sibi inuicē variè implicātur.

Restibile ac pingue desiderat solum: latior cultura exit. Nas citur & inter vepres senticetāq; circa agrorum margines, sed sylvestris; florum conos minores, rariores paucioresq; proferens.

Flores Augusto ac Septembri colliguntur, & ad cereuisiæ vsum reponuntur. Vere noui turiones erumpunt. Hyeme solæ restant radices.

Lupulum officina & passim vocant. pleriq; Lupum salictarium, vel Lupulum salictarium: Germani Hopffen: Belga Hoppe & hoppecrups: Galli du Houblon. Meminit



R

Hop plant, Lupulus
and purgative

minit Plinius Lupi salictarij lib. xxi. cap. xv. inter spontè nascentes aculeatas, quibus pleraque gentes in cibis vtuntur. Quo auctore Fuchsius Græcis *βούρ* appellari asserat, nondum reperire licuit: *Βούρ* muscus est. Dicitur et *Caucalis βούρ* à Democrito, vt Oribasius testis.

Calicij autem & sicci secundo ordine flores sunt Lupuli, caput facile implent, odore grauiore ipsum ferientes. Eiusdem temperamenti et folia ipsa sunt; et simul aperientia ac abstergentia.

Asparagi siue primi turiones Vere erumpentes minores sunt, in edulia recipiuntur; oblectamenta tamen magis, vt Plinius ait, quàm cibus. Nam alimenti quidem perexiguum conferunt; prosunt tamen visceribus, & aperiendo, & vrinas mouendo: faciliorem etiam aluum faciunt.

Folia, tenerioresq; cauliculi, & ipsi quoque flores iecur & lienem ab obstructionibus liberant: per vrinas expurgant: sanguinem emundant: aduersus diuturnas febres, scabiem & similes cutis fœditates, decocta in lactis sero prosunt.

Succus potentior est, & non modò viscera ab obstructionibus liberat; sed & bilem ac pituitam educere per aluum posse creditur. Eundem auribus instillatum à fœtore eas liberare putredineq; vindicare scribitur.

Floribus cereuisia conditur; copia tamen nimia amarorem ei conciliat, ac capiti molestiorem efficit.

Aqua in qua incocti flores farinâ subactâ, citius fermentatur massa, panisq; leuior ac rarior redditur.

DE IASMINO.

CAP. XX.

IASMINVM ex earum quoq; stirpium est numero, quæ adniviculis sulciuntur, non tamen amplexicaulis aut vicinis se circumuoluens; sed aliis tantummodo innitens, veluti pergulis, hortensibusq; scenis, quibus facili opere innectitur. Cauliculi eius prolixi, teretes, ramosi, flexibiles, geniculati, virentes; candida fungosaq; interius medulla: folia è singulis geniculis binæ, ampli, alarum instar expansa; composita videlicet ex quinque aut septem aliis lumbis, oblongis, saturatè virentibus, fastigio acuminatis, eminente in cacumine reliquis maiore. flores in summis virgulis, rari, in muscarij specie coherent, suauolentes, colore albidì: semen latius Lupinus quadàtenus simile, quod tamen raro succrescit: radix fibris firmatur.

Fertur huius esse species floribus luteis; & alia caeruleis. Sunt autem qui pro Iasmino luteo, Trifolium fruticans in Frumentorum historia cap. lxxxix. depictum; & pro caeruleo Clematidem alteram ostendant. Quòd si autem non aliæ quàm hæc pro Iasmini ceteris speciebus ostēdi queant, temerè plures eius species affirmantur. Vtrique enim harum multum à Iasmino abest.

Celitur Iasminum in hortis, et topiariis operibus expetit, non modò in Belgio, verum & in Italia ac alibi: ex Africa creditur aduectum. Flores Aestate rigent.

Inter Arabes Serapio primi nominis hanc Zambach: interpres verò Iesemin nominat, atque inde passim Iasminum, Ieseminum, Iosminum, aut etiam Gelseminum.

Apud Dioscoridem compositio est Iasmini olei, quod apud Persas ἐκ τῶν λευκῶν τῶν λευκῶν τῶν ἰκ, id est, ex albis Viola floribus fieri refert; quod non ex alterius stirpis,

quàm ex huius floribus conficiendum apparet. Nam Dioscorides inter τὰ ἱα, siue violas, pulchros atque elegantes flosculos subinde habet. Ita vt & huius flores ab eo violas dici, non debeat alienum videri; præsertim ipsa stirpe (vt satis apparet) illi incognita. Iam & ἰον προέρχεται eam oleo conferre qualitatem nequit, quæ Iasmino tribuitur. rarissimeq; idem albidum est; & si quando est, purpureo non præfertur. λευκία calidiora sunt: sed tamen nequaquam candida, sed eius generis lutea efficacissima sunt.

Qualitate autem Iasminum ac eius potissimum flores calidi sunt in initio secundi ordinis; vt Mesues apud Serapionem ait.

Oleum ex his confectum crudos discutit humores: frigidis ac catarrhosis cōfert: & hyberno vtile tempore. Quibus autem temperatura contigit calidior, his dolorem excitat capitis; & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis è naribus profluuij: eodem auctore.

In conuiuiis, ait Dioscorides, & post eum Aëtius, odoris causæ apud Persas vsurpatur. Prodest & lotis à balneo corporibus; quæ laxari calesceriq; expedit. grauiorem autem suaueolentiam habet: ita vt multi eoidcirco non libenter vtantur.

DE CAPRIFOLIO, SIVE PERICLYMENO.

CAP. XXI.

CAPRIFOLIA siue Periclymena duo sunt. vnum Germanicum: alterum Italicum dicere licebit. Vterque frutex amplexicaulis, vicinis adminiculis circumligatur.

¹ Germanicum longis, tenuibus, sed tamen lignosis, & in ramulos paritis sursum repit cauliculis; circa quæ ex interuallis



R. 3

Lonicera caprifolium var. *caprifolium*
Det. Presl 411
Bonn. herb. 1858



Caprifolium italicum, L.
 Ed. Herb. 411
 Gen. Hist. 1.39

teruallis folia binæ ex aduerso posita, oblonga, mollia, dilu-
te virentia, in inferiore tamē parte magis incanescencia. flo-
res in summis ramulis complures pariter emicant, oblongi,
candidi, suauolentes, interiūs caui, vna parte prominen-
tiores, staminibus aliquot è medio exeuntibus. fructus aci-
nis similis in exiguarum ruarum modum compactus; per
maturitatem rubet, in quo semen duriusculum. radix li-
gnosa non absq; adnatis.

Italicum lignosis quoque & in longitudinem prorepē- 2
tibus cauliculis priori omnino simile est: conueniunt etiam
folia, nisi quod ex aduerso posita subinde vniantur, & cir-
ca ramulorum præsertim fastigia ita coalescant, vt aceta-
bulorum profundiorum speciem exhibeant; è quibus flos-
culi enascuntur similes superioris, breuiores tamen, ac pau-
lo minores: bacca sequuntur similes & rubentes, sed tamē
dilutius.

Nascitur Periclymenum in syluis & in senticetis, fruti-
cibus nouellisq; arbutis, ita sæpenumero tenaciter & ar-
ctè se obuinciens, vt sui vestigia ipsis impressa relinquat.

Vere folia exeunt, vti alius lignosis. flores quandoque
Aprili, crebrius Maio ac Iunio conspiciuntur: fructus sub
Autumni tempus maturi.

Græci περικλύμενον; Latini Volucrum maius: Scribonius
Largus Sylua matrem appellat: officina Caprifolium, Ma-
trisyluā, pleriq; Liliū inter spinas: Itali Vinciòusco: Ger-
mani Geyßblatt/ speckgilgen/ zeunling/ waldtgilgē:
nostri Gheutenblatt/ mammecken scrup: Galli Che-
urefeuille: Hispani Madreselua. Inter nothas appella-
tiones sunt, αἰζίνη, κλύμενον, κάρπαδον, σπλίντον, ἐπατίτης,
αἰζίνη μέζων, κληματίτης, μυρσίνη, καλονέανθεμον.

Matthæus Syluaticus Pandectarum auctor, Caprifoliū
& syluarum matrem, cap. CXXXVI I. rectè quidem Peri-
clymenan

Matthæi Sylua-
tici error.

clymenon, sed perperam Lycium & Pyxacantham interpretatur: Peri lymenium cum Pyxacantha ineptè confundens. peius verò etiam facit Caprifolio vires Pyxacantha ascribens. Sed cap. CCCCCXXXI. Matrisyluam Periclymenon & Caprifoliū rectè asserit, ac legittimas ei ex Dioscoride vires refert.

Error pharmacopœorum.


Præbuisse hic gravissimi erroris pharmacopœis occasionem videt, qui succo foliorum & fructuum Periclymeni densato, pro Lycio, maximo cum periculo utuntur.

Error medicamentum.

Natus hinc & alius error, quod videlicet foliorum Periclymeni decoctum, vel ex his, aut etiam ex floribus stilliciti liquor, oris fauciumq; inflammationibus incipientibus, veluti adstringentia ac refrigerantia prodesse temerè existimentur. Periclymeni enim haudquaquam frigida aut adstringens; sed calida & attenuans est facultas.

Vt enim Galenus Periclymeni cum fructus, tum folia, adeò vehementer incidentis pariter & excalfacientis facultatis sunt, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio tamen urinam duntaxat moventia.

Dioscorides ait: Huius semen postquam ematuruit collectum, ac in umbra siccatum, drachma pondo quadraginta diebus datū, lienem absumit; lassitudinem discutit; orthopnææ & singultui prodest. urinam cit à sexto die cruentam. idem & parius accelerat. Tandem vim & folia habent, quæ xxx. diebus pota sterilitatem efficere narrantur. Eadem cum oleo illita periodicarū siue intermittentium februm horrores abigunt.



186 No. 358

Lonchocarpus xylocarpus,
Lam. bot. 1, 36

R 5

Cont. Det. fruct. 412

DE XYLOSTEO.

CAP. XXII.

PERICLYMENO cognatus est frutex *Xylosteon* nuncupatus, qui tamen aliis non circumvoluitur, sed nullis egens adminiculis per se consistit.

Caudices huius subinde mediocris crassitudinis: materies ligni candida est: ramuli rotundi albicante vestiuntur cortice; initio tamen et cum primum erumpunt, subrubentes spectantur: folia veluti Germanici Periclymeni oblonga, mollia, ex albidio virentia, prona parte candidiora ac leniter hirsuta: flores minores sunt, quam alicuius Periclymeni, candidi, bini in vno pediculo; succedunt fructus gemelli instar exiguorum cerasorum, rubentes, altero eorum saepe minore.

Apud Heluetios, & plerosq; alios Germaniae populos, in sylvis locis saxosis reperitur.

Aprili aut Maio flores, sed fructus Autumno appetente demum perficitur.

Plerique Periclymenum stans appellant: Germani alicubi *Hunds kirschen*, & *honds kerschen*, id est, Canum cerasa: Helvetij *Weinhultzen*: vnde *Xylosteo* nomē datum. Sunt qui Clymenon esse suspiciuntur. quibus Periclymenon, ab huius similitudine, veluti conuoluens se Clymenon dictū videtur. Sed Clymenon aliud omnino stirpis genus, caule faba, & folio plantaginis; ut quidem Dioscorides ait.

Huius generis & alius minor, omnino humilis est frutex; cuius cauliculi lignosi, tenelli, albicate cortice vestiuntur, & absque pedamentis eriguntur, non multo tamen cubito altius assurgentes. folia maiora, latiora, durioraq; sunt, minus tamen virentia. flores exigui, candiduli, in tenui oblongo pediculo bini; quibus fructus succedit rubens, ceraso

ceraso exiguo similis, maior quàm Periclymeni aut Xylostei, in quo semen vnicum.

Floret vnà cum Periclymenis. fructus Augusto perficitur. Ex Germania in Belgium illatus frutex est.

Nomen idem quod Xylosteo posteritas dedit; cuius minor ac humilis species hab. tar ac dicitur.

De viribus autem horum fruticum nihil compertū habemus, aut aliunde accepimus.

DE HEDERA.

CAP. XXIII.

IN censu earum, quæ adminiculu sustinētur, Hedera etiam occurrit referenda. per se siquidem non consistit, sed aliis adheret.

Eius genera, & prima quidē, auctore Theophrasto, duo.

Vna in altitudinem se attollit: altera humi rept. hac minor: illa maior Hedera dici potest.

Maiores siue assurgētis plures quidem, sed præcipuē tres rursus species: Candida, nigra, & Helix dicta; quarum trium Dioscorides meminit.

Scandit maior arbores, vetusta ædificia, parietesq;: caudices eius lignosi, subinde ita crassi vt arbori scere ipsa videatur; à quibus ramulos hanc illuc diffundit quàm plurimos, quibus veluti brachiis latè serpens in multam peruagatur partem; radículas etiam ab ipsis assiduè dimittens, quibus se arboribus ipsisq; parietibus annexens pertinaciter inaret. folia læuia sunt, splendensia superiore præsertim parte; initio quidem haudquaquam, sed vbi consenuerunt, angulosa: flores muscosi. in baccis varietas est; in colore florum etiam quadam.

Candida siquidem Hedera fructum fert candidum: & I
huius



Hedera helix, L.
Egl. pent. 413

huius una species fructum tantummodo candidum habet; alia verò & folium quoque. Fructum verò candidum ferentium, quadam maiusculum, densum & compactissimum profert, veluti in $\tau\epsilon\alpha\pi\epsilon\alpha\nu$ siue globum coactum, quam plerique $\kappa\omicron\rho\upsilon\mu\epsilon\acute{\iota}\alpha\nu$, Athenienses verò $\alpha\chi\alpha\rho\upsilon\kappa\iota\nu\ \alpha\pi\delta\epsilon\upsilon\sigma\mu\epsilon\acute{\iota}\nu$, Acharnicam irriguam nominant: altera verò minorem & $\delta\iota\alpha\chi\epsilon\chi\acute{o}\nu\epsilon\rho\nu$, siue sparsiore, veluti nigra racemum. hac Plinio Selinitium.

Nigra fructum minorem, nec uti candida compactum, 2 sed sparsum fert, et colore quidem, aut nigrum, aut crocatum, siue crocei coloris. Hanc Dionysiam nonnulli, auctore Dioscoride, vocant; alij Bacchicam, cuius coronis Poëte utuntur; Plinio teste, lib. xvi. cap. xxxi. i. i. i.

Tertia $\epsilon\lambda\iota\zeta$ candida habet sarmenta: folia tenuia, angulosa, & ut Theophrastus, $\epsilon\upsilon\delta\upsilon\mu\acute{o}\tau\epsilon\rho\alpha$, id est, latiora, siue 3 ut Plinius reddidit, concinniora. (Dioscoridis exemplaria perperam $\epsilon\pi\upsilon\delta\pi\alpha$ legunt.) fructum non gignit.

Dioscoridis corruptus locus.

Huius præterea & species Theophrasto sunt. Est enim una virens ac herbacea, quæ plurima: altera candido folio: tertia $\pi\iota\mu\acute{\iota}\lambda\eta$, siue versicolor, quæ Trachia vocatur.

Plinius Helicen non genere sed ætate à reliquis differre quosdam existimare recenset: primoq; Helicen, fieri vetustate Hederam.

Addit Theophrastus, Helices species, suas quoq; differentias habere: & harum quæq; inquit, distare videtur. Quippe inter herbaceas, quadam tenuioris folij; quadam verò minus hac omnia habet. $\pi\iota\mu\acute{\iota}\lambda\eta$ s siue versicoloris, unius maius; alterius minus folium, differunt & secundum $\pi\iota\mu\acute{\iota}\lambda\eta\alpha\nu$, id est, coloris varietatem: ita & magnitudine, & colore differunt. $\epsilon\upsilon\alpha\upsilon\zeta\epsilon\sigma\acute{\alpha}\tau\eta$, siue auctu facili, autem herbacea, $\eta\gamma\ \epsilon\pi\iota\ \pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu\ \sigma\pi\epsilon\iota\sigma\omega$, id est, & maxime se propi-

Posteriora verba sic Plinius reduit: Adolefcit in longitudinem maximè herbacea. Sequitur mox: Arbores autem necat candida, &c. Quæ verba non ad candidam Heliscen pertinent, sed de fructifera candida à Theophrasto scribuntur. Ex quo omnia sua Plinius lib. XVI. cap. XXXI III. transscripsit, desideratis tamen non paucis. Nam hoc loco de Hedera non pauca reperiuntur prætermiffa. Poterunt autem hæc ipsa ex Theophrasti lib. de historia stirpiū tertio, à diligenti aliquo facile restitui. Quod à clarissimo ac doctissimo viro D. Gulielmo Pantino perficiendum brevis speramus; qui in restituendo Plinij exemplari sedulam ac diligentissimam operam iam diu navat.

Plinij mutilus
locus.

Plinij lapsus.

Referret hoc loco turpem quoq; Plinij lapsum ostendere, hoc eodem de Hedera capite statim initio, vtrumq; Cistum, marem videlicet & foeminam, inter Hedera genera numerantis, vocum *κίσκου* & *κίσκου* affinitate decepti, nisi iam sæpe ab aliis doctissimis viris in hunc foret animadversum.

- 4 Minor Hedera nigra similis est, sed minor, cauliculi siue viticulae eius tenues sunt; folia angulosa, virentia, subinde maculosa. non arbores, non muros, aut parietes ascendit; sed humi defixa repit: fructum etiam non gignit.

Nigra Hedera in Italia, Germania, Belgio, Gallia, circa parietes & arbores frequens est. Candida in Græcia reperitur. Minor passim in sylvis & opacis locis gignitur. Hanc serpentibus gratissimam, & sub hac hybernis mensibus eos latitare, Matthiæolus scribit.

Flores Hedera sub Autumnū producit: bacca post Hyemis solstitium perficiuntur.

Hederā Græci *κίσκου* & *κίσκου*; Germani *Eyheu*: Belgæ *Depl*: Hispani *Yedra*: Galli *Liatre* appellant. Occurrunt inter spuria, & hæc eius nomina: *κίσκου*, *κίσκου*, *κίσκου*.

χρυσόχαρτ, πομπιλή, κορύμβηθρα, κύσσιον, δινύπορ, ἰδυ-
 δήριον, περσίς, κήμη, ἄπλαν, Sylva mater.

Maiores Theophrastus ὑψοὺς κίσας, Latine attollentē
 aut assurgentem Hederam dixeris; Gaza excelsam red-
 dit; Plinius rigentem Hederam appellare videtur. Recen-
 tiores Hederam arboream, quæ arbores complectitur; mu-
 ralem verò secundum parietes nascentem appellant. Sunt
 tamen qui velint omnem assurgētem arboream cognomi-
 nari, quibuscūq; tandem illa conscendens adhaereat; ad
 differentiam nempe alterius per humum repentis.

Minor ἐπιζεύς κίσας vocatur, Germanis Elepen rhyen. 4
 Dicitur & χαμαίσας; differens tamen multum ab He-
 dera terrestri superius descripta. Helicen siue Cliniculam
 Latine nuncupatam hanc nō pauci existimant. sed Theo-
 phrastus ἐλικὰ ab ἐπιζεύς κίσας differre ostendit. Tertiā
 enim inter assurgentes Helicen facit.

Cæterum Hedera, vt Galenus ait, ex contrariis compo-
 sita est facultatibus; habet enim quiddam adstringentis
 substantia, terrena & frigida: habetq; etiam nonnihil a-
 cris, quam calidam esse vel gustus cōprobat: nec deest ter-
 tia; aqueam namq; substantiam, quandam tepidam obtri-
 net; certè si viridu sit. Siquidem dum arescit, hæc prima
 exhalet necesse est: manet quæ terrea est et frigida & ad-
 stringens; & ea quæ calida ac acris.

Viridis autem, foliis eius in vino decoctis, vlcera grandia
 conglutinat, quæq; maligna sunt, ad sanitatem reducit: tū
 igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cū ace-
 to cocta folia lienosis prosunt. Flores autem quodammodo
 validiores sunt, vt ad lenorem reducti cum cerato ambu-
 stis conueniant.

Præterea succus medicamentum est errhinon, capiti
 purgando idoneum; tum vetustas aurium fluxiones sanat:

ad hac vlcera vetera, tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo misceatur.

Lachryma eius lentes interimit, pilis nudat: vsq; aded calida potestatis, vt obscure adurat. Est autē velut aquem quidam liquor, sicut alie omnes lachrymæ. hæc Galenus.

Eadem serè Dioscorides, sed tamen & paulo plura habet. Nam & arinos, ait, quinque tritos, & cum rosaceo in malicorio calsactos, & in oppositā aurem instillatos, dentium mitigare dolores: denigrare item corymbos capillos; mouere mentes tritos ac subditos.

Nostra etate rarissimus Hedera vsus, nisi foliorum, quæ vlcuscula in cruribus, aut alia corporis partibus procuratus (fontanellas vocant) imponuntur. Humores enim & ichores ad eas partes alliciunt: inflammationes verò ab iisdem arcent, recēter quidem decerpta nondumq; reficcata. Sunt etiam, qui corymbos ad ciendam vrinam efficares asserant; & calculosis ac nephriticis ea propter exhibeant.

Finis libri tertij.

DE

DE DELETERIIS, AC PERNICIO- SIS HERBIS,

LIBER QVARTVS.

PROXIMUM à purgantibus, deleteria ac pernicioſa herba ordinem poſcere videtur. Vti enim purgantium quàm plurimorum vehemens, moleſtiſſima, ac non raro pernicioſa quoque, humanis corporibus facultas; ita & omnium impenſè vehementerq; calidorum aut frigidorum periculoſiſſimus ac ſape mortiferus eſt uſus. Purgantes adhibitis franſis atque contemperantibus nonnullis reprimi ac corrigi opus habet: hæ etiam exquisitiſſimam moderationem, optimum cum iuſtiſſima cōtemperatione modum requirunt. Neutra per ſe utiles. Vtræq; intensiſſimas facultates obrinent. Vtræq; correctionē deſiderant. Quibus de cauſis purgantibus haud perperam pernicioſa ſuccedere videntur.

Eſt verò & harum ſtirpium notitia medicis non minùs neceſſaria quàm aliarum, vt videlicet ipſas, vt Scribonius Largus ait, deuſitent, et ne per ignorantiam aliquam aſſumant. Vel etiam, ſi quando neceſſitas incidat, vt iis vtantur; id cum matura deliberatione, ſummo cum delectu, & adhibitis propriis franſis efficiant.

Habent ſiquidem & pernicioſa ſuam quandoque vtilitatem, conferuntq; quandoq; commodū. Pauca enim tam pernicioſa, qua non aliqua ex parte, quandoque & oportuno tempore ac loco proſint & conferre queant: contemperatione & modo adhibitis.



R. repens.
Bot. Beech 425



R. acris, L.
ord. pent 426

DE RANUNCVLIS, ET PRI-
MYM DE HORTENSI,

CAP. I.

RANUNCVLI genera quatuor Dioscoridi sunt: vnum latioribus foliis: alterum lanuginosius: tertium minimum: quartum lactei siue candidi floris. Posterioris verò observationis multo etiam plura. Possunt autem hac in duo prima diduci genera; ita vt vnus sit hortensis Ranunculus: reliqui autem syluestres. Horū autem nonnulli vulgares; alij verò externi. Est porrò & radicum ac foliorum differentia. Quidam enim tuberosa est radice: alius longifolius, vt Flammula.

Hortensis Ranunculus folia promit in particulas nonnullas dissecta, specie frequentius trifolia, quandoq; quinquesolia, per margines rariùs crenata, saturatè virentia, in quibus nōnunquam veluti quadam macula inalbant. caules rotundi, leniter hirsuti; partim reclinantur, radículas demittentes, quibus se humo affigant; partim ad dorsantalem aut paulo ampliorem assurgunt altitudinem. in fastigiis horum flosculi elucent quinquesolij, auri luteo colore splendentes; staminibus aliquot exiguis cent coloribus, medium septientibus orbiculum, qui auctior factus semina in globulum confarcta continet, ex quibus componitur. radices tenues fibrosa candicant.

Locis vmbrosis & nonnihil humētibz, non prorsus aridis, secus vias & in locis horterum incultis spontè exit: in pratis quoq; & non rarò iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim quòd in hortis tantummodò gignatur, hortensis dicitur, sed quia serè prae ceteris hortis sit familiarior; atq; in his creberrimè graminum permixtus reperiatur, vbi & eius flosculi quandoq; multiplicatis nascuntur folijs.

Maio ac deinde seriùs multo vident flores.

Ranunculi esse speciem nō modò florum, verùm & ipsa totius herba facies & facultas ostendunt. Plinio Polyanthemum est, quod & à nonnullis Barrachion appellari testatur: vulgò *Booterbloemen*: Germanicè *Schmaltzblum*.

Temperamēto hæc herba calida quoq; & exurens est, Ranunculis similis, paulo tamē mitior. Caustica vi, inquit Plinius, exulcerat cicatrices, & ad colorem reducit; eademq; vitilignes concorporant.

DE SYLVESTRIBVS RANUNCVLIS.

CAP. II.

INTER sylvestres Ranunculos caules primi sunt rotundi, laeves, interius vacui, subinde crassi, in alas diuisi: folia in longis, crassis, pinguibus pediculis, lata, lenia, marginibus incisa: flosculi in cacuminibus lutei, pallidiores & minores quàm hortenses Ranunculi; atque inde capitula, primùm erampentis Myacantha asparagi cacumen emulantiæ: radices candida multis fibris capillatæ. Tota stirps dilutè virenti respundet colore.


In palustribus et iuxta riuulos, non rarò in scrobibus ac fossis aquas habentibus, aliisq; similibus locis exoritur. Nonnullibi etiam letior maioribusq; luxuriat foliis & caulibus: alibi minor.

Reperitur et purpureo flore, ut quidem Dioscorides ait; sed rarò, Cordus addit, in Germania; in Belgio verò nusquam.

Proximus caulibus ac foliis est non perinde lauibis, diluti coloris aut resplendentibus, sed obscurius omnino virentibus, & non rarò è puniceo colore nigricantibus, nonnihil



R. sceleratus, L.
Pod. pempt. 426



54

R. polygonifolius L.
Det. Fourn. 1827

R. arvensis L.
prodr. herb. 427



quoque hirsutis ac lanuginosis, sed tamen perquam exiguum. folia in quinque instar Pentaphylli, sed tamen dissimiles, latiores easque laciniosas partes profundioribus sectionibus diuiduntur. cauliculi omnes ad cubitale in vel etiam ampliore assurgunt altitudinem. flores auricolores elegantes, forma & magnitudine hortensis. semen ferentia capitula vti hortensis. radices fibrosæ, è quarum capitibus nervi subinde obliqui, quibus propagatur. Est hæc frequenter altior & ramosior non modò quàm hortensis, verùm etiam quàm palustris & aruensis.

In pratis reperitur, locis paulo ab ipsis scrobibus aut fossis remotis, nequaquam tamè aridis aut irriguis. Luxuriat hortis illatus, & flores non rarò producit multiplicatos.

Tertio Ranunculo, quem Aruensem nominant, minora 3 ac teneriora sunt folia, sed magis ac variè dissecta, diluti viroris: cauliculi recti rotundi: flores parvi, lutei, pallentes, quibus subnascitur non Asparagi cacumini similis orbiculus, sed latum, asperum & pungens capitulum, ex aliquot congestum seminibus maiusculis, planis, acuminatis & breuibus, minimè tamen innocentibus, spinis obsitis. radix candidis quoque & capillaceis fibris constat.

In aruis plerisque, locis alsiosis, vbi humidius solum, gignitur.

Ranunculum horum flores Maius ac Iunius menses, & subinde, sed tamen varius, post sequentes dant.

Dicitur autem Ranunculus Græcis *βερύκλον*; à nonnullis *τέλειον ἄγριον*: Germanis *Hanenfus*; & *Hanenboet*; Gallis *Bacinet*: Italis *Pic coruino*: Hispanis *Yerua belida*. Apuleius plures appellationes adfert, inter quas sunt, *χλωροφύη*, *χαυσικὴ*, *ῥοτέλειον*, *χαυσικὴ*, *ἡράϊσιος*, *Apium risus*, *herba scelerata*, *Apiastellum*, *Dentaria*, *Auricomum*. Pauca autem harum appellationum omnibus,

nonnullæ his; quædam aliis speciebus propria magis videntur. Plinius Strumeam etiam appellari refert. Nostri, ait, herbarij Strumeam vocant, quoniam medetur strumis.

Primus Ranunculus Dioscoridis.

- 1 Prima species *ῥαπέλιον ἢ σέλιον ὁ δάπνον*, Apium palustre, Ranunculus aquatilis dici potest, nec male Apiastellum: Germanicè Wasserhanenfusz; waterhanenboet. Et primus est Ranunculus à Dioscorido descriptorum: quod ex ipsa descriptione satis est manifestum.

- 2 Proximam speciem nostri Lupaerx claudwen, id est, vngues aut pedes leopardi dicunt. atq; hic est Ranunculus auricomus, & Democriti Chrysanthemum. Plerique minus rectè Pedem corumum faciunt. Posset iste Dioscoridis secundo respondere, nisi is, qui Illyricus cognominatur, huic similior esset.

- 3 Tertius aruensis & à semine spinis horrente echinatus Ranunculus vocatur: Germani Weißhanenfusz & accherhanenfusz.

Omnes autem qualitatem, Galenus ait, vehementer acrem possident, adè ut cum dolore exulcerent: hac ratione si moderatè ac conuenienter vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues diuellunt: tum leprosis stigmata digerunt, et acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant, pauco tempore admota: nam si diutius inhæreant, non excoriatur solum ipsa cutis, sed et in crusta vritur. Atque hæc omnia caulibus & foliorum sunt opera, si imponas virentia.

Porrò radix arefacta sternutationem prouocat, similiter aliis quæ valenter desiccant: sed & dolentes dentes iuuat, vt & frangat eos; valenti scilicet exiccatione; et vt semel dicam, calida & sicca valde est radix, tum vniuersa adè herba. hæc Galenus.

DE EXTERNIS RANUNCULIS.

CAP. III.

EXTERNORVM Ranunculorū, qui videlicet Belgio peregrini sunt, Vnus Illyricus cognon. inatus, cauliculos fert tenues, teretes, medio: rō longitudinis: folia verò oblonga plurimū fissa incisuris; vtraque subcandida, & nonnulla tenui lanugine conuēstia: flores luteolos, pallidiores, quàm Auricomi Ranunculi: semina verò vti illius: radices multis parvis tuberibus veluti granis aut oblongiusculis exiguis bulbulis coherētes. Ex Illyrico primum in Italiam, atque inde in Belgium illatus fertur: cum aliis flores seminag₃ pr ducit.

Vniuersa autem stirpi huius constitutio, et figura, cum secundi Dioscoridis Ranunculi descriptione cōuenit. Nam lanuginosior est quàm alij: cāulis satū longus est; & foliorum incisura quamplurimē. Verisimile autem est, nō modō in Illyrico, verūm & Sardinia quoque insula reperiri: vtraque siquidē regio maris Mediterranei vndis alluitur.

Dioscorides enim secundum refert Ranunculū *ῥωωδίσειον*, siue lanuginosiorē esse; & *μακροκαυλότερον*, siue longioris caulis; & *ἐν τομῇ ἔχειν πλείους τῶν ἑύλων*, id est, foliorum incisuras siue sectiones quamplurimas habere: nasci: q, plurimum in Sardinia insula.

Secundus Ranunculus Dioscoridis.

Eadem quoque de hoc secundo genere Plinius lib. xxv. c. xlii. nisi quod nō lanuginosius, sed foliosius esse scribat: sed suspitio est, pro foliosius, restituentum esse pilosius.

Plinij locus restitutus.

Non inatur autē secundus Ranunculus *τέλειον ἀγριον*, id est, Apium syluestre, item & herba Sardoā. Potest & Apium r. s. u. & *ῥωωδίσειον* dici. Esse & hæc videtur Gelotophyllis illa, cuius Plinius lib. xxlii. cap. xvii. meminuit; qua cū vino & myrrha bibita, variis ait observari species,

Gelotophyllis.



R. illyricus, L.
Bot. pres. 428



R. lusitanicus L.
Det. DC. 429



R. acris
 Dord. pent. 1429



Ranunculus acris, L.
Oed. herb. 630

species, ridendiq; finem non fieri, ni potis nucleis Pineæ nucis, cum pipere & melle in vino palmeo.

- 2 Secundo externorum siue peregrinorum Ranunculorū folia sunt oblonga, angusta, nequaquam fissa, sed graminis aut tritici annula, è diluto & albicante caeruleo colore virentia: cauliculi breuiores palmum aut sesquipedem tantum alti: folia seminaq; vt Illyrici, sed radices multis tenuibus confibrata.

Circa Narbonam in pratis reperiri fertur. Veteribus cognitum fuisse nondum constat.

Nomen ei nullum datum, nisi quis velit ab ipsa foliorū similitudine Ranunculum gramineum dici.

- 3 Tertius inter externos Lusitanicus Ranūculus, reliquis humilior est, foliis ex utroque latere venosis, leuibus, relucens, indivisis, margine tantum aliquantulum incisus: pediculus ab ipsis radicibus palmaribus absq; adnatus, in quorū singulis flos vnicus, luteo auti colore resplendens, odoratus, maior & foliosior quàm aliorum; staminibus in medio coloribus, inter quæ capitulum emicat. pro radicibus multa quasi grana veluti Illyrico Ranunculo.

In Lusitania et Batia Hispania mōtib; viret, floresq; hyberni mensibus, ac non tard ipsa Bruma.

Ranunculus inter-
tus Dioscoridis.

Nostri Lusitanicum et hyemalem Ranunculum appellant. Dioscoridis tertius est, quem ait, τὸ ὅσπερ κυρτὸν καὶ ἰσοκύον (exemplaria pleraq; διότι τὸ κυρτὸν minus bene habet) τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὁμοῦ καὶ ὁμοῦ, id est, multo minorem, odoratum, & florem auro similem: cuiusmodi Lusitanicum hunc esse ostendimus.

Dioscoridis lo-
cus emendatus

- 4 Albus Ranunculus externorum quartus, foliis in laciniis sectis, & crenatis, sed tamen maioribus, secundo syluestrium accipit; sesquicubitalis. caulis in alas sparsus, in quibus flores vt ceteris Ranūculis, sed albi & lactei candori;

doris; staminibus tamen in medio subluceis capituli rudimentum ambientibus; quod ex consarctis seminibus quoque constat. radices filra sunt.

In plerisque Gallie præsertim Narbonensis montibus, & apud Allobroges subinde reperitur.

Dioscoridi quartus esset Ranunculus, nisi obstaret magnitudo. Nam quarto Dioscorides album tribuit florem, sed tertio similem, id est, paruum ac minimum etiam facit. Excedit autem iste amplitudine & magnitudine multum ipsam tertium. Sed fieri potest, ut non tertio, sed reliquis similem Dioscorides dicere voluerit; ita autem, nulla interposita remora, quartus est. Hallucinantur autem non parum, qui hunc inter Aconita referre student.

Ranuncul* quartus Dio. coridia

Accedit his & quintus globosi floris Ranunculus, qui solis, caulibus, radicibusque, satis secundum sylvestriū refert: flos eius quoque auricolor, verum maior, plurimumque soliorum, qui non totus panditur aut explicatur, sed in globuli formam collectus, nascenti quodammodo similis, vige.

Proferunt hunc Heluetiorum montes, & præsertim is, quem fractum nominant.

Gesnerus ait, Trollium florem vulgò dici.

Ad Aconiti genera non pertinet, sed Ranunculis venit annumerandus.

Est autem externorum horum omnium Ranunculorum facultas vehementer quoque calida, acris & exulcerans, & secundi potissimum, Sardoam quā diximus esse herbam.

DE RANUNCULO TUBEROSO.

CAP. IIII.

TUBEROSVS Ranunculus variè dissecti, latis ac virentibus foliis, cauliculis, auri colore splendentibus flosculis,



R. tuberosus, L.
Hand. f. 1831


culis, semineq; in capitulis aspero, hortensem aut sylvestriū alterum satis refert; sed radix instar rotundi globuli, paruo exiguoq; rapo similis, ex qua tenues gracilesq; dependent fibræ.

Prouenit in incultis & aridis Germaniæ ac Belgij nonnullis locis: ad hortos translatus sæpè luxuriat non modò foliis, sed & floribus densè multiplicatis. Nascitur & alibi amplior ac maior, veluti in Britannia insula siue Angliæ, ubi rapum eius in maiorem excrescit quantitatem. Quod ad hortos Belgij translatum latius etiam gignitur, & non modò flores multiplicans, sed & vnum ex altero etiam subinde promens.

Dioscorides huius non meminit: Apuleius verò ab aliis separauit, seorsum de isto agens, & peculiariter Batrachion appellans: vnde & Apulei Batrachion dicitur. vulgò Rapum D. Antonij appellant.

Non minùs autem huius acris; quàm aliorum vis & facultas. Vsus est præcipuè rapi, quod plerique pestilenti bubone torreptus cum sale contusum statim initio, aut semori, aut brachio, infra videlicet affectum locū apponunt, ita virus & morbi malignitatem ad ignobiliorem partem attrahentes. Exulcerat enim, et vesicam mox excitat, cuiuscunq; corporis parti fuerit applicatum.

Apuleius, si lunatico in ceruice, inquit, ligetur lino rubro Luna decrescente, cum erit signum Tauri vel Scorpionis parte prima, mox sanabitur. Item: herbari Batrachion rufam cum sua radice mixto aceto impones his, qui habent cicatrices nigras; exedit eas, & similè corpori reliquo reddit colorem:



Ranunculus flammula: L.
Prod. pempt. 432

CAP. V.

FLAMMVLA hæc cauliculis assurgit cubitalibus ferè, nonnihil geniculatus; folia circa quos sunt oblonga, salsaliciis similia, longiora tamen, per margines subinde serrata: flores quales Ranunculis lutei, pallidiores paulo; semen in capitulis simile: radices fibrosæ vt & aliorum Ranunculorum.

Humidis & riguis gaudet, præsertim vbi sterilius solū. Vnà cum aliis Ranunculis Maio mense flores facit.

Recentiores Flammulam, & Ranunculum Flammulæ vocant: Cordus Ranunculum ματύραλλον dicere maluit: alij Ranunculum longifolium: Belgæ Egelcoolen. Ferunt enim hanc ouillo generi esse perquam perniciosam, easq; hac pastas herba, inflammatione iecinoris, internorumq; viscerum erosionibus ac exulcerationibus corripit; quod malum Egel vulgò appellant: vnde herba nomen.

Meminit & Plinius lib. xxi. cap. xiii. herba cuiusdam ab exitio iumetorum quidem, sed præcipuè caprarum, Aegolethron appellatæ, suspicari fortè licet, hanc esse, sed affirmare non aequè facile. Aegolethron.

Occurrit et apud Octauium Horatianum Cleoma herba, quæ ait nasci in humidis, & sinapi similem esse. Si autem forma similis, à Flammula ista differens est. Nam Flammula hac sinapios forma non respondet. Cleoma.

Facultate autem Flammula Ranunculus ceteris Ranunculis similis est, acris similiter, exulcerans, & vesicas faciens.

FOLIIS Pulsatilla plurimis, tenuiter dissectis, asperis & pilosis agrestem quodammodo amulatur Pasinacam, tenuius tamen diuisa ac hirsutiora sunt. surgunt inter hac cauliculi semissem alti, tennes & hirsuti, unico sociati foliolo minori; in fastigiis quorum flosculi, è senis foliolis oblongis, & nõ raro reflexis; colore vt plurimum violæ nigra purpureo, quandoq; candido, alias luteo, rariùs rubente; staminibus in medio luteis, capitulum succedit villosa casarie comosum & incanescens, sub qua semen. radix longa, digitalis quandoq; crassitudinis.

Apud Gallos locis incultis gigni Ruellius scribit, nonoq; Vere iis montes florere. Belga in hortis habent. Germania etiam satis familiaris, præsertim purpurei floris: Albidi floris Auernia & Narbonensis Gallia, montes suppeditant; lutei Taurinenses Allobrogum: rubri floris ex Alepo Syria vrbe se habuisse, Petrus Pena & Matthias Lobelius doctissimi ac diligentissimi scriptores referunt.

Galli Coquelourdes; Germani Kueckenschell nominant: vulgò Pulsatilla, & à nonnullis Apium risus dicitur. Non est tamen herba Sardoa, quæ propriè Apium risus videtur appellanda. Non est etiam Ranunculi, neque etiam Anemonæ species, vtrisque tamen & præsertim facultatibus accedit.

Est enim Pulsatilla vehementer acris, quamcunq; contigerit corporis partem, si imponatur trita, exulcerans & erodens. Ranunculis haud inferior: proinde & calida vehementer ac sicca.

CAP. VII.

ANEMONES multa & differentes reperiuntur. Dioscorides has ad duo conatus est referre genera: quandam enim, ait, *νῦερα*, cultiuam aut hortensem dixeris: aliam verò *ἄγρια*, id est, syluestrem esse: & satiuæ plures addit reperiri species, quas tamen non foliorum florumve forma, sed coloribus tantummodo distinguit. Nos eas quæ nobis occurrerunt, referemus.

Prima harum folia habet pauca, sed in lacinias diuisa, I
secundi ex syluestribus Ranunculis aut hortensis satis similia, sed tamen minora. flos in breui & palmum alto pediculo emicat, ex XII. aut XIII. foliolis angustis, oblongis, & acuminatis; in quorum medio capitulum aliquot circumseptum staminibus, quod exili incanescit piloso flocco; cui subest semen. radix initio oliuæ magnitudine, sed temporis progressu adaugetur, & grandior facta veluti geniculis articulatur; obliqua, non rectè descendens, fibris adhaerescantibus nonnullis. Color flori elegans est, in dilutiore purpura rubens; qui quandoque ab vtraque, aliàs ab inferiore tantum relucet parte intensior, exterius remissior & inalbicans. Huius generis & albi sunt flores; sed rariores.

Proxima Anemone folia promissis quàm præcedens ampliora & hortensis Ranunculi similiora, attamen minora; trigemina videlicet coherentia. flores huius ex XIII. aut XIIII. quoque foliolis, sed haud acuminatis, ac subinde repandis committuntur; colore carulei, & Cyaneo flori concolores; staminibus luteis medium orbiculum amplectentibus; quod nullis incanescit pilis, sed veluti Ranunculi, Asparagi amulatur germen. radix obliqua, crassa, ge-




A. hortensis, L.
P. d. fruct. 434




T 5

Anemone
1744
434





Darl. hump 435



A. nemorosa, L.

Dist. Penck. 435



A. trifolia, L.
Guss. herb. 436

3 *nica tuberaq;* plura habet. Tertia Anemones maiora sunt folia, crebrioribus ac tenuioribus etiam diuisuris infecta; pediculus similis; flos maior, magnitudine cum *Papaueris Rhœadis* ferè decertans; VII. aut VIII. foliolorum tantum; pulchro viola nigra purpureo arridēs colore; paulo tamen dilutiore. capitula huius pubescunt vt prima: radix oblongior, crassior, similiter obliqua, crebrius geniculata, puniceo colore subnigricans. Est huius rubens quoque species, flore phœniceo, & vt *Rhœadis* colorato; item tertia etiam candida.

4 Quarta Anemone tertiam foliis, cauliculis & radicibus refert: flos mediocris quoque magnitudinis, *Rhœadis* colore rubens, densis & frequentibus stipatis foliolis multiplex; quorum X. aut XII. exteriora maiora, interiora verò reliqua exigua.

5 Quinta species foliis *Ranunculum* refert hortensem, sed tamen minoribus. flos paulo maior, senis ferè constat foliolis, candidus, aut è purpura rubens, sed modò dilutior, aliàs intensiore colore. capitula aspera, parua, nuda. radices tenuiores, sed oblique quoque, nihil aut exiguum geniculatae, demissis aliquot deorsum fibris.

6 Huic similis sexta est, foliis tantummodò floreq; minor, eoque luteo, *Ranunculi* floribus concolor. radix similis quinta.

7 Properat huc & alia quadam, tamen si foliis differens. Neque hac enim *Coriandro* aut *Ranunculo* folia gerit similia; sed instar *Trisoli* potius. coherent siquidem terni non magna, lata, acuminata, indiuisa, margine tantummodò crenato. cauliculus palmum altus; cui flos insidet candidus, formam *Ranunculi* florum emulatus, qui marcescens nonnihil purpurei coloris contrahit. radix etiam obliqua, in propagines quasdam extuberat, non absque capilla-

capillamentis fibrosis subnatis. Anemonum autē quintum & sextum genus, in pratis & syluis, præsertim locis humidioribus ac vmbrosis, in Germania ac Belgio reperiri queunt. reliqua peregrina sunt, quæ nobis nobilissimi viri D. Ioannis Brancioni amplissimus ac ditissimus hortus præbuit.

Flores Anemones Aprili vt plurimum mense Belgium conspicit.

Referendæ autem omnes hæ Anemones ad ἡμέρας, siue satiuas, sunt. Sylvestris species ab his differens.

Est enim sylvestris Anemone, auctore Dioscoride, Anemone sylvestris. ἡμέρα, id est, omnibus suis partibus, sativa maior; solis latior ac durior; caput habet oblongius; florem ποικίλον siue phœniceum: & radículas tenues, numerosas.

Phœniceus autem color is est, qui in Rhæadi papaueris flore relucet. Nam et huius ἄθος ποικίλον, id est, Phœniceus flos. Phœniceus color.

Similem autem hanc sylvestrem Anemonem, Argemonæ ac Rhæadi Dioscorides innuit, referens plerosque aberrantes Argemonem appellare Anemonem, propter colorum in floribus similitudinem. Neq; aliam etenim Anemonem (quod pleriq; suspicantur) quàm sylvestrem Argemonæ ac Rhæadi similem facit. Reliqua siquidem Anemones sativæ, & minores sunt, & variè coloratos flores promunt.

Dioscoridis exemplaria hoc loco perperam dictionē ἐν πατόριον habent, vt non solum ipse sensus verborum, sed et Plinij exemplar satis ostendit, Eupatorii vocem non admittens. Cuius hæc sunt, Dioscoridis consentientia, verba, lib. xxi. cap. xxi. hanc (scilicet sylvestrem) errore ducti Argemonē putāt multi: alij rursus Papauer, quod Rhæan appellauimus. Sed distinctio magna, quod viraque hæc postea

Dioscoridis locus corruptus.

postea floret. Nec autem succum illarum Anemona reddunt, aut calyces habent, nec nisi Asparagi cacumen. hac Plinius. Dioscorides discriminē simile harum etiam adfert: In Argemone, inquit, & in Rhæade Papauere minus saturatus est phœniceus color: & amba seriùs florēt. Et Argemone quidem succum emittit croceum, & ad gustū vehementer acrem: Rhæas verò candidiorē & aurem. Ambæ verò in medio capita habent syluestri Papaueri similia, verū Argemones caput superiùs aliquāto crassius est; Rhæadis angustius. At Anemones neque succum remittunt, neq; capita siue calyces habent, sed quasi Asparagi, cacumen.

Accepit ἀνέμων, ἀπὸ τοῦ ἀνέμω, id est, à vento, nomen. Nunquam enim se aperit flos, nisi vento spirante, auctor Plinius; vnde & Herba venti nonnullis.

Ovidius Adonidis florem describens, Anemonem videtur adumbrare syluestrem: lib. x. Metamorph.

Sic fata cruorem

Nectate odorato sparsit, qui tactus ab illo

Intumuit, sicut fuluo perlucida cælo

Surgere bulla solet, nec plena longior hora

Facta mora est, cūm flos de sanguine concolor

ortus,

Qualem, quæ lento cælant sub cortice granum,

Punica ferre solent; brevis est tamē vltus in illo:

Namque malè hærentem, & nimia leuitate caducum,

Excutiunt iidem, qui perflant omnia, venti.

Ceterum Anemones ambæ viam habent, auctore Dioscoride, acrem. Galenus omnes extrahendi, & attrahendi, & ora vasorū referendi facultatem obtinere scribit. Isaq; radix, ait, commanducata pituitam euocat: succus ex naribus

ribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcera Anemone expurgant, & lepras detrahunt, mensesq; apposita eliciunt, & lac trahunt. Et lac quidem attrahere, Dioscorides inquit, folia & caules cum prisana cocta, & in cibo accepta: menses verò eadem ciere in pello apposita.

DE ACONITO PARDALIANCHE.

CAP. VIII.

ACONITA veteribus duo sunt: Pardalianches vnum: & Lycoctonon dictum alterum.

Aconitum Pardalianches foliis exit subrotundis, latis, dilute virentibus, mollibus tenuiq; lanugine pubescētib; Hedera cuiusdam, ac vnius Cyclamini foliorū quidem forma, sed amplioribus, ad Cucumeris magis accedentibus, huius tamen & minoribus & mollioribus. caulis dodrante altior, et ipse lanugine haud carens, striatus, quasi multiangulus, alioqui rotundus; qui in pauculos diuisus ramulos, ipsis fastigiis, flores promit Chrysanthemi annulos; & medio videlicet disco, & orbiculato ambitu luteos, qui in tenues & candidos pappos resolvūtur; quibus subsunt exigua nigricantia semina. radicle haud magna, candida dū recentes sunt, geniculis veluti articulata, nō rectē descendunt, sed per obliquum graminis modo serpunt; & subinde extuberantes nouella protrudūt germina (ita sese multiplicante stirpe) demissis etiam ab ipsis tuberosis partibus, aliquot deorsum cōcoloribus fibris. Referunt radicle examinatos scorpiones. nam anterior & tuberosior cauliculis proxima, corpusculum cum pedibus; posterior articulatam exprimere videtur caudam.

Alia verò & huius species subinde occurrit, antedicta



Monardella lutea, L. f.
Bot. Beech. 637

paulo maior, saturatius virens, procerior, cuius radix longior, minus serpit, & vtrinq₃ adnatis cammorum citius, quàm scorpionem refert.

Aconitum Pardalianches montanis, asperis, saxosis, & abruptis gignitur locis, in ipsis etiam Alpium iugis. Descendit quandoque ad mitiora. In hortis Belgij nimis feliciter adolescit: vbi Maio mense flores conspiciuntur.

Dicitur Græcis ἀκόνιτον παρδαλιανχὲς: item & κάρμυρον, μυοκτόνον, θαλύφρονον, θηρίοφρονον. Theophrastus tamen de Aconito, Myophono & Thelyphono seorsum egit. Et Aconitum quidem lib. ix. aliud omnino ab isto describit; de quo cap. x. sequente agemus. Myophonon, quod significatione cum Myoctono conuenit, inter suffrutices ferulaceos vnà cum Fœniculo, Hippomaratro, Ferula et similibus refert. Relinquitur Thelyphonon. Aconito Pardaliachi Dioscoridis istud respondet; de quo lib. ix. ita scribit: θαλύφρονον, quod σκορπίον vocant; quia radicem similem scorpioni habet, admotum scorpionem occidere aiunt; & cum reuiscere posse, si Helleboro albo aspergatur.

Thelyphonon
Theophrasti.

Plinius de Thelyphono ac Aconito diuersis quoq₃ ac se-iunctis agit locis: & de Thelyphono quidem lib. xxv. c. x. vbi ipsum Scorpionem dici, & quæ apud Theophrastum, refert: de Aconito verò lib. xxvii. cap. xi. quo loco pleraq₃, quæ Thelyphoni sunt, reperit, quæ tamen de Aconito non habet Theophrastus.

Dioscorides autem radicem non scorpio, sed cauda eius similem modò ait: ῥίζα ὁμοία σκορπίου ὀφθαλμοῦ. Sed fortasse, vt apparet, dictio ὀφθαλμοῦ redundat, et legendum cum Theophrasto, ῥίζα ὁμοία σκορπίου.

Locus Dioscori-
dis animaduert-
sus.

Nomen autē huic Aconito ab ipsis cautibus, præruptis & saxosis locis, quæ Græcis ἀκόνται, esse Ouidius Metamorphoseon vii. sentit:

Quæ quia nascuntur dura viuacia caute,
Agrestes Aconita vocant.

Officinarum er-
ror.

Aconitum autem quod descripsimus, herbarum studio-
si, plurimi quidem, Doronicum appellat: officina pharma-
copætorū passim pro Doronico quoque radículas huius me-
dicamentorum compositionibus admiscunt. Quod tamen
Arabes Doronicum nominant, aliud longè ab isto Parda-
lianche est. Hoc enim Auicenna Strangulatorem leopar-
di: illud verò Durinigi appellat. Strangulatori leopardi
suas ex Theophrasto & Dioscoride vires ascribit: cap. vi-
delicet DCCLXXXV. Durinigi verò calidum & siccum ait
in tertio gradu. cap. CCIX. Cui & ipse Arabs cōsentit Se-
rapio, Doronicum in tertio constituens ordine calfacientiū
ac resiccantium. à quo temperamēto Pardalianchis (vul-
gò dicti Doronici) multum absunt radices.

Durinigi.

Nulla etenim amaritudo, nulla acrimonia, aut similis
gustabilis qualitas in iis sentitur, quæ tam intensè, vel ca-
lidas, vel siccas esse ostendere queat. Præter enim euiden-
tem dulcedinem, si qua occurrit gustanti alia, ea omnino
exigua est. At dulcedo non excessum caloris vel siccitatis
ostendit, sed temperiei mediæ, ac temperatæ proxima vici-
naq; propria est.

Ac proinde huius herbae & radicum eius qualitas haud
longè à temperamenti mediocritate recedit. Videtur autē
nonnihil tepida ac clementer arida obtinere, ubi inaruit ac
resiccata est, facultatis: sed recens & succo madens frigi-
ditatis non est expers.

Admiscetur, inquit Dioscorides, oculorū ἀνωδίνους, siue
dolorē sopientibus compositionibus. & prodesse propter hanc
qualitatem recens ad oculorum inflammationes potest.

Occidit, idem ait, pantheras, fues, lupos, & omnes feras
cum carnibus obiectum. Theophrastus verò non eo modo,
sed

sed vel folium, vel radicē genitalibus inditam, ones, boues, iumēta, & omnes quadrupedes eadem die interimere ait: potatam verò radicem aduersus scorpionum ictus prodesse scribit.

Ferunt item, Dioscorides addit, huius admotam scorpionibus radicem ipsos resolvere ac ignauos efficere, rursus verò eosdē Veratro appposito excitari. Quod & Theophrastus iis, qua supra ascriptimus, verbis testatur.

DE ACONITIS LYCOCTONIS, ET PRIMUM DE MAIORE LUTEO.
CAP. IX.

AD Lycotoni genus multa referenda occurrunt herba. pleraq; lutei coloris florem; alia caeruleum aut purpurascens proferunt. Inter lutea maius quoddam; minus siue paruum alterum.

Maiori Lycotono luteo folia sunt ampla, in complures partes confecta, Platani foliorum similitudine, sed profundioribus diuisuris, hanc *μακρότερον* (ut perperam Dioscoridis exemplaria legunt) sed *μικρότερον*, id est, minora, resplendentia, ac non rarò nigriora superiore nempe parte; inferiore siquidem magis inalbicans. caulis bipedalis, & quandoq; altior; rotundus, laevis, ad latus nonnihil inclinans, & nequaquam in totum rectè assurgens, in ramulos etiam subinde diffusus. flores ordine supra inuicem digeruntur, colore pallentes subluteo. semen in corniculis nigricat. radices ut plurimum nigrae, multis cirris crassis & flexuosis implicatae.

Dioscoridis loc⁹
castigatus.

In opacis & montosis viret. Dioscorides in Iustinis moribus reperiri ait. Reperitur verò non modò in his, sed & in ceteris Alpibus, et alibi in ipsis non rarò montium conual-



A. luteum, L.
7th. 1848.

libus; & plerisque locis altiore caule, amplioribusq; foliis; nonnullis humilioribus ac minoribus foliis. dilutius etiā quandoque viret. interdum & flos pallidior.

Aconitum istud Dioscorides λυκοκτόνον & κυνοκτόνον cognominat: officina pleraque Napellum vocant luteum: Arabes Strangulatorem adip, id est, lupi; nonnulli Luparia: Germani Wolfswurtz; Hispani Yerua mata louo: Galli Tue loup. Trium illorum, quorum nō pauca Dioscoridis exemplaria meminerunt, tertium est, Ponticum dictum.

Creduntur tamen, quæ de Lycoctonis, quorum vnum venatores; alia duo in suum vsum medici vertere, non esse legitima. Marcellus enim veluti spuria & accessoria hæc verba succidit. Facultas autem huius veluti & reliquorū Lycoctonorum homini exitialis est, et reliquis quoque animalibus perniciofa. Utuntur, inquit Dioscorides, ad venationem luporum, crudus ipsas inferentes carnibus, quibus deuoratis lupi enecantur.

DE ACONITO LYCOCTONO LUTEO MINORE. CAP. X.

ACONITVM Lycoctonon luteum parvū siue minus, humilis est herba, præter foliorū pediculos nullos cauliculos habens. sunt autem hi breues vix palmum alti, & tenues. solum verd in singulis vnicum, circumscriptione quidem rotundum; sed instar Napelli multifidum, & profundis incisuris radiatim dissectum; quibus subinde medius insidet flosculus luteus, forma Ranunculi; quem tamen nō capitulum, sed filiqua ponē sequuntur parvas tres aut quatuor sursum arrectas, veluti Lycoctoni. radícula subest crassa,



Melilotus hypericifolius
 Cord. purp. 4400

sa, tuberosa, prima Anemones amula, quasi geniculis aliquot articulata, gustanti admodum acris; ex qua foliorum pediculi exeunt.

In collibus quibusdam ac montibus reperitur, & quidem Patavio vicinis; ut diligentissimi P. Pena, & M. Lobelius referunt.

Floret in hisce montibus Aprili ac Maio, sed in Belgij hortis multo antè, & non raro ipso Ianuario, ubi clementior Hyems est.

Aconitū hyemale sive hybernum hinc à nostris dici cœpit. Aconiti autem speciem esse, & forma foliorum siliquearumq; tum & ipsa peruviosa herba facultas ostendit.

Ad Theophrasti autem Aconitum multū accedit, quod ab ipso lib. describitur ix. Est etenim, ut scripsimus, brevis herba, nullum περιττόν sive superfluum aut adnatū habens, nullis ramis brachiata. radix ραυά sive nuci, aut etiā ραυών, id est, arida ficui similis dici potest. solum videtur repugnare folium, haudquaquam Cichoriodes. Sed fortasse non κίχωριώδες, sed βατραχιώδες legendum est. quo modo si legatur, nulla erit repugnantia. Nam huius Aconiti folium ad Ranūculi vnius sylvestris satis accedit. Verba autem Theophrasti de Aconito sic se habent:

Theophrasti loc.
animaduertitur.

Aconitum nascitur, ut fertur, in Creta et in Zacyntho, sed plurimum atq; optimum in Heraclea Ponti: habet folium κίχωριώδες (alias βατραχιώδες) radicem similem & forma & colore ραυά, id est, nuci. vim illam lethiferam in hac esse; folium verò & fructū nihil facere affirmant. fructus autē est herba non fruticis. Brevis verò est herba, ἡ δὲ ἐν ἔχρυσον περιττόν, id est, nullum habens superfluum aut adnatum. Nascitur ubiq; & non in Aconis solum, à quibus appellationem sortitur. Est autem is vicus Periaandynorū (nonnulli & rectius Maryandynorum legunt.) Amat loca

Aconitum Theo-
phraſti.

Theophrasti lo-
cus reſtitutus.

potissimum petrosa. Non pascitur ea neq, ovis, neq, ullum animal.

Potentia autem ac facultate hæc herba perniciofa admodum et valdè exitialis habetur. quale etiam suum Aconitum esse, Theophrastus apertis verbis testatur; remediū cuius nunquam ait esse repertum.


DE ACONITIS LYCOCTONIS ALIIS
NON LUTEIS.
CAP. XI.

ALIIS Lycoctonis, quæ colore floris à superioribus distinguuntur, & suæ sunt species. Posset inter has Napellus recipi, nisi seorsum, legitimis de causis, describendus foret.

1 Primum genus, quod à flore Delphinij cognominatur, proceris assurgit caulibus instar Napelli: folia variè similiter & creberrimis incisuris diuisa: flores secundum caules superius, veluti in lōgam compositi spicam, è punico ac obscuriore colore purpuram amulantur; forma ferè floris Regij (quem Delphinium haberi scripsimus) in posterius videlicet corniculū desinentes: siliqua & semen vt maioris Lycoctoni lutei: radices oblongæ, crassæ, tres aut quatuor demittuntur paucus adhaerescens filamentis.

2 Alterum totè externa facie Napellum refert, caulibus videlicet dissectis, fissis nigricantibus foliis; flore ceruleo, biante, ex totidem partibus, eodem ordine compositis; siliquis item ac semine omnino similibus: sed radix differt filamentis ac cirris multis tantummodò confibrata, ac Naponequiquam similis.

3 Tercium genus cauliculos profert tenuiores, breuiores, dodrante altiores: folia diuisura Ranunculi aut Lycoctoni lutei, minora tamen. flosculi ceruleo nitent colore, paulo
minores



Delphinium consolida
C. L. P. 446

Aconitum variegatum, L.
Drod. frucht. 8243.



minores quàm Napelli: siliqua & semina cū aliorum conueniunt. radix fibrosa, nigricans, adnatis subinde exiguis veluti bulbulis facilè propagatur.

Translata hæc genera aliundè in Belgj sunt hortos. Feruntur alicubi in montibus reperiri. Tertium Hieronymus Tragus Norimberga haberi scribit, atq; illic etiam flore dilutè purpureo reperiri.

Primum ac tertium vnà cum Napello sæpenumerò aut non multo pòst, sed secundum seriùs multo floriferum est.

Lycotoni esse speciem abundè manifestum: & nocendi non minoribus facultatibus præditam fore.

DE NAPELLO.

CAP. XII.

NAPELLI caulis supra duos assurgit cubitos. foliis circumuestitur Ranunculi maioribus, è virore nigrioribus, supina tamen nonnihil albicantibus, numerosioribus, item altioribusq; incisuris in plures lacinias fissis, et magis reluctibus. flores à medio fastigium petunt, ordinata successionem prodeuntes, colore eleganter cerulei, hiantem ac patentem galeam, omnibus suis partibus propemodum referentes. Quinque enim constant particulus, quarum maior superior cucullo aut cassidi capitis cauo operimento similis: due latera contegunt mediocres: minores reliquæ angustæ inferiores: nonnullis exiguis staminibus mediis; è quibus duo repandi exoriuntur styli, non priùs quàm eleuetur cucullus, se exerentes. radix oblonga, crassa, Napi figura, tamen minor, foris nigricans, intus cãdidiôr, creberrimè geminata, præsertim in hortis.

In Alpibus Ananiæ & Rhœtiæ, tum alibi in montibus, nullo serente prouenit; apud Belgas quandoque in hortis
reperi-

Acronium napellus, L.

Orth. Bot. 1442



reperitur. Maio aut Iunio, interdum etiam serius, aliosis locis flores vigent: semen Augustus dat.

Recentior atas vnà cum Barbaris Napellum à figura & effigie Napi in radice apparentis vocat: Germani *Psenhuclin / blowolswurtz / kappen blumen / natrenkappen / teuffelswurtz*: nostri *Wolfwoztele*. Dicitur & Thora quasi $\varphi\theta\epsilon\alpha$, id est, interitum aut corruptio; item & Taura aut Tura, vocibus deprauatis.

Lycotoni est species, habet autem suas Auicenna rationes, cur & lib. 11. deinde & lib. 1111. Fen VI. tractatu primo, à Chanach aldis, id est, strangulatore lupi, siue Aconito Lycotono separauerit.

Potest verò et Toxicum dici. Toxicum etenim perniciosum medicamentum, quo spicula, tela, sagittæ præsentaneo Toxicum. inficiuntur veneno: dictum à telis, quæ Barbari *Toxeumata* & *Toxa* appellant. Conficitur autem istud etiam ex Napello, quanquam tamen & ex aliis. Dioscorides etiam Toxicæ symptomata & remedia referens, eadem ferè, quæ ab Auicenna de Napello adfert. Scribit tamen de Napello et Toxicæ seorsum Auicenna, sed quid Toxicum sit (ut ipse fatetur) ignorans, ut minime mirum fuerit, semel de Napello, iterum postea de Toxicæ egisse.

Vis autem & facultas Napelli, et homini & quadrupedibus multis perniciosa est. Evidenti sed perquam miserabili experimento, id Antuerpiæ olim compertum, in recenti adhuc est memoria. Cum enim ab imperitis huius inter acetaria illata essent radices, quicumq; eas ederunt, mox sensissimis correpti symptomatis, breui vitam cum morte commutarunt.

Intumescunt autem illicò ab assumpto Napello labia ac lingua: oculi prominent, crura rigescunt, verrigines & animi accedunt deliquia: ut quidam Auicenna lib. 1111.

Tanta huius veneni vis, ut eo telorum mucrones imbuti lethalem vulnecratis noxam adferant.

Aduersus autem tam perniciosum venenum & hunc Napellum remedia quaedam enumerat Anicenna, quae post venenum ipsum vomitione redditum praesidio sunt: atque inter ea murem etiam (ut passim exemplaria habent) reperiri Napello enutritum, qui natura eius malefica tota substantia aduersetur, & assumptem ab omni vindicet ac liberet periculo.

Antonius Guernerius Papiensis sua aetate celebris medicus, in tractatu suo de venenis, hunc non murem, sed muscas esse existimat. Refert siquidem quendam Philosophiae ac veritatis studiosum, sollicitè admodum ac diligenter murem huiusmodi quæsiuisse, neque unquam vel murem vel arrosam etiam Napelli radicem ab eo repertam; sed muscas abundè multas folia depascētes inuentas, quas philosophus ille muris loco accipiens, antidotum ex iis confecit, quam & aduersus venena alia, sed contra Napelli utilissimam ac efficacissimam comperit.

Antidotum ex
muscis Napelli.

Accipit hæc terra Lemnia, baccarum Lauri, antidoti Mithridatis singulorum uncias duas, muscas Napelli XXIIII. mellis & olei quantum satis est.

In eadem cum Guanerio & philosopho illo sententia sunt quoque doctissimi ac diligentissimi P. Pena, & M. Lobelius, qui murem Napellum depascentē nusquam affirmant visum; sed muscas esse, quæ turmatim aduolent, & floribus huius infideant.

Sunt hæc maiores cæteris muscis, et floribus Napelli propemodum (ut aiunt) concolores, nullamq; herbam aut florem, quàm huius solius, appetunt.

Et verisimile est non murem esse, qui Napello sustententur, sed muscas esse, quæ linctu eius viuunt. Nam aconitū,

cuius

cuius Napellus species, mures ipsos interimit : atque inde *μυροτόρον* & *μυροτόρον*, siue Muricida dicitur.

DE THORA VALDENSI.
CAP. XIII.

HÆC herba neq; magna est, neq; in amplitudinem vllam effunditur: singulari tantum assurgit cauliculo, ecq; rotundo & palmum aut semipedem tantum alto, cui vnicum, subinde duo, raro plura adnascuntur foliola, duriuscula, rotunda, lauia, dilutè & aliquatenus ex caeruleo virentia, ambitu crenato. flosculus in cacumine eminet luteus minor quàm Ranunculi, atq; affinis: globatum capitulum sequitur è seminibus congestum. radicle coherent ix. aut x instar Asphodeli, sed minores multo, & acuminatae.

In Alpibus, et Allobrogum Heluetiorumq; montibus gignitur; apud Valdenses, qui partem horum montium Italianam versus incolunt. frequens. reperitur & in Baldo Italiane monte.

Thoram, Tauram & Turam appellant; Valdensis cognominatur, ad differentiam Napelli, qui & Thora, vi diximus, vocatur.

Meminit exitalis cuiusdam herbae Auicenna lib. I I I I. Fen VI. Farfiun dictæ. eandem autem hanc cum Thora Valdensi esse, affirmare non fuerit facile; praesertim cum Farfiun sibi referat incognitum, & nullis ab eo depingatur notis.

Perniciosa autem & venefica huius Thoræ vis, Napelli excedere fertur malitiam. Tantam autem esse aiunt, ut homo quidem precipuè, deinde & quadrupes ferum, ac aliud etiam, vulneratum aut ictum telo huius succo imbu-



Det. pempt. 1143. Clus. herb. 239

to illitove intra semihoram pereat ac moriatur. Negatur tamē mortiferum si bibatur, aut deuoretur, tamen si absq³ noxa id non fiat.

Utuntur succo venatores ad ferarum venationem, quem expressum & preparatum in bubulis asseruant cornibus, ad sagittas intingēdas veneno ac toxico præsenteaneo. Vm eius experturi acum eo succo inficiunt, qua ranam pungant: que si illicò moriatur, præsenteaneum iudicant: auctor Gesnerus.

DE ANTHORÁ.

CAP. XIII;

ANTHORA effigie Napellum refert, sed humilior ac minor est. calulis eius dodrantalis, aut paulo altior: folia crebris ac profundis incisuris fissa, vti Napelli, sed minora: flores forma eadem, non tamen carulei, sed è luteo pallentes: semen & siliquæ respondent. geminae subsunt radicle, olivas aut orchios, globulos rescentes, foris sufflauescentes, interius candidiores; frangi, vbi resiccatae, satis contumaces, friabiles tamen; vbi quidein suæ fontis est. fecunditate enim lati aut hartenfis soli, lasciuienti subinde longiores ac plures subnascuntur radices.

In Alpibus apud Allobroges Heluetiosq³, tum & alibi reperitur.

Lacus Lemani accola & Taurini Ligures Anthoram, vulgò l' Anthoro appellant.

Auicenna herbam Napello similem illiusq³, veneno repugnante, Moysis Napellum vocat, cap. ccccc. lib. i i. Napellus Moys.
lis.

Cap. verò dcccxliv. Zedoariam ait vnà cum Napello Zedoaria. crescere, atq³ eius vicinia, illius vires & malitiam retundi impotentioresq³ reddi: et esse Theriacen, id est, Alexipharm-

Aconitum anthora, L.
Bot. tenn. 443



macum viperæ, Napelli, & venenosorum omnium aliorum. Atq; hinc Anthorâ non modo Napellum Moysis, sed & Auicennæ esse Zedoariâ consequitur. Officina tamē aliam et ab Anthora differentem Zedoariam venum exponunt: radicem videlicet oblongioris formæ. Quæ non absq; ratione Zerumbeth siue Zurumbeth Auicennæ ac Serapionis esse putatur.

Dicta autem Anthora quasi ἀντιφθορά: quod nempe Thoræ aduersetur, & alexipharmacum eius sit.

Thoræ autem ac Anthoræ, siue Tura & Antura voces, nouæ quidem videntur, sed tamen extant apud veterem Marcellum Empiricum, qui ex Tura & Antura aduersus leucomata & albugines oculorum medicamentum conficere docet.

Est autem Anthoræ radix valdè & insigniter amara; aduersatur venenis omnibus; utilis ad purgationes. serosos siquidem & mucosos etiam per inferiorem ventrem educit humores: lumbricos & ventris tineas pellit educitq; , ut quidem P. Pena & M. Lobelius diligentissimi doctissimiq; stirpium obseruatores tradidère.

Hugo Salerius non modò per inferiorem ventrem, sed & per superiorem largas ait Anthoræ radices expurgationes moliri; modum esse ad quantitatem Faseli (quem vulgò fabam) ex iusculo aliquo aut vino: dariq; duris corpore.

Antonius Guainerius Anthoram magnæ etiam aduersus pestem efficaciæ refert: tractatu de peste, differentiæ 11. cap. 111. Et quod ad experientiam, inquit, vidi, consimilis cum Dictamno virtutis Anthoræ radix existit. Et est herba, quæ iuxta Thoram illam scilicet herbam nascitur, ex qua venenum conficitur, cum qua in Alpibus Salutarium & Pinaroli capras syluestres venantur. Et hæc radix Anthoræ assimilatur nucleis oliuarum, & est Bezoar illius

Thora, quæ est aded venenosa, quod omnia animalia sua interficit venenositate. hac ille.

Meminerunt quoque *Anthora* Simon Ianuensis in Synonymis, & Arnoldus Villanouanus in tractatu de venenis: sed quæ adferuntur, non satis notam aut cognitam ipsis fuisse *Anthoram*, ostendunt.

DE HERBA PARIDE.

CAP. XV.

PARIS herba cauliculum erigit teretem & singularem, atque circa hunc folia quaterna, ab vno veluti centro in decussis siue crucis figurâ concinnè digesta sunt hæc lata, venosa, oblonga, subnigricantia, & aliquantulū acuminata. in fastigio supra hæc flosculus prodit herbaceus, foliolis aliquot angustis, veluti calycis sui alabastris, insidens. sequitur inde bacca instar vuae acini; semine intus minuto subcandicante, vt halicacabi, farctæ. radix tenuis, longiuscula, geniculis aliquot articulata, obliquè serpit, alicubi interdum progerminans.

In syluis opacis ac perinde aliis vmbrosis pingui ac lato reperitur solo.

Aprilis flos exit: bacca Maio maturitatem assequitur.

Recentiores Paridem ferè herbam: pleriq; tamèn Vuâ versam, & vuam lupinam appellant: nonnulli verò etiam Solanum tetraphyllum. Falluntur, qui Aconitum Pardalianches existimât. Germani *Wolfsbeer/einbeer*: Brabanti *Wolfbesien*, et *Spinnecoppen*, id est, Araneam; ab emēta videlicet aranea forma, quam bacca vnâ cum reflexu exiguis alabastris per maturitatem exprimit: Gallis est *Raisin de regnard*: Hispanis *Centelha*, vt quidam aiunt.



Paris quadrifolia L.
Cod. font. 1642

Facultate autē fertur refrigerans, & Solanis proxima.

Baptista Sardus aduerjus mentis emotionem, insaniam, & satuitatem, commendat, tam per morbi diuturnitatem aut sauitiam incidentes; quàm prauarum rerum assumptione contractas: si xx. cōtinuis diebus dimidium cochlear pulueris huius herba ieiuno propinetur.

DE PAPAVERE.

CAP. XVI.

PAPAVERIS duoprimum genera, Plinio auctore, Satiuum, & Syluestre.

Ad syluestre pertinent Erraticum & Corniculata; de quibus posterius & seorsum.

Satiua Papauera tria sunt: album, nigrum; vtrunque magnum; & minus tertium.

- 1 Album Papauer folia promit oblonga, lata, leuia, lactuca foliis longiora, candidiora, marginibus sinuosa: caulis siue scapus rectus, quandoq; tricubitalis; in cuius fastigio flores candidi; in quibus mox ab initio multus staminibus stipatum apparet capitulum; quod adultum globosum, non nihil tamen oblongam formam habet, & supernè operculo contegitur, interius membranis non paucis in loculos discernitur; in quibus semen copiosissimum, sed minutum, rotundum & candicans. radix subest nullius momenti, descendens in altum.

- 2 Huic simile est nigrum Papauer, sed capitulo aliquanto rotundiore & magis globato: flos elegantiori phœniceo rubet colore: semen nigricat.

Sunt floribus horum duorum folia, vti & reliquorum, quaterna, eaq; satis ampla, sed quæ citò defluant: raro sed tamen quandoq; pluribus incisuris ac diuisuris dissecta, ac
 simbria-



x s *P. somniferum* L.
 Bot. t. 1. 1615

simbriarum instar multifida. reperiuntur eadem quandoque & multiplicata, sed tamen rarius.

- 3 Tercium Papaver caule, foliisq³, floribus item & capitulo minus est: flos è caruleo ac purpureo obsoletum & dilutum quandam colorem refert. capitulum quoque rotundatur, sed maturato semine foraminibus aliquot, qua parte operculum ipsi insidet, circulariter hiat, faciliè defluenti semini viam præbens, quod alius duobus non cōtingit, quorum ita reclusi permanent calyces, ut nullum queat elabi semen.

Effluit è tribus his, capitulis eorum vulneratis, liquor candidus, qui ad medicinae usus colligitur, & densatus Opium appellatur. Colligitur tamen præcipuè ex secundo genere; non modo Dioscoride, sed & Galeno, ac Plinio re-
Opium.

Meconium.

Exprimitur & ex capitulis ac foliis simul succus, quem Meconium nominant.

Seruntur hæc genera in hortis, ac etiam nō raro in ipsis arvis: tertium frequentissimum, quod crebrò non satum pluribus quoq³ reperitur locis, præsertim tamen in hortis.

Iunio mense flores exeunt: semen post perfruitur.

Græcis *ρωάνων*: Latinis Papaver. nomen officina servat; nonnullis *δούτορον*; Germanis *Magsamen* olmag; Belgis *Quel* & *mancop*; Hispanis *Dormideras*, & *cascall*; Gallis *Pauot*.

- 1 Primum genus, cui quandoq³ calyx oblongior & semē albidius, *ἡμερον* & *καπνότερον*, id est, sativum ac hortense dicitur. Dioscorides *θαλακίον* etiam nominari refert: vulgò Papaver album.

- 2 Alterum genus nigro semine, Dioscoridi *σῆρον* sine syl-
pauet

pauer nigrum : plerisq; nostra ætatis à florum rubente colore Papauer rubrum.

Tertium genus ἀγρ. ὄρεον siue agrestius est, Dioscoride auctore; idem et φαρμακώδεσρον, id est, medicamentosius, aut ad medicamenta vtilius; maius et oblongiore capitulo.

Verisimile autem hoc loco subesse mendum ac errorem.

Tertium siquidem istud genus humilius ac minus est; neq; oblongioris, sed globati ac rotundioris calycis. Fieri autem potest, ut pro μικρότερα perperam scriptum sit μακρότερα: & ἔχουσα τὴν κοιλίαν ἐπιμήκει, accessorium. Non enim huius (ut diximus) sed candidi longius & maius est: longius item, sed minus erratico Papauere.

Dioscoridis corruptus locus.

Apparet verò & tertium istud Papauer agreste illud esse, ex quo διακωδὶς compositio paranda: de qua Galenus prolixè lib. vii. de medicamentis secundū loca. Nam Criro & post Themisonem Democrates, ἀγρὸν siue agreste accipiendum præcipiunt, & illud quidem, addit Democrates, quod non scribitur: μᾶλλον ἀγρίαν, inquit, ἢ δὲ γὰρ αὐτὴς αὐτῆς ται. quale tertium, quod nullo ferente sapè nascitur.

Plinius lib. xix. cap. viii. sub finem, tertium Papaueris genus Rhœam Græcis, Latinis Erraticum dici ait; & spon-
tè in aruis cum hordeo nasci: tria tamen illic satiui genera
ess, atq; istud tertium eorum facit. At lib. xx. cap. xviii.
inter satiua & syluestria medium constituit: ita ostendēs,
vel tertium ex nostris, vel saltem discrimen istius et Erra-
tici in frugibus nascentis, haud rectè se agnouisse.

Plinij hæsitatio.

Ceterum Papauerum omnium refrigeratoria vis est, ut Galenus in lib. de simpl. med. facultatibus.


Semen, ut idem in lib. de alimētorum facultatibus ait, panibus vilitè ceu condimentum inspargitur. Sed album nigro, eodem auctore, præstat. Refrigerandi autem ipsum facultatem habere ac somnificum esse, corporiq; nulli m-
comme-

commemorabile præstare alimentum; etiam addit. Est autem seminis huius, saccharo quidem incrustati, in secundis mensis quandoq₃ vsus, cum aliis tragematis. Refrigerandi verò eius potentia haud magna observatur. Ad somnum conciliandum non multum efficax est.

Oleum quod ex eo exprimitur, gratum ac edule est, panig₃ illitum, aut alio quouis modo in cibo, citra refrigerationis sensum sumitur. Cõficitur verò ex tertij generis semine frequentius.

Codyis siue capitulis maior inest vis, qua ad somnum conciliandum, defluxionesq₃ sistendas, ac reprimēdas, plurimum faciunt; propinquamq₃, sed tamen mitiorem vim, Opio obtinent. Opium fortissimum est: hoc ignavius Meconium. Vtrumq₃ autem quouis modo, vel assumptum, vel capiti applicatum, somnum ac subinde profundum, molestumq₃ soporem cõciliat. Opium copiosius haustum etiam mortiferum: vt verè Plinius. Dolores autem omnes sopit, sed agrius curabile malum non rarò relinquit.

Offenduntur eius vsu, vt Galenus lib. 11. de medic. secundum loca, solida partes, adeò vt postea à correptione opus habeant. Sic & collyria ex Opio multis detrimento fucere, ita vt debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem; veluti etiam auditus grauitatem inducunt, quacunque ex Papaueris succo, ad vehementes aurium dolores componuntur. Quapropter fugienda omnia sunt medicamenta & pharmaca, quæ ex Papaueris succo consunt sensum stupefacientia: neque nisi extrema vrgente necessitate ad eorū vsum perueniendum; cū videlicet nullum aliud mitigatorium seuissimis doloribus opem adfert, vel succurrit: vt Galenus lib. de medicamentis secundum loca tertio, luculenter docet.



P. rhoeas, L.
ord. frum. 447

I ERRATICO Papaveri cauliculi & folia nigriora hirsutioraq;: folia vtring; altis incisuris instar Cichori; aut Erucæ diuisa: flores è fastigiis cauliculorum pulchro ac rubente phæniceo emicant colore; staminibus nigricantibus capitulum medium ambientibus; quod adultum minus est, sed tamen oblōgioris formæ quàm tertij satiui. semen exiguum nigricat.

2 Huius & alia minor est species, foliis minoribus, oblongis, nō Erucæ per margines diuisura, sed tantummodò serratis; reliquis priori similis.

Species eius etiam aliquot esse, satis Dioscorides ipse innuit, folia referens Origano, aut Erucæ, aut Thymo, aut Cichorio similia conspici. Nam in horum foliis magna diuersitas. Sunt tamen, qui dictiones ὀπρυάνα ac δούνα re-
dundare; & nullum minutis Origani, aut minimis Thymi foliis erraticum Papauer reperiri affirmant.

Vnà cum tritico, Zea, secali, hordeo, auena, reliquisq; frugibus in agris erraticum gignitur Papauer: non raro quoque inter olera, ac secus margines hortorum.

Bellè colorati flores Maio ac Iunio pulchritudinis venustatiq; quandam gratiam aruis conciliant.

Dioscoridi est πικρὸν ποικίλον; Latinis Papauer erraticum; Gazæ Papauer fluidum; officinis Papauer rubrum: Italis Papauere saluatico: Hispanis Amapolas, rosella, papoulas. Germanis Clapper rosen/korn rosen: Belgis Rooden huel/wilden huel/collebloemen: Gallis Coquelicoc, pauot sauuage, confanons.

Et ποικίλον nominari Dioscorides ait, quod ei citò flos defluat. Decidunt tamen flores æquè citò & aliis Papauerū
gene-

generibus etiam corniculatis. Nulli enim Papaveri diutius aut durabilis flos est. Omnium citissime pereunt. Ut enim omnibus commune est, florem membrana quadā integri, ac veluti vagina quadam contineri, quæ ipso se exerente flore in duas delibescens delabitur partes; ita quaterna ipsis folia, citò defluentia. Rhœadis nomē non modò huic, sed & aliis ea de causa commune esse potest; si modò à floris facili accessit delapsu. Quòd si verò à seminis profluvio (vbi apparet) Rhœadis cognomē accesserit, satiuorum tertio proprium erit, cuius, ut diximus, citissime ac facillimè semen excidit. Defluit verò & huic erratico, sed minùs manifestè.

Conuenire autem erraticum istud Papauer cum Anemone videtur syluestri. Et occurrit Anemones vox, inter confusas Papaveris apud Apuleium appellationes. Dioscorides etiam Anemonē sylvestrem cum Papavere Rhœade à nonnullis confusum, cap. de Anemone scribit. An autē ipse se satis explicare potuerit, relinquimus diligentius eliminandum; nobis non satisfecit.

Anemone syl-
uestris.

At facultas erratici Papaveris similis est superiorū Papauerum, frigida & somnifica.

Quorundam er-
ror.

Pleriq; fallacia experimenta magis quàm rationē ducem sequuti, flores aduersus pleuritidem commēdant; statim accedente dolore, vel stillatitium ex ipsis liquorem, aut serapium ex frequenti foliorum maceratione propinantes: & leniri non rarò dolorē contingit. sed & pertinaciùs crebrò inde hæret, agrè ac cum difficultate spūto procedente: præsertim quibus nō est robusta corporis constitutio, valentesq; vires. Erroris huius occasionem præbuisse potuit Baptista Sardus, qui flores huius Papaveris aduersus lateris dolores, à plerisque sæliciter exhiberi; & aduersus sanguinis sputationes vtilis, memoria prodidit.



Chelidonium glaucum?

Dor. herb. 448

DE PAPAVERE CORNICU-
LATO MAIORE.

CAP. XVIII.

PAPAVERIS corniculati tres reperiuntur species, & magnitudine & floris colore differentes.

Quod maius est, reliqua Papauera candidis & ambitu infractis ac laciniosis foliis satis refert; non tamen leuibus, sed nonnihil lanuginosis, instar ferè foliorum Verbasci, caules infirmiores breuioresq; in plures alas diuiduntur. flores ochri colore luteo pallent; quos excipit non capitulum, sed tenue oblongum incuruumq; corniculum, siue filiqua, in qua semen nigricans radix subest oblonga, crassior; in nonnullos quandoque restans annos.

Vulnerata herba succum prabet luteum, & gustatu falsilaginem refert, vbi suæ spontis est; in maritimis videlicet, aridis, & squalidis, quæ amat, locis: in hortu succo illo magna ex parte destituitur.

Iunio ac Iulio flores illi exeunt.

Græcis *ρῶνρον καρατῆς*; Latinis Papauer corniculatum ab Oribasio & Aëtio *παράλιον*; Plinio Papauer Paralium; Catullo Papaner luteum; alius Papauer marinum: atque inde Hispanis Dormidetas marinas. Sunt & quibus *ρῶνρον ἄγρια*, id est, Papauer sylvestre; à nonnullis quoque, Dioscoride teste, Glaucion, propter foliorum similitudinē. Atque hinc in officinis olim Memitha. Memitha siquidem Arabibus Glaucium est: Germanus Geel clinagen/geelē huel; Gallis Pauot cornu.

Vim autem incidendi & abstergendi, Galeno auctore, accepit.

Radix, inquit Dioscorides, ad dimidias cocta in aqua & pota, coxendicum dolores & iecinoris affectus sanare potest;

potest; his etiam qui crassas & ἀπαχύνειν reddunt vrinas, prodest.

Semen acetabuli mēsurā cum aqua mulsa potum, aluiū leuiter purgat. folia cum oleo trita argemas iumentorum sanant & abstergunt.

DE ALIIS CORNICVLATIS PAPAVERIBVS.

CAP. XIX.

2 PROXIMVM siue alterum corniculati Papaueris genus, priori tenuius ac minus est, & foliis Eruca modo altè incisīs, nonnihilq; pilosis. cauliculi eius tenelli & ramosi procumbunt. flores minores intenso satis colore rubent, dilutius tamen quā Papaueris erratici. corniculum minus est, cuius cacumini operculum subinde, aut veluti latius capitulum insidet. semen in his exiguum nigrum. radix verò oblonga.

3 Tertiū huius generis Papauer, etiam secundo exilius, ac foliis tenerioribus, in minutulas videlicet particulas dissectis. flosculus minor, cerulei purpurei coloris nigra violæ amuli. radix tenuis longiuscula.

Non in maritimis, sed procul à mari hac genera reperiuntur. Religiosi fratres, qui in Mesuem cōmentati sunt, offendisse se ista tradunt, in Arragonū & Castella Hispaniæ regnīs, locis mediterraneis; in agris & iuxta viarum semitas, sapore salsilaginem nequaquam referente. Matthiolus verò & in Moravia, quā iter ex Bohemia in Austriam siue Pannoniam, vnā cum frugibus, & secus margines, & in ipsis agrorū aggeribus, quod rubentis est floris, spontè prouenire testatum reliquit.

Vtrumque



T 2

Chelidonium corniculatum L.
 Dod. - *fruct* 449



Chelidonium majus, L.
Doubt. Celandine. 4449

Vtrumque corniculati Papaueris genus habetur: neutrum Anemones.

Existimatur à plerisque rubentis floris Glaucium esse. Glaucium.
Nec in totum à veritate aliena videtur sententia. Nam, ut Dioscorides ait, Glaucio folia sunt Papaueris corniculati similia, sed λιπαρώτερα, id est, pinguiora, χαμαιόκηρα, humilia siue in terram procumbentia, grauis odoris, gustuq; amariora, succus verò multum croceus. Atque huiusmodi succo papauer istud corniculatum haud destitui, testes sunt P. Pena, & M. Lobelius: amarius quoque facile esse potest, utpote falsilaginis gustu carens. Quæ sanè affinitatem cū Glaucio (si non idem) magnam ostendunt.

Ait Dioscorides nasci Glaucium ad Hierapolim Syriae, sed & alibi quoque reperiri, quid prohibet? & fortasse nō nihil etiam inmutatum.

Videri fortasse & nonnullis Argemones, si non prior, altera saltem species poterit, de qua inter spuria. Rubet siquidem flore, sed dilutiùs (ut diximus) quàm Papauer craticum, aut Anemone sativa quadam. capitulū quoque insidet corniculi fastigio latius, præsertim ipsius rudimēto. Et Dioscorides cap. de Anemone, Argemones florem, minus saturato colore quàm Anemones; & capitulum superne crassiusculum esse refert. Argemone.

Eandem verò & Glaucium & Argemonem esse coniungere potest. Complures etenim sæpe vnius herba nomenclatura reperiuntur. Atque hinc fit, ut sub diuersis nominibus, separatis locis, subinde vna eademq; describatur. quod non modò ab aliis, sed ab ipso quoque Dioscoride factum putatur. Si descriptiones expendantur Argemones & Glaucij satis conueniunt. Argemone Papaueri sylvestri similis est, & succum croci colore demittit. Glaucium foliis est corniculati Papaueris similibus, totaq; succo luteo

mader. Facultates haud etiam dissimiles sunt. Argemone argemam & nubeculas, oculorum vitia expurgat : & inflammationes mitigant imposita folia. Glaucij ad ocularia medicamenta vsus est : vt quod initio refrigeret : auctor Dioscorides.

Ostendunt hæc Argemones & Glaucij similitudinem, sed tamen in tam dubia, re nihil temerè affirmandum. diligentius inquirendi occasionem præbuisse abundè sit.

Ceterùm corniculatorum istorum duorum Papauerū nostro quidem seculo nullus, quod sciamus, vsus ; atque idcirco de viribus ac facultatibus nihil occurrit afferendū.

DE HYPECOO.

CAP. XX.

AD Papaueris corniculati genera quadantenus etiam pertinet quod Hypecoon dicitur. folia huic quàm tertio corniculato Papaueri tenuiora, minutissimis incisuris diuisa, colore & aspectu, tum & figura graueolentis agrestis Ruta satis similia, cauliculus brevis est : flosculus odoratus, perpusillus, lutei coloris, è senis foliolis, duobus maioribus, reliquis perquàm exiguis. cornicula succedunt recurua, articolata; in articulis semen flauescens, quadrangulare. radix oblonga fibris non carens.

In aruis & iuxta agrorum margines plerisq; locis reperitur, veluti nonnullis Hispania, & in Gallia quoque Narbonensi, præsertim iuxta Nemausum Coloniam.

Τῡνχοον, & à nonnullis Τῡόπειον, teste Dioscoride, dicitur. Latini Hypecoi vocem retinent. Cur pro cumino syluestri hæc sit habenda herba, nulla occurrit ratio. pro hac tamen ad se missam Matthiolus refert, si nos non fallit pistoria.



Hypericum ascyron, L.
 J. & A. Smith. 1849

Natura autem & facultate refrigerans Hypecoum est; & Papaueris succo simile: auctor Dioscorides.

DE HYOSCYAMO.

CAP. XXI.

HYOSCYAMI tres veteribus sunt; niger, luteus et albus. Posterior atas Peruvianum quartum adinuenit.

- 1 *Niger Hyoscyamus folia promit ampla, longa, lata, candicantia, mollia, lanuginosa, laciniata & marginibus concisa. caules crassi sunt, cubito altiores, ramosi; quos flores continuæ serie digesti conuestiunt, patentibus calathis figura æsimiles; colore secundum margines subluteo, discurrentibus unâ purpuræscantibus aliquot venis; in medio verdè ex obscuriore purpura nigricantes. calyces succedunt rotundi, oblongi, crassi, ventricosi, superius aculeati ac operculati; in quibus semina haud ita magna, colore sordentia. radix crassa, proluxa, albicans, in alterum vix annum; quo ad usq; videlicet semen perfeceri. Grauis odoris ac ingrati tota stirps est, caput aggrauans & somnolentiam inducens.*

Secus vias vbique serè gignitur in sabulosis, & locis haud cultis.

- 2 *Lutei Hyoscyami caulis simplicior, folia indiuisa, minora, lata tamen & oblonga; Solani lethalis maiora, candidiora, ac molliora. flores in cauliculorum fastigiis inconditi, luteo pallentes colore, aliquanto minores quàm nigri; vascula serè similia, sed minora, teneriora & spinis carentia. semen pallidius, sufflauum, vt Irionis pusillum.*
- 3 *Candidus Hyoscyamus candidissimis mollissimisq; foliis exit; lanuginosis videlicet, nonnihil quoq; circumrosis ac sinuatis, sed minus ac minoribus quàm primi, siue nigri.*
cauliculi



r s

H. niger, L.
Oud. handb. 650



Hyoscyamus luteus, L.
 Prod. p. 450
 Scan. bot. 2, 7

cauliculi breuiores sunt. flosculi secundum cauliculos candidi, minores. calyces leues, haudquaquam spinosi. semen candidius.

Duo hi posteriores Hyoscyami rari sunt, nec alibi in Belgio quàm in hortis, & quidē non frequenter reperiuntur. Candidum tamen maritima rudera aspera non raro præbent, præsertim vbi Rhodanus in Narbonensi Gallia mari influit.

Æstiuus mensibus & non raro in multum Autumni omnes florent: semen interea perficitur.

Græci Τοσκύαμον: Latini Apollinarem & fabam suillam: Arabes, vt Plinius ait, Altercum & Altercangenum vocant. Aliis, veluti inter spurias voces refertur, διοσκύαμος siue Iouis faba, τυζώνιον, ἀδαμάντη, ἀδιάμερον, ὑπνωτικὸν ἐμμανές, ἄτομον διδιάμετρον; à Pythagora et aliis ξελέων; Zoroastri τηζώνιον aut τυζώνιον: Latinis, vt Apuleius scribit, Insana, Alterculum, Symphoniaca, Calicularis, Dentaria: Phrygibus Remenia: Tuscis Fabulonia, aut, vt aliud exemplar habet, Faba lupina: Gallis Belli nuncia; Matthæo Syluatico Deus caballinus, Castilago; Iacobo à Manliis Herba pinula: in officinis Iusquiamus: Italis Hyosquiamo: Hispanis Velenno, meimendro: Germanis Bilsen kraut / bilsamen / teuffels augen; nostris Bilsen crupt; Gallis Hanebane & endormie. Herculi ascriptum esse Hyoscyamum, Plinius ait.

Primus à floris nigricante colore μέλας & niger: alter & hinc luteus: tertius candidus, cum à florum, tum & foliorum totiusq; herbe candore & albicante colore dicitur. In seminibus colorum discrimen non adeò magnū est.

In Plinianis codicibus candidus pro quarto: luteus pro tertio describitur, errore manifesto. huius transcriptoribus occasionem præbuisse potuerunt antecedentia, accessione super-

Plinij locus re-
integratus.

superfluum deprauata. Legitimam lectionem talem esse oportet, lib. xxv. cap. iiii. Plura eius genera, vnum nigro semine, floribus penè purpureis, spinosum: vulgare autè est fruticosus & altius Papauere. Secundi semen Irionis semini simile: ambo insaniam gignentia capitūq; vertigines. Tercium genus molle, lanuginosum, &c.

Temperamēto autem omnis Hyoscyamus omnibus suis particulis vehementer & quarto quidem ordine refrigerās est, soporiferus itē, & dolores omnes sedans: aduersus acres calidasq; defluxiones oculorum aliarumq; partium proficit: sanguinis eruptiones et muliebria compefcit profluvia: ad testium aliarumq; partium inflammationes adhibetur.

Profunt subinde vel sola imposita folia, quandoq; eadem cataplasmati permiscuntur. Est & seminis solius nōnunquam vsus; additur verò et antidoti dolorem sopientibus. radix commansa aut in aceto decocta dentium dolores finire potest. Breuiter, Hyoscyamus similem Opio ac Meconio facultatē habet: imminet quoq; & ab ipso, quod ab illis periculum. Testatur Dioscorides folia in olere sumpta mentis emotionem facere. Plinius etiam foliis mentem corrumpi ait, si plura quàm quatuor bibantur.

Mitior autem habetur candidus, quem medici, Dioscorides inquit, recepere: deinde luteus: niger vt deterrimus improbatur.

Galenus nigrum etiam insaniam ac soporem asferre affirmat: huicq; flauum siue luteum propinquam obtinere facultatem: fugiendum vtrumq; vt inutilem ac venenosum: candidum ad sanationes maximè idoneum esse.

Officina tamen passim pharmacopœorum in Germania quidem ac Belgio, nigro vtuntur: luteo & albo vt plurimum desideratis.



Micodora Tabacum
Bot. print 452
Leon. hist. 2. 9

PERUVIANVS *Hyoscyamus* altior est nigro. caules eius ad tres aut plures cubitos non rarò attolluntur: foliis vestiuntur latus, rotundis, longioribus, maioribus quàm lutei *Hyoscyami*, molibus ac dilutè virentibus. flores in summis ramulis sparsi, luteis maiores, colore purpurascen-tes, sed haudquaquam intenso. vascula et semina luteo re-
spondent.

Ex America, quam Occidentalem Indiam vocant, pro-
vinciis, inter quas regio Peru est, in Europam primum ve-
nit, ubi in hortis satius feliciter adolescit, vno anno ad ab-
solutionem perveniens.

Seritur Vere, sub Augustum aut quandoq; seriùs flo-
res: semen postea succedit.

Americæ incolæ *Petun* appellant: alij herbam sacram,
aut sanctam herbam: nonnulli *Nicotianam*. *Hyoscyami*
esse speciem non forma modò qualis luteo, sed & asimilis
ostendit facultas. Soporem siquidem inducit; mentē emo-
uet, & similem ebrietati constitutionem adfert, vel solo
fumo accepto; ut testis est Andreas Thevetus. Sunt autē
hæc stupefacientium ac frigidissimorum opera, qualis est
Hyoscyamus.

Inseritur siccū eius folium *Palme* convulso folio; dein-
de illo vna à parte accenso, per alteram *palme* folij sumus
nidorq; virentis patente ore, naribusq; excipitur, dolorum
ita lenimentis; famis sitisq; obliuionem; et hilaritatē quan-
dam initio, post largiore usu ebrietatem etiā, veluti à me-
racissimo vino, adfert. Expurgari verò & eo modo multos
per os, aiunt, humores, cerebri superfluos absumi.

Utiuntur huius foliis apud Belgas etiam pleriq; aduer-
sus

sus scabiem cutisq; sceditates, & ad vulnerum curationes. Profunt verò scabiei citò; sed ut repellentia. Cogunt enim prauos introuersum recedere humores, frigiditate ac re-percutiendi sua vi. Vulneribus verò auxiliantur, inflama-tiones & superfluum calorem arcentia. sed calidus & ro-bustus corporibus tantum adhibenda. Debilibus ac senibus tutus non fuerit huius Hyoscyami, aut foliorum eius vsus. Atq; hanc, ut videtur, ob causam, à Petun herba mulieres (quod ait Theuetus) in America abstinent, neq; vllò vtun-tur modo.

Præstat huius folia aliis, quæ frigiditatem eorum non-nihil contemperent, permisceri. Idcirco & oleum ex oliuis, in quo macerata folia, atque inde composita vnguenta vti-liora habenda.

Possunt verò hæc eadem, & Hyoscyami nigri, deinde et aliorum folia ac semen.

Nidorem Hyoscyami Plinius mederi ait tuſſientibus.

Oleum è semine expressum à multis nostra ætate ad vul-nerum curationes comendatur: frigidum tamen Hyoscy-a-num nemo inficiatur. quamobrè his de causis, Petun fri-gidam esse herbam, negari non potest.

DE SOLANO HORTENSI.

CAP. XXIII.

INTER Solana vnũ hortense est, Vesicarium, sopori-ferum, Manicum reliqua, quibus lethale vocatum ex re-centiorum accedit sententia.

Hortense Solanum caule cubitali assurgit, frequentibus alis ramoso: foliis nigris, molli, lato, Orymi assimili, sed latiore ac maiore. flores candiduli. bacca aliquot in race-mis aut potius umbellis exiguis dependent; per initia viren-tes;

S. megarrhizon, L.
Bot. princip. 454



res; matura verò, aut nigricantes, aut rubentes; aut lutei coloris. radices candicant, tenues & fibrosæ.

Solanum istud multis gignitur locis, nec enim modò in hortis, à quibus cognomen tamen accepit, et in quibus crebrò aliis herbis permixtum reperitur; verùm & secus vias, agrorum margines, sepimenta, veteres parietes, ruinas, & in asperis rudcribus subinde reperitur.

Æstare autem, & in multum quandoque Autumnum floret. & tunc quidem fructus maturi.

Στόχον & Græcis ἡ τεύχον, & σφόδρον κρυαῖον: Latinis Solanum, et Solanum hortense: officinis Solatrum: nonnullis Morella, Vva lupina, & Vva vulpis: Hispani similiter Morella & yerua mora. Marcellus vetus medicina scriptor, & plerique alij eius ætatis, Strumum appellant. Plinius lib. xxvii. cap. viii. etiam Cucubalum refert nominari. Vtraque vox inter confusaneas Solani appellationes apud Apuleium etiam extat: qui omnia Solani genera vno capite complexus, nomina eorum inter se sædè permiscuit. Germanis est Nachtschadt; Belgis Nascap; Gallis Morelle.

Vsus autem Solani, auctore Galeno in lib. de simp. med. facult. ad ea, quæ refrigerari & adstringi postulant, potest enim hæc dñō ordine secundo. Quod & in lib. de aliment. facult. affirmat, vbi inter ea quibus vescimur, nullum esse olus ait, quod tantam habeat adstrictionem ac Solanum; meritoq; idcirco rarò quidem vt alimento; vt medicamento verò assidue eo medicos vri: minimi autem esse alim. eti.

Dioscorides Solanum Erysipelatis, Herpetibusq; Aegypis, capitisq; doloribus, æstuatī stomacho, alijsq; similibus symptomatis ex acribus ac mordacibus humoribus prodesse scribit. Et fieri potest, vt huiusmodi malis auxilietur; sed tamen semper non expedit, sæpe etiā nocet adhibuisse.

Plus etenim nō rarò periculi ab huius generis remediis imminet, quàm ab ipso morbo.

Erysipelas ab exterioribus ad interiora verti, non esse bonum, scribit Hippocrates Aphorif. lib. vi. particula xxv. Et similiter in Coacu. Erysipelas foris quidem accedere commodum, intrò autem, ait, conuerti lethale. Quod non modò de Erysipelatis, sed & aliis quoq; similibus eruptionibus à natura procuratis veritatem habet.

Nam huiuscemodi frigesacientium ac repercutientium remedium vsu, vitiosi, corrupti, acresq; humores introrsum ad principes & nobiles partes repelluntur, quod absq; summo magnoq; vitæ periculo fieri nequit.

Proinde nec temerè, nec facilè, aut citò ad talium remedium administrationem perueniendum, Erysipelatis, herpetibus, ac aliis similibus cutis efflorescentiis vitiisve apparentibus.

DE SOLANO VESICARIO.

CAP. XXIIII.

VESICARIUM Solanum cubitales promit cauliculos, tenues, rotundos, leues, subrubentes, quasi geniculatos, paucioribus alis ramosos. folia Solani maiora, Similaceis proxima sed asperiora, quãdoq; albo maculata. folliculi subcandicantes è foliorum alis dependent; & post eos folliculi vesicularum instar, rotundi aliquantulum turbinati singulari intus acino magnitudine cerasi, vnà cū folliculo per maturitatem rubente; semine intus plano rotundo subcandicante, haud magno. tenues albicãtes, latè serpunt radícula.

Nascitur in parietinis, locis vmbrosis, aliquantulum humentibus, quãdoq; circa agrorum margines.

Sub



2. 2

Physalis alkekengi
Oud. Pers. 1754

Sub Autumnū fructus matureſcunt, flores antè apparerent. Græcis σπύγνος ἐλκιδάκις & φουαλὶς dicitur: Latinis Vesicaria, & Solanum vesicarium: officinis Alkeken-gi. Plinius lib. xxi. Halicacabum & Callion vocari ait.

A folliculis autem vesicarum speciem imitantibus nomen accepit; siue, ut Plinius, quoniam vesica & calculis proſit. Germanus Schlutten/boberellen / Juden kirsen/teuffels kirsen; nostris Kriecken ouer zee, id est, vltimarumina cerasi; Hispanus Acarteador de luénno, bexiga de perro; Gallus Alquequenges, bagenauldes.

Facultate autem huius folia, ut Galenus sentit, Solani similia sunt. fructus cienda vrina est idoneus; proinde multis compositis facultaribus, quæ adiecur, vesicam, & renes accommodantur, miscetur. Dioscorides fructum potū vrinam mouere, & morbum regium expurgare ait.

Halicacabus peregrinus.

Ad huius genus & aliam quandam vesicariam recentiores referunt, quæ tenuibus, striatis, ac viticulosiſ cauliculis latè seſe diffundens, vicina quæq; apprehendit adnuncula. folia huius oblonga, diuisa, laciniata, & per ambitus profundius incisa: flosculi è longis pediculis candidi: folliculi distanti magnitudine Halicacabi, interſepientibus membranulis in tres distincti loculos: fructu in singulis unico, duro, rotundo, ochri figura & magnitudine, colore nigro, candido tamen umbilico, qui mediocris magnitudinis, & cordis Conoidis lutiorem speciem imitari videtur. radix satis crassa multis fibris capillatur.

Aliunde illata stirps est, Germaniæ nequaquam vernacula. Peregrinum Halicacabū et Peregrinam vesicariam hac de causa appellant. Sunt qui Cor Indicum vocent: alij Pisum cordatū. A vero aberrant, qui Dorycnion esse existimant. Inter Solana non rectè quoq; reponitur. Facultas autem huius nondum explorata aut comperta est.

SOLANVM somniferum ad duorum aut trium pedum altitudinem subinde attollitur. caules eius crassi, rotundi, duriusculi, foliis vestiuntur multis subpinguibus, latis, oblongis, mali coronei maioribus, alioqui similibus. flosculi subrubentes in breuib. pediculis, è sinu soliorum, caules ambiunt. acini siue bacca crocei coloris exiguis facta seminibus in folliculis succedunt hirsutis. radix subest longa, crassa, lignosa, foris nigricans, aut, vt Dioscorides, ὑπερῶρον, id est, subrubente cortice vestita.

Nascitur in saxosis haud procul à mari, eodem auctore. In hortis Belgij satum, fructum perficere agrè potest.

Dioscorides σπύχρον ὑπερῶρον appellat: Theophrastus σπύχρον ὑπερῶρον: ab aliis δῖπαιον dicitur: Latinis Solanum somniferum, à plerisq; etiam Solanum Manicum, Apollinaris minor, Vlticana herba, Opsago.

Cortex radices huius, inquit Dioscorides, in vino potus drachma pondere vim habet somniferam, mitiorem tamē quàm Papaueris succus. fructus valdè vrinam ciet. Dantur hydropicis corymbi x i i. plures poti videntis emotionē faciunt.

Hæc Galenus ex Dioscoride quoq; transcripta habet; adiiciens corticem radices in tertio esse ordine refrigerantium, vi pote Opia imbecilliores ac mitiores.

DE SOLANO MANICO EX DIOSCOR-
RIDE ET THEOPHRASTO.

CAP. XXVI.

MANICVM siue furiosum Solanum, folia habet, ut Dioscorides ait, Erucae similia, attamen maiora, & ad Acanthi, quem Paderota vocant, accedētia. caules producit à radice ὑπερβυτῆς siue proceros decem aut duodecim, Orgyae altitudinem habentes: caput verò in fastigio emittens, uti Oliua, sed hirsutiùs, instar Platani pilula. grandius tamen ac latius. flos niger. post hunc fructus racemosus, rotundus, niger, acinos x. aut xii. veluti Hedera habens corymbos; sed vna modo molles. radix subest candida, crassa, concava, cubitalis.

Theophrastus huic folium etiam ἐν ὄρω, hoc est, Erucae simile tribuit & maius; caulem Orgyae longitudinis: caput verò Gethyi, grandius tamen ac pilosius, fructum Platani simile.

Gethyon.

Gethyon autem ex Ceparum est numero, & ut quidē Plinius, Ascalonia genus. quod penè, ut Theophrastus ait, ἀκράτων, id est, absq; capite est, ceruicis tantum longæ, et ideo totum in fronde.

Ὀρῦα.

Ὀρῦα autem mensura est Hesychio, quanta est amburum manuum extensio, siue, ut Marcellus, quantum protensi hominum utriusq; brachia per pectus longitudine patent.

Nascitur in montanis & vento expositis ac παραμῶν, hoc est, locis latis magnisq; mari vicinis.

Ἐπύχρον appellatur μανικόν, siue Furiosum Solanum: à nonnullis ὁρίων, ab aliis ὁρύον, aut potius, ut Theophrastus habet, ὁρύον vel βρύον, item & πεπιδόν. Dicitur & ἑρόρον, ὁρῶδον, περτάδον & ἄνδρον. Dioscorides lib.

sexto

sexto de lethalibus medicamentis, Dorycnion, nonnullis Solanum manicum appellari ait.

Vini autem habet Solani manici radix pota cum vino pondere drachmae unius ut imaginationes faciat non inu-
cundas. Duæ verò potæ mentem ad triduum emouent. Sed
quatuor drachmæ epotæ interimunt. Remedium est aqua
mulsa copiosa pota, & vomitu reiecta: auctor Dioscorides.

Theophrastus eadem ferè habet. Datur eius radicis,
inquit, drachma pondus, si placuerit ut quis ludat, seq̃ pul-
cherrimum putet: Si verò ut amplius insanat, drachmis
duabus opus est: Si autem insaniam nunquam solui cu-
piueris, drachmas tres dabis: quatuor, si interimendum,

DE SOLANO LETHALI.

CAP. XXVII.

LETHALI Solano caules surgunt bicubitales aut
altiores, rotundi, mediocri crassitudine, ramosi, è subru-
bro colore nigricantes; quos conuestium oblonga, lata, mol-
lia, & nonnihil lanuginosa folia, maiora latioraq̃, quàm
Solani. flores oblongi, caui, è foliorum alis, obscuriore pur-
pura nigricant. bacca acino vna simillima, succedit sin-
gulus vnica, splendide nigricans, magnitudine ferè medio-
cris cerasi, exiguo semine grauida. radix longa, magna,
inalbicans, diuturna ac viuax, in propagines plures distri-
buitur.

Circa sylvas, iuxta parietes, sepimenta q̃, agrorum,
aliisq̃, perinde parum cultis ac desertis reperitur locis: vim-
broso amat.

Augusto arrident matura bacca. flores & ante & eo-
dem reperiuntur tempore.

Atropa belladonna, L.
Dod. pempt. 452



Vulgò Solanum lethale, siue Solatrum lethale appellatur: Italis ac Venetis Bella dona: Germanis Dollwurtz; dollkraut / schlaff beeren / leukraut; Belgis Groote natsape & dulle besien. Sunt qui putent Fabam inuersam dici.

Ad Mandragoram Theophrasti (qui differt à Dioscoridis Mandragora) plurimum accedit; si non ipsissimus est. Mandragoras
Theophrasti. Theophrastus hunc caulem habere ait, & fructum ferre nigrum $\pi\alpha\gamma\acute{\omega}\delta\eta\nu\ \chi\epsilon\ \omicron\iota\upsilon\acute{\omega}\delta\eta\nu\ \tau\tilde{\omega}\ \chi\upsilon\mu\tilde{\omega}\varsigma$, id est, acino vuae similem, & succo vinosum. Respondent quoque facultates.

Nam Solanum istud soporiferum est, mentem conturbat, insaniam facit, si pauciores bacca sumantur; plures verò etiam interficiunt, citam festinamq; mortem inferētes. Hac et de Mādragora Theophrastus de causis lib. VI. Sōmnum, inquit, conciliat, & si copiosius etiam detur, mortem adfert Mandragoras.

Solani huius & aliud est reperire genus, foliis angustioribus, venosis, deorsum reclinatis; caule anguloso; floribus oblongioribus calathi specie, marginibus crenatis, è pediculo dependentibus; quibus succedunt singula bacca nigra, aut ex nigro purpurascens, seminibus referta, media sui parte calyci denticulato inhaerentes. radix grandis, strumosa & albicans.

Matthiolus Solanum istud agro, ait, exire Goritiensi in monte Saluatino inter saxa. & speciem alteram Solani somniferi esse sentit. Est tamen Solano lethali similis, ad cuius genus idcirco potius referendum.



FŒMINÆ

MARIS

Atropa mandragora, L.
Prod. herb. 457

MANDRAGORAS Mas est & Fœmina; ut etiā Dioscorides ait.

Mari solia sunt magna, longa, lata, leuia, dilutè virentia, veluti Beta, sed maiora amplioraq; & resupina. flosculi in singularibus pediculis inter hæc exeunt, herbaceo candicantes colore: mala inde rotunda, lutei coloris, reluctis laucris, soporifero odore suaueolentia; in quibus semina modicè plana & quasi resina. radix proluxa, crassa, candicans, subinde bifida aut trifida.

Fœmina solia angustiora sunt & minora nigrioraq;: fructus pallidiores, minores, turbinati, sorbi aut pyri effigie, sed non minùs odorati: radix quoque proluxa, foris amplius nigricans, interiùs albida. Caret uterque caule, et solia ab ipsis promit radicibus.

In calidis regionibus, in sylvestribus & montosis gignitur, veluti in Gargano Apulia monte. At in Germaniis sat tantummodò reperitur; & fœmina quidem perquam rarissimè.

Μανδραγόρας & à nonnullis κίρκαια Gracis dicitur. et Circea quidem à Circe illa venefica procurandi amoris artifice. Creditur enim huius radix ad amatoria facere. Appellatur et ἀντίμαλον, διπλάσια, ac ut notha habent, ἑνὶ φανδί, ἀντίμαλον ἢ ἀντίμιον, βρομβόχυλον: à Pythagora ἀνδρωπομόρπον: Latinis Terra malum, terrestris malus, canina malus; Germanis Alraun: officina & relique nationes Gracam vocem retinent.

Marem Dioscorides ait, à nonnullis μάριον dici. Describitur tamen ab eo & alius Mandragoras Morion, qui, quantum ex ipsa datur colligere descriptione, mari similis est, sed omnibus partibus minor.

- 2 Fœmina μέλας μανδραγόρας, & Ἐπιδωκίās appellatur. Differt ab istis Mandragoris, Theophrasti Mandragoras, cuius superiore meminimus capite.

Habet autem Mandragoras vincentem facultatem refrigeratorem, ut Galenus ait, adde ut tertij sit ordinis refrigerantium.

Dioscorides multas huius particulatim facultates enumerat, quarum tamen haud alia huic propria, quam quæ narcoticam & somnificam eius potentiam consequuntur. Est hæc in cortice radicum maior quàm in reliquis partibus. Poma mitiora, cum pipere & aliis perinde calidis cocta edi posse feruntur.

Galenus etiam pomis nonnihil caloris & humiditatis inesse ait : radicis autem corticem esse valentissimum, & non tantum refrigerare, sed & desiccare.

DE AVREIS MALIS.

CAP. XXIX.

MALORVM aureorum stirps caules habet rotundos, bicubitales aut ampliores, multis alis ramosos, succi plenos, facile collabentes. foliis luxuriat multis, multipliciter dissectis, Agrimonie fere foliorum modo, singularibus eorum, incis. flosculi lutei sub foliis prodeunt; excipiunt hos fructus rotundi, profundis crenis striati, mediocris mali magnitudine, per maturitatem aut pulchrè rubentes, aut auri luteo relucens colore, in quibus copiosa humens medulla succi instar; qua semen conditur. Tota herba gravem foetidumq; odorem spirat, è viridi colore inalbescit, & aliquantulum hirsuta est.

Seritur subinde in hortis. Eodem quo satæ est anno fructum, & quidem Autumno, perficitur.

Nostra



Solanum elaeagnifolium, L.
Solanum elaeagnifolium, L.

Nostra etas Aurea mala appellat : Itali *Pomi d'oro*: Germani *Goltopffel*: Galli *Pomme d'amours*, id est, *Amoris poma*.

Alia sunt aurea mala, de quibus fabulatur Poëta, hor-
torum filiarum *Hesperii*; quibus custos adhibitus fuit Dra-
co, quem ab *Hercule* interfectum ferunt.

Facultate autem hæc mala aurea, cum vniuersa ipsa
herba refrigerant, aliquanto tamen minus quam *Man-
dragoras*.

Poma à nonnullis cum pipere, sale & oleo preparata
ac cocta eduntur. Præbent autem corpori alimenti quidẽ
perquam exiguum, & hoc ipsum prauum ac vitiosum.

DE MALIS INSANIS.

CAP. XXX.

M A L A insana appellata humilis producit herba:
cauliculus brevis est, pauci ramuli, sed lata sunt folia, ma-
iora, crassiora, candidiora q̃, quam *Solani*, ambitu nonnihil
sinuata, ad *Xanthij* nonnihil accedentia. flosculi albicante
aut purpurascens colore speciosi, si ellipse modoradiati, luteis
in medio staminibus. fructus calyci inherens à mediocri
longitudinis pediculo dependet, subinde oblongus gallinacei
oui forma & magnitudine; quandoq̃, mali instar rotun-
dus, nonnunquam candidus, sæpius purpurascens.

Annua & hæc stirps. Sata Vere, Autumno fructife-
ra est.

Peregrina quoque Germaniæ ac Galliæ. Sed in Aegy-
pto passim in arenosis campis vel spontè gignitur, fructus
adferens duplo aut triplo maiores, quam in Gallia aut Ger-
mania: ut quidem *Petrus Bellonius* in *Singularium suorum*
lib. II. scriptum reliquit.

Iudicauit



Solanum elaeagnifolium Desf.
 .
 Ind. plant. 407

Iudicauit idem Theophrasti Malinathallam esse. Apud Insubres Melongena; ab Hetruscis verò Petranciani, vt quidem ait Matthioli, dicuntur. alij Melanzana vocant: Latine Mala insana: Germani Melantzan; an/doll opffel: Galli Pommes d'amours, & Verangenes. posterior appellatio Hispanis & Belgis innotuit.

μαλιναθάλλη.

De Malinathalla autem sic Theophrastus: Locis arctosis (in Aegypto) haud procul à fluuio nascitur terrenū, quod μαλιναθάλλην appellant, figura rotundum, magnitudine Mespili, sine nucleo: folia vt Cypeiros mittit. hac (radicem nempe Loci Corfium appellatam & Malinathallam) incolae legentes in σπύρω hordeasceco coquunt, dulcia admodū redduntur, hiq; pro bellariis videntur.

Quae sanè verba, Mala insana, haudquaquam Malinathallam, sed differentem omnino esse stirpem ostendit. Malum etenim ipsum Mespilum magnitudine excedit: folia autem herba non sunt Cypeiri.

Ceterum mala insana apud Aegyptios, teste Bellonio, cocta sub cineribus, vel in aqua, aut etiam fricta singulis serè diebus & mensis inferuntur, & eduntur. Hermolaus Barbarus ex oleo, sale & pipere fungorum modo coqui et mandī refert.

Qualicumq; autem tandē vel cocta vel preparata modo esitentur, mali sunt succi, & nullum aut omnino exiguum praebeant alimentum.

DE STRAMONIA SIVE POMO SPINOSO. CAP. XXXI.

STRAMONIAE caulis cubito non raro altior, digitum crassus, in pauculos ramulos diuiditur: folia eius lata, sinuata & acuminata, maiora longioraq; quam Solani
ant



Dod. pempt. 469
Lob. ic. 264

aut Malorum insanorum. flos ex oblongo denticulato calyce exit, magnus, candidus, calathæ effigie, Conuoluuli maioris floris æmulus, sed tamen omnino maior ac amplior, et per oras angulosus, staminibusq; aliquot albidus in medio. fructus succedit singulis rotundus, breuib; crassus, non tamen acutis spinis asper, magnitudine ferè nucis regia, putamine suo nondum exuta, aut maior, in quibus semina et magnitudine & forma Mandragoræ. Odor herba caput nonnihil aggrauat: floris gravior Lilio accedit, sed tamen & soporiferus.

Rara & peregrina stirps est. Vere feritur, si feruens serenæq; Aestas fuerit, fructus Autumno in Belgio perficitur, secus non facile.

Stramoniam nuncupant, & Pomum siue malum spinosum: nonnulli Coronam regiam: alij Melospinum: Græci nostri tēporis *περοκόκκαλον* aut potius *βαρυκόκκαλον*, quasi nucem grauantem & torporem ac molestiorem somnū inducentem: Itali hinc, vt quidem apparet, *Paracoculi*; Germani *Stechopffel* vocant: Belgæ *Dozen* appel: Galli *Pomme de Peru*: Valerio Cordo *Hyoscyamus Peruanianus*: Matthiolo verò atq; alijs *Nux Methel Arabū* esse videtur. Nucem autem *Methel* Serapio cap. C C C L X X V. fructum esse scribit similem *Nuci vomica*, cuius semen sit veluti *Mandragoræ*; cortex asper, sapore gratus ac virtuosus: qualitas quarto ordine frigida. Aloysius Anguillara *Stramoniam Hippomanes* illud *Theocriti* esse suspicatur, quo in *Pharmaceutria* equos in furorem agi refert. *Crateuas* siquidem, quem eius citat interpres, *Hippomanis* plantam fructum habere scribit, vt *Cucumeris syluestris* spinosum.

Facultate autem *Stramonia* soporifera ac narcotica, frigida etiam quarto ordine, *Mandragora* non inferior.

Nux Methel
Serapionis.

Hippomanes.



42

C. autumnale L.
 prod. gener. 468

COLCHICO folia ternā, aut quaterna oblonga, lata, lauia, pingua, Lilij albi foliis & forma ac lauore sat is similia; inter qua mediū in breuibus pediculis exeunt duo, tres, aut quatuor, instar siliquarum folliculi, triangulares, crassi, oblongi, per maturitatem in tres sese explicantes partes; semine pleni rotundiusculo, è ruffo colore nigricante; quo maturo folia vnā cum cauliculis intercidunt. Paulo ante Autumnii aequinoctium in breuioribus, tenerioribus, albicantibus pediculis flores erumpunt (nullis iam apparentibus foliis) Croci flosculis & forma & colore assimiles, dilutius tamen carulei; staminibus internis pallidè luteis. radix bulbo similis, turbinata, ab vna parte in planum compressior rimam siue sulcum, cūm floret, habens, reliquo tempore non apparentem: tunicis conuestitur nigricantibus; fibras aliquot inferius demittit. bulbus ipse carnosus candidus, lacteo succo manans, dum quidem virescit & recenter è terra erutus: resiccatus etenim rugosus & foris interiusq; nigricat, aut etiam obscure rubescit, teste Val. Cordo. sapore autem est dulci, amaritudinis tamē exiguum saliuam eliciens subsequitur.

Vulgare autem istud Colchicum Italia, Gallia, ac Germania est: vbi in humidus sed tamē pinguibus ac latus pratis exit, & non rarè in montium conuallibus. Reperitur etiam nonnullis locis, foliis angustioribus. Dioscorides in Messena & Colchide nasci tradit. Germinant folia Vere; circa aestiuum solstitium siliquæ cum semine maturantur; flores circa Autumnii aequinoctiū, vt diximus, reperiuntur.

Κολχικόν Dioscorides appellat: pleriq; ἐπὶνέσπον. est tamen et aliud ἐπὶνέσπον non lethale. Latine à nonnullis Bulbus

bus agrestis: Germanis Zeiclosen: nostris Titeloosen: Gallis Mort au chien: vulgò Hermodactylus.

Sed tamen quo in medicamentorum compositionibus *Hermodactylus* ^{Hermodactylus} vimur, ab isto differens est. Bulbus nempe huic magnitudine & forma satis respondens, verum resiccatus, & albidus permanens, neutiquam rugosus, modicè durus, tundiq; facilis, cuius pulvis candidus est.

Valerius Cordus Colchicum quoddam reperiri scribit superioribus simile, sed flore candido & radice bulbo, cum resiccatus est, in alicante interiusq; candidissimo; cuius contusi pulvisculus speciem exhibeat farinae triticeae; sapore suavi ac dulci. Hoc in Germania, inquit, non nascitur, sed aliundè infertur. Et verisimile est albidum istius & peregrini Colchici radices esse, quæ in officinis Hermodactyli nomine veneunt: nihilq; aliud Hermodactylum istum esse, quàm alba candidaq; radice Colchicum. Qui tamen verè Colchicum non est; neq; propriè Colchicum dicitur.

Atque ita duo erunt vnius generis: legitimus videlicet Hermodactylus, candida & foris & intus radice; & spurius Hermodactylus, siue perniciosum Colchicum, nigricante aut rubente foris, interiusq; bulbo.

In hac sententia fuisse Auicennam, quæ ab eo scripta sunt cap. CCCLII. ostendunt. Hermodactylum siquidem, ait, radicem esse plantæ habentis rosas (id est flores) albos aut citrinos (rectius purpureos) & meliorem esse album: rubentem & nigrum malos, ac perniciosam venena.

Ceterum Hermodactylus exterius interiusq; albicans vim habet purgandi; priuatim artbriticis, inquit Paulus, tunc cum humores fluunt, exhibetur: verum stomacho aduersatur. At nigri & rubentis Hermodactyli siue Colchici radix, in cibo accepta strangulando enecat, similiter et fungi; Dioscorides auctor.

Haud autem admirandum tam dissimiles esse facultates colore differentibus. Nam & Agayicus candidus medicina, & ad purgationes utilis est; niger verò perniciosus. Et Rosæ cādidæ aluum leniunt; rubra verò eandē adstringūt. Ipsius etiā loci ac regionis diuersitas ad facultatum mutationē subinde plurimum facit. Persea in Perside exitialis, in Aegyptum translata cibo idonea facta. Taxi umbra Narbonæ periculosa; alibi innoxia.

Ita Hermodactylus in calidis locis & regionibus, à Sole excoctus facilè resiccatur, candidusq; & foris & interiùs permanet, in Colchide verò ac aliis frigidioribus humidioribusq; regionibus, crudo ac superfluo humore redundans, rugas arefcens cōtrahit; & fungosus redditus rubescit aut nigrescit : ac non modò colore permutato; sed etiā & substantia eius corrupta, perniciosus efficitur.

DE CICYTA.

CAP. XXXIII.

PROCERO, ferulaceo, glabro, leui, eoq; crasso, intus inani, dilutè virenti, nōnullus tamen subrubentibus veluti serpentum maculis resperso culmo, supra tres non raro cubitos Cicuta assurgit; umbellæ fastigia occupant; candidi in his flosculi; semina postea Anisi amula aliquantò candidiora; radix dodrantalis, crassitudinis digiti, candida, & quando caulem facit interiùs caua, priùs solida. Ingratum, grauem sædumq; ipsa tota spirat herba odorem.

Circa oppida & pagos abundat locis vmbrosis & pinguibus, prope fossas aggeresq;, agrorum pratorumq; sepi-
menta.

• Cum floribus Iulio: semine pregnantem Augusto ac seriùs videre est.



Cicuta maculata L.
 var. *perfoliata* L.

Græcis κώκεον, Latinis Cicutā est: Germanis Schierling/wutzerling: Brabātis Scheerlinck/dullekeruel: Hispanis Ceguta y Canaheia: Gallis Cigue.

Extremè, vt Galenus testatur, refrigerantis est facultatis. Temerarium fuerit hanc vel puerorum testibus, vel virginum mamillis imponere, incremētumq³ harum partium eo modo reprimere. Præter enim quòd partes illas facile efficiat contabescere, cordi quoque ac iecinori foris admotā etiam obest: tametsi multò magis intrò assumptā. Est etenim ex lethalium numero, frigiditate sua, vt Dioscorides refert, enecans.

Remedio est, Plinius ait, priusquàm perueniat ad vitā, vini natura excalfactoria: sed in vino pota irremediabilis existimatur.

Athenienses in interimendo sapientissimo philosopho Socrate Cicutā vsos, Plato refert.

Quàm grauius & periculosè hallucinantes officina, huius semine loco seminis Harmel, id est, Ruta, quandoq² vsæ fuerint, explosio iamdudum errore, notissimum est.

Finis libri quarti.

A P P E N D I X
V A R I A R V M E T
Q V I D E M R A R I S S I M A R V M
N O N N V L L A R V M S T I R P I V M A C
Florum quorundam peregrinorum elegatissi-
morumque, & icones omnino novas nec antea
editas, & singulorum breues descriptiones con-
tinens: cuius altera parte umbelliferæ multæ
exhibentur.

R E M B. D O D O N Æ O M E D I C O
A V C T O R E.



A N T V E R P I Æ,
Ex officina Christophori Plantini,
Architypographi Regij.

M. D. L X X I I I I.

REMBERTI DODONÆI
IN APPENDICEM AD
LECTORES PRÆFATIO.



IRCA icones, quæ Purgantium aliarumque eò facientium herbarum historiæ debentur, cum solliciti essemus, candide lector, atque in conquirendis herbis occupamur, occurrerunt in amicorû hortis ac amœnissimis viridariis nonnullæ, & ad præsentem quidem non facientes historiæ, sed tamē quandoque & suo tempore desiderandæ, quas vnâ cum aliis depingendas putauimus.

Cum enim subinde accidat vt pleræque ad manum non sint, quando depingendæ requiruntur; non abs re, nec temerè me facturum existimaui, si obuias & nunc vltro sese offerentes, curarem figuris elegãtibus exprimendas. Peregrinæ siquidem & aliundè in Belgium illatæ, Hyemis aut cæli solivè incommoditate, aut aliàs sua etiam natura facilè pereunt ac nolentibus intercidunt. Sed & nõ rarò vulgares oportuno & quo vigent tempore, legere commodum aut opportunum non est.

Atque hinc est, quòd in præsentì Purgantium historia, tum & in aliis præcedentibus Florum ac Frumentorû, plerasque desiderari contigerit. Maluimus enim (vbi videlicet stirpes viuæ ad manum non essent) nullas addere, quàm ex deprauatis aut effictis deteriores imagines exhibere.

Sunt autem imaginum huius Appendicis, quædam

dam vel ad Florum, vel etiam ad Frumētorum historias; plures verò & aliò referendæ. Umbelliferæ quoque multæ sunt, quarum conceptam historiam, cū pro voto nō daretur absoluerē, quas earum parauimus icones, in huius appēdicis alteram digessimus partem.

Adiecinus singulis formæ breues descriptiones, quas addere operæpretium omnino duximus. Nisi enim hæ coniungantur, parum aut nihil vtilis figuræ. Neque enim siquidem figuræ colorem, odorem, saporem, qualitatemque explicare: magnitudinē rarissimè referunt. tempora erumpendi, natalesque locos ostēdere quo modo poterūt?

Descriptiones hæc docēt: per quas magnitudo, altitudo, amplitudo, & foliorum ac caulium totiusque plantæ color, sapor, reliquæque qualitates cognosci possunt: loca nativa, & quæ ab ipsis amantur, inueniri: germinandi, florescendi, ac fructum maturandi tempus exprimi: scitu necessaria ad stirpium notitiam contendenti, quæ ipsæ icones, vt diximus, præstare nullatenus possunt.

Non tamen hæc eò scribimus, quòd damnādas aut reiiciendas icones velimus, sed vt solas nō sufficere admoneamus; & parū aut nihil absque descriptionibus herbarum studiosis prodesse.

Neque enim vnquā probare iudicium, aut laudare sententiam potuimus eorum, qui icones omnino reiiciunt ac nihili ducunt.

Nam tametsi Galenus, quod Cornarius adfert, alicubi fortassis icones minùs laudet, non alias tamen improbat, quàm ab iis factas ac depictas, qui stirpes

stirpes ipsas coràm non vidissent; sed ex notis tantùm nonnullis expressissent. Atque huiuscemodì certè omnes omnino improbandæ ac reiiciendæ sunt. Rarissimè siquidem accidit, tales legitimam formam ipsarum stirpium referre.

At legitimas verasque icones ad viuarum plantarum imitationem elegàter & artificiosè delineatas, neque Galenus ipse, neque veterū quisquam, si superessent, improbaret aut vituperaret: sed ecòtrà omnes amplecterentur, laudarent, iudicarentq; ad stirpium notitiam quamplurimùm conferre.

Exhibent namque icones ritè ac bene depictæ, ideam quandam, & quidem talem, qualem etiam attentissimus aliquis ex absolutissima ac diligentissima descriptione animo statim concipere nequit, qua semel ex imagine concepta, faciliùs & ipsam descriptionē intelligit, & oblatā obuiamque stirpem agnoscit.

Atque hanc ob causam annisi semper fuimus, imagines nostris addere historiis.

Vtiles autem præcipuè his sunt, qui viua demonstrantis voce & ad herbas deducentis manu destituuntur. hinc enim subsidij plurimum accipiunt, & descriptas stirpes faciliùs agnoscūt. Quibus autem præceptor contigit, stirpes coràm ostendens, non tantùm iconibus opus habent. non sunt tamè omnino inutiles, nam ad memoriæ confirmationē plurimùm ipsis conducunt.

Inter hortos verò, è quibus nobis præstita est haud exigua stirpiū multitudo & locuples varietas, longè amplissimus ac ditissimus est generosi

ac verè nobilis viri D. Ioannis Brancionis cultissimus hortus, quem & complures exteri, sed plurimum locupletat clarissimus ac doctissimus D. Alfonsus Pancius illustrissimi Principis Ferrariæ Ducis medicus, ac simplicium tum & Medicinæ publicus professor.

Deinde & hortus doctissimi ac nobilissimi D. Ioannis Boisori Bruxellensis, cuius liberalitate & fauore rarissimarum icones accessere.

Iã & ex Petri Coudebergij Antuerpiensis pharmacopœi diligentissimi; ac conciuum nostrorum Georgij Rhetij & Raphaëlis Coxix præclaris ac luculenter instructis viridariis, nō exigua quoque facta est accessio.

Frui autem istis poterunt studiosi, interea dum singulas in suas classes digerere, & tandem reliquā historiam absoluerè meditamur. Vale. Mechliniæ, anno M. D. LXXI.

APPEN-

D E D E N T A R I I S .

C A P . I .

I **D**ENTARIÆ duæ sunt. Prioris cauliculus
 dodrantalis: folia Cannalis aut Pentaphylli
 modo, quinque ad vnum herent pediculum,
 oblōga, lata, ambitu serrata: flosculi Leucois
 similes colore, è punico colore subpurpurei; siliquæ etiā qua-
 les Leucois, in quibus semina. radix oblonga, inæqualis,
 multis crassis exasperatur squamis.

2 Alterius Dentariæ folia haudquaquam Pentaphylli,
 sed veluti Fraxini digesta, *πάχυ* siue costam habent me-
 diam cui annectuntur; sunt verò ea oblonga, lataq̃, &
 crenis secundum margines incisa, crebrò ad vnā costam
 septena: flores candidi, & quæ sequuntur siliquæ, prioris si-
 miles. radices quoque asperæ & squamosæ, sed tamen non-
 nihil quàm prioris minus.

Ambæ ad Leucoij genera referri posse videntur. Pere-
 grinæ sunt, nec vires habent nobis exploratas.

Matthiolus priorem harum pro altera Dentaria depin-
 git, sed absq̃ floribus ac siliquis, & inter Symphyta ac so-
 lidagines reponit. Quam ille primam Dentariam facit,
 Valerius Cordus Anblatum nominat: si nos pictura non
 fallit.



Dent. pent. 162

D. pentaphyllus, L. sp. Ed. 2. 912. Bet. y.
 Gen. hist. 1.1

D. digitata, Lam. 2. 265

D. pentaphylla, L. D.
 Less. Bot. 1. 2

Dentaria pinnata, L.
 Bot. pinn. 162





b

Primula auricula, L. 2
 var. *pendula* 1848

A V R I C V I A vrsi à nonnullis dicta ex genere est Phlomidum siue Verbasculorum, quæ Primulæ Veris vulgò appellantur. folia eius veluti illarum lata & oblonga, sed omnino crassiora, carnosioraq;, ac lenia, nequaquam pilosa, secundum margines exiguum serrata; inter quæ medius prodit coliculus in cuius fastigio flosculi terni, quaterni, aut quini exigui, luteo pallentes colore, quales Verbasculis. radix oblonga, crassa, foris nigricans, materia intus candida, fibris multæ capillatur.

In Heluetia, Valesia, Sabaudia, & nonnullis aliis Italia vicinis Alpibus reperitur: & in rupibus quidem saxosis, altioribus aridioribuscq;, locis minor ac tenerior: letiore verò solo ac inferiore montium parte letior, maior, amplioribusq;, luxurians foliis.

Primulam Veris Alpinam alij appellant: Lunariam arthriticam Gesnerus: nonnulli solum montanum.

DE EPIMEDIO.

CAP. III.

Q V O D pleriq;, Epimedium vocant, rarum & peregrinum est ὄζον. folia eius ampla, numerosa & creberrime ter trina, rarò plura, ab vno tereti tenuiq;, dependent pediculo. sunt autem ea Hedera foliorum figura, lata, acuminata, duriuscula & per circumferentiam veluti serrata. assurgit inter hæc tenellus & rursus dodrantalis cauliculus, perquam elegantes progignens flosculos. forma quadrangulares; quorum rubent margines, interiora lutea, medij verò virent apices. rubet & exteriore ac auersa parte



b 2

E. alpinum L.
 Bot. Beech 599

388 DE DENTE CANINO ET EPHEMERO.
parte flosculus, sed discurrentibus rectis candidisq³ striis
variegatus radix multas in obliquum propagines emittit.
inferius fibrosa.

Legitimum esse Epimedium non fuerit facile affirmare.
Dioscorides siquidem Epimedio neque florem neq³ semen
esse scribit.

In frumentorum historia cap. CVIII. Epimediū quoq³
iconem quondam dedimus, sed hanc secunda eiusdem edi-
tione deleuimus. Epimedium quale Dioscorides describit,
nondum in notitiam nostram peruenit.

DE DENTE CANINO
ET EPHEMERO.
CAP. IIII.

DENTI canino folia exeunt latiuscula, bina, ter-
nave, Alij vrsini aut Lilij similia, at minora & rubro ma-
culata, humum versus reflexa. surgit ab his tenuis pedicu-
lus dodrante non maior, è cuius fastigio flosculus dependet
è senis foliolis, totidemq³ è medio prominentibus cum suis
apicibus staminibus, Liliū sylvestre, cū forma, tum re-
pandis extrorsumq³ reflexis foliolis referens, verū mi-
nor; colore subinde candidus; aliquando eleganti nec tamē
intenso rubore purpureus; non rarò medio inter utrosque.
capitulum sequitur rotundum, exiguum, in quo semina.
radix oblongum & tenuem refert bulbum, fibras deorsum
quoq³ dimittens.

Fertur in Mutinensibus ac Bononiensibus Italia mon-
tibus reperi.

Satyrium pleriq³ appellant, et quidem Erythronium di-
ctum desideratur tamen & in radice magnitudo mali, &
alia nonnulla.



Erythronium dens canis, L.
 Ord. Ranuncul. 203.

Lysimachia ephemerum
Det. March 203



In Matthioli commentariis lib. II. cap. LXXX. huic similis (si nō eadem est) herba pro Pseudohermodactylo depingitur. Quod si autem hac est, perperam & contra omnem veritatem duo addūtur bulbi. Nequaquam enim geminata ei, sed vnica tantū tenuis bulbi specie radix est.

Ephemerō Dioscoridis esse posset, si in descriptione pauca aliter se haberent. Liliū siquidem syluestre foliis, ac floribus minoribus tenuioribusq; refert. radix vna oblonga digitalis crassitudinis, oblongo ac tenui bulbo, vti scripsimus, similis. Deest illi caulibus Lilij æmulus: syluestris tamē Lilij aliquo nihilominus modo, depēdente deorsum, repando flosculo referre posset.


Dioscorides Ephemerō ait à nonnullis appellari ἰρις ἄ-
 ρπειν; malim legere ἰριον ἄρπειον. Nam si folium caulesq;
 Lilij, citius Liliū syluestre, quā syluestris Iris videtur
 nuncupandum.

Locus Diosco-
 ridis animad-
 uersus.

Matthiolus aliud Ephemerō eodem loco exhibet, quod
 in hortis Belgij aliter, quā ab eo depingitur, enatum est.
 Prodiit siquidem foliis oblongis, latius, duriusculis, veluti Isa-
 tidis, sed tamen minoribus; cauliculis compluribus rotun-
 dis, cubito altioribus, non absque adnatis; quos superius
 Quinquesolij candidi cōnectiunt flosculi, haud magni, suc-
 cessuē prodeuntes. semē succedit in rotundis capitulis exi-
 guum. crassū & multis fibris capillata radices. Verū
 istud cum Ephemerō Dioscoridis parum, immō nihil con-
 uenit.

Ephemerō
 Matthioli.

I. tuberosa, L.
Died. p. 116. 2499



DE IRIDE TUBEROSA.

CAP. V.

TUBEROSÆ Iridi folia ferè Chama-iridis, oblonga & angusta: tenuis cauliculus: flos in cacumine forma Iridis, minor angustiorumq³ foliorum, obscure virens, & quo aliis sîmbria loco, nigricans. capitulum satis magnum semine perfectò dependet, in tres rimas fatiscens. semen rotundum ochro minus, initio malbicat. non vnius forma radix: ante florem duo aut tres veluti bulbuli coherēt; hoc enato, in plures singuli extuberant propagines; quarum nonnullæ digicum referunt: vnde illi Hermoudactylo à ple-
risq³ nomen.

Iridis sylvestris genus esse potest; haudquaquam Ephemerî.

Sunt qui affirmant hunc esse, quem Matthiolus pro vero depingit Hermoudactylo. Eius tamen pictura parū cum nostra convenit.

DE ORNITHOGALO NARBONENSI.

CAP. VI.

ORNITHOGALON istud differens haud parum est à duobus illis, quæ historiæ nostræ de Floribus cap. LIII. alterius editionis depinguntur. Sunt folia huius oblonga & tenuia, & quam aliorum angustiora: caulus tenellus, culitalis, aut procerior; nullis conuëstitus foliis; floribus verò exornatus quàm plurimis, à medio fastigium petentibus; qui foris ac extrinsecus herbacei sunt, patentes verò intèrius lactei candoris visuntur, Phalangij flores referentes. fructus triangulari est lobus; in quo semina. oblongus pro radice bulbulus est.

O. narbonense, L.
 Bot. parisi. 222.



In Narbonensi Gallia ac iuxta Monspelium in agris frumenti feracibus gigni refertur.

Sunt, qui Dioscoridis legitimum Ornithogalon esse existiment. At nostra nobis pro legitimis magis placent.

DE MULTIPlici NARCISSEO LVTEO,
ac Meleagride flore, item & aliis ad Flo-
rum historiam referendis.


CAP. VII.

NARCISSEVS multiplex, eius species est, quæ in Florum historia cap. LVII. descripsimus, à quo solo flore foliola multiplicante differt. Colore siquidem totus luteus est; folia quoque ac bulbi conveniunt.

Meleagris differens à Narcisso est, Tulipa similior; cæ- Meleagris flos.
terùm minor ac deorsum dependens: è senis quoque componitur foliis: flos pulcherrimus, violaceo colore purpurascens, quem dilute admodum purpureæ ac quasi albicantes, ordine concinno digestæ, ac intermixtæ macula, elegantissimi in varietatem conferentes, commendant: & foris quidem. Interiore parte nigricantibus sparsim dispositis lituris, circa basim maioribus ac frequentioribus exornatur. Stamina huic quoque sunt sex, et medius pistillus, colore subluteæ. caulis tenuis; circa quem subinde quina, oblonga angusta foliola, è virore candicantia. radix bulbosa, rotunda & albida est.

Circa Aurelios in Gallia Celtica repertum accepimus. Aprilis mense in Belgio flores vigent.

Nonnulli Fritillari in vocant: nobis rectius Meleagris dici potuisse visum fuit. Meleagridu siquidè aut plumas, si non coloris specie, attamen varietate & dispositione magnitu-



Doubt. pink 227



Meleagris flos,
 Bot. Beech. 233

gnitudineq; macularum refert. Meleagrides siquidē aues variis sparsæ sunt plumis.

Ceterum præter hos occurrerunt complures alij flores tum & stirpes quedam, ad Florum quoque historiam pertinentes: vt Linaria odorata, Hypocistis, Hemerocallis Valentina, Asphodelus minor, Iris biflora, Crocus sylvestris, Hyacinthus Autumnalis maior, Narcissus totus candidus, Leucoion bulbosum Autumnale, Aster Atticus flore luteo, Stæcas folio ferrato. quorum icones iam antea doctissimi Caroli Clusij opera ac industria depictas, hoc loco putamus non abs re inserendas.

Linaria odorata referenda est ad cap. xxv i. historiae Florum, in quo aliquot quidem species, sed hæc tamen nō est descripta.

Hypocistis cap. de Cisto xxix. descripta est.

Hemerocallis Valentina differt non parum à Lilio non bulbofo descripto cap. xxxv. Ab Hispanis Amor myas appellatur, à nonnullis Pancratium flore Pseudonarcissi. Legitimam esse Hemerocallidem nō facile fuerit affirmare. folia & caliculus non conueniunt: in singulis apophysis haudquaquam plures, sed vnicus insidet stas, colore quidem pallidè luteus, sed haud Lilij diuisura, at Narcissi lutei siue Pseudonarcissi æmulus. Existimatur à quibusdā Scille species, & quidem Epimeridia. Ab aliis pro Pancratio habetur. Exit in Narbonensi Gallia, ac in Hispania veluti iuxta Valentiam, vbi pro Hemerocallide ab aliquibus: vnde Hemerocallidi Valentina nomen.

Asphodeli minoris mentio facta est cap. xxxv i i.

Iridem bifloram non modo Vere, sed & Autumno florē proferre cap. xl. scriptum est.

Crocus sylvestris satiuo haud multum absimilis est. Satiuus descriptio habetur cap. quinquagesimo.

Hyacinthus




Antirrhinum bellidifolium, L.
Wood. penzance. 1844

Cistus altissimus, L.
Dodd. Champ. 191



Cistus hypocistis, L.
Dodd. Champ. 191



Dist. pumil 229

A. fistulosus,
Drd. hand 202





I. biflora, L.
ont. plant 232



8.1. 211








Det. p. 218



Prod. p. 224



N. autumnalis, L.
Dod. pempt. 222

Leucoion autumnale, L.
Det. Penn. 230





Raphanistrum maritimum var. *h.*
Ded. Herbar. 266



Lavandula dentata,
D.D. - herb. 2. 25

Hyacinthus Autumnalis maior referendus est ad cap. LII. in quo & de aliis, ac de *Autumnali* minore.

Narcissus flore omnino albo, reliquis similis cap. LV. descriptis, inter quos venit numerandus; non modò foliis, sed & calyce albidus.

Narcissus Autumnalis parvus, minor est eo què à Marcello Virgilio, eodem capite, retulimus descriptū. Qui quidem angustis est foliis: flore Colchici sed luteo. ac ab Hispanis *Cebollina Alborana* appellatur.

Leucoion bulbosum minus pertinet ad cap. LVIII. à reliquis differens, quòd non Vere sed Autumno floreat.

Aster Attici lutei floris descriptio occurrit cap. LXXII.

Stœcas folio serrato annumerāda est alteri, de qua cap. LXXXI. à qua solo folio serrato differt.

DE OXY LVTEA
ET FISTULARIA.

CAP. VIII.

UTRAQUE herba descripta est in *FruMENTORUM* historia alterius editionis. Oxys quidem lutei floris cap. XCVI. de *Trifolio acetoso*: *Fistularia* verò capite centesimo.



Oxalis corniculata,
 Ser. 100. herb. 579



Pedicularis sylvatica, L.
Dart. French. 537.



Geranium, L.
Fl. purp. 61

GERANIORVM genera multa observavit posteritas, Dioscoridi duo sunt tantummodò.

Vnum quidem ac primum radice tuberosa, quod Belgio peregrinum est ac aliunde illatum folia huius uti Ranunculi, in multas finduntur lacinias; ad Anemones accedunt, maiora tamen & profundioribus incisuris. cauliculi tennes, ramosi; in quibus flores quinq; soliorum, exiguas rosas mentientes, diluti ruboris; oblongum, tenuem, acuminatumq; instar gruis rostri, post se fructum relinquentes: unde nomen. radix crassa, rotunda & tuberosa non absq; fibris nonnullis.

Matthiolus Geranium istud paulo aliter pinxit. fieri potest ut in Italia ac Pannonia alia effigie, quam in Belgio nascatur. De reliquis autem Geraniis aliis suo tempore ac loco.


DE OSYRIDE.

CAP. X.

PROCERA & multum ac valde ramosa herba Osyris est: altitudo eius bicubitalis vel altior: color dilute virescens. ramuli sine potius virga tennes sunt et rotundi: foliola oblonga, angusta, tenuia. flores exigui, racematim secus folia herent, herbacei coloris: inde tenui lanugine conditum semen, paruum ac nigricans. fibrosa radix.

Apud Italos Belvedere: in Græcia modò ἀνζύρις dicitur; voce corrupta, teste Aloisio. ροπήματα, id est, scopæ ex hac olim fieri solita, & nunc plerisq; locis sunt.

Chenopodium ciliolatum, L.
Det. plant. 101





d 2

R. montana, L.
Ord. pent. 120



Peganum harmala, L.
Prod. pempt. 121

DE RUTA MONTANA ET HARMALA, aliisque Rutæ generibus.

CAP. XI.

DE Ruta in Dioscoridis exemplaribus tria reperiuntur capita. vnum de vera & propriè appellata Ruta, quæ graueolens est: alterum de alia quadam Ruta sylvestri dicta Ascyro & Hyperico simili, seminis cuius odor resinosus est: tertium de sylvestri, Harmala appellata.

Graueolentis Rutæ duo etiam Dioscoridi genera, vnum Hortense: Motanum siue sylvestre alterum. Hortensis satis nota est; passim in multorum gignitur hortis. Inter sylvestres quadam maiores; montana verò minima est; hortensi omnes humiliores.

Maiores hortensem satis referunt, nisi quòd singula foliorum segmenta angustiora sint & longiora quàm hortensis, cuius singulæ foliorum particule latiores. Harum verò vna maior ac procerior: alia verò minor, angustioribus foliis. utraq; odore granior, & gustu acrior.

Quæ inter graueolentes sylvestres Rutas minima est, præ nimia foliorum tenuitate speciem ac formam foliorum Rutæ hortensis non retinet. folia siquidem tenuissimè diuisa habet: odor autè & sapor acerrimi: color paulo candidior: flos, capitulum, semen, similia sed minora.

Hæc autem genera omnia ad graueolentem, & propriè appellatam Rutam referuntur.

Ab his differt Harmala, quæ à nonnullis, vt diximus, Harmala. sylvestris Ruta. Promit autem hæc à radice cauliculos complures dodrantes aut altiores: folia circa eos virentia variè dissecta, longiora, angustiora quàm sylvestris graueolentis Rutæ. flos candidus est, quinquesolius. fructus triangularis, maior satina Rutæ; in quo semen.

Grauem hæc Ruta odorem in calidis spirat regionibus; apud Belgas minùs graueolens.

Nascitur in Cappadocia & Galatia, vt Dioscorides: et in Hispania quoq; plerisque desertis ac incultis locis.

DE ANDROSÆMO, HYPERICO, ASCY-
RO, & Ruta syluestri.

CAP. XII.

QUATVOR sunt herbae apud Dioscoridem, quæ Androsæma vel cognominantur vel appellantur: Hypericon, Ascyron, Ruta syluestris Hyperico similis, & propriè appellatur Androsæmum.

Hypericon.

Hypericon vulgò cognitū est, pedalis altitudinis surculosa & ramosa stirps: foliis latiusculis, rotundis longioribus, quæ soli aut lumini obiecta, foraminosa apparent: luteis flosculis: siliquis oblongis, ferma & magnitudine grani hordeacci. folia & flores triti atro sanguini haud absimilem succum fundūt, quapropter Androsæmum cognominatur. vulgò Perforatam appellant.

Ascyron.

Ascyron Hyperico altius attollitur. folia eius maiora, candida, non foraminosa. flos & semen veluti Hyperico. siliquæ exiguis nigris punctulis resperguntur. manant & huius folia floresq; triti, sanguineo succo; vnde & Androsæmum.

Ruta syluestris.

Syluestris Ruta, à graueolente Ruta & Harmala differens, Perforatae sive Hyperico similis est, virore tamen saturato nigricans, mollior, ac lanuginis in foliis nonnihil habens, reddit & hæc sanguinis amulum succum; atque idcirco Androsæmum quoque.

Huius Rutæ descriptio in prioribus reperitur Dioscoridis exemplaribus lib. 111. in posterioribus verò, inter notha.



Hypericum perforatum, L.
Doubt. Pers. 96

Hypericum androsaemon, L.
 Dod. pempt. 78.



Non videtur autem de hac Ruta caput abiciendum. Hypericum enim huius Rutæ describitur foliis; Androsæmum eiusdem triplo aut quadruplo maioribus: longioribus verò Polygonon, Polemonion & Centaurium minus.

Androsæmon propriè dictum Hyperico ac Ascyro maius est. folia eius triplo quadruplòve maiora, initio virentia, postea obscure rubentia; è quibus non crassiori sanguini, sed rubenti ac vermiculo vino similis succus attritu exit; ac, ut Dioscorides ait, ὀνὼδης. flos luteus, maior; cui capitulum succedit, rotundum, primum virens, postea rubens, tandem nigricans. dura ac lignosa radix. Androsæmum.

Dioscorides capitulum huius simile facit calyci Papaveris nigri, cui haud dissimile operculo, quo tegitur, sublato, sed tamen minus. καὶ τὸς ἐκ κάλυκτι, ait, ὁμοίῳ τῷ τῆς μελαίνης μάνκωι &c. Exemplaria pleraque perperam ὁμοίῳ &c. habent. Dioscoridis locus castigatus.

Quod sequitur ὀνὼει κατέχρατος, non pertinet ad Androsæmi, sed ad Rutæ huius sylvestris & Ascyri descriptiones, quorum siliquæ exiguis nigris punctulis notantur.

DE DICTAMNO ET PSEVDODICTAMNO. CAP. XIII.

DICTAMNO rotundiuscula, maiora quàm Pulegij, & spissa lanugine candicante sunt folia: cauliculi tenues in alas nonnullas divisi, in quorum summo, è squamulis cōpactæ dependent veluti spica, maiores crassioresq; quàm Heracleotici Origani, à quibus exigui flosculi exeunt. semen inter squamulas reconditur. Odorata tota est herba. Nasquitur in Creta insula, nec alibi requirendā, nō modo veterum sed & recentiorum est sententia. Dioscorides flore & semine carere contra omnem veritatem scribit. Dioscoridis error.

d 5 florise-

Origanum dictamnus, L.
Ded. p. 281





marubium pseudodictamnus, L.
Ord. Umbell. 281

floriferum esse post Theophrastū testatur Virgilius Aeneidos XII.

Dictamnū genitrix Creta carpit ab Ida,
 Puberibus caulem foliis, & flore comantem
 Purpureo.

- 2 Pseudodictamnū legitimo aliquatenus foliis est simile, quæ & candida lanugine conuēstita promit. flores verò habet in verticillis cauliculos ambientibus, dilutè purpureos. Odor huic nullus, aut perquàm exiguus est.

DE CHAMÆPITYIS.

CAP. XIII.

- I CHAMÆPITYES tres auctore sunt Dioscoride. Prima multis per terram cauliculis quasi repit; folia è singulis geniculis promit oblonga, angusta, in tres partitulas fissa: flosculi ex alis foliorum latei. Tota herba nonnihil hirsuta, odore resinæ piceæ aut larignæ refert.


Dioscorides hanc foliis esse ait Semperuui minoris, tenuioribus, hirsutis, ac pinguioribus. Atque huius quidem foliis non exactè intuenti mox esse apparet. Nam singula foliolorum segmenta, ipsa Semperuui minoris folia satis referunt.

- 2 Altera species cauliculis est crassioribus, quadrangulatis ac geniculatis; ramis recuruis: foliis latis & multipliciter diuisis: dilutè purpureis flosculis, è calycibus veluti Hyoscyami, sed longè minoribus: tenui ac longa radice, adherentibus aliquot fibris. Et hæc hirsuta, subcandicans, & odore piceæ aut pineæ Resinæ, qui Chamapityos speciem hanc esse ostendit. à vero idcirco recesserunt, qui Chamædryn seminam nuncuparunt.

Ramis hanc Dioscorides esse ait ancora in modum recurua-



Chamaepitys *Chamaepitys* I. 1
 Oct. 1846



Cassia crotolaria, L.
Dart. p. 166, 167.



Teucrium botryoides
 Jod. herb. 46

Pseudocheamæpitys, L.
Dist. penob. 47



curuatis. Mirum videtur cur Ancora comparauerit. sed indicare voluit, repandas sibi inuicem oppositas alas, ancora qualemunque speciem exhibere.

Tertia Chamapitys, tenues omnino promit cauliculos, 3
palmares: foliola perquam exigua: flosculos paruos è luteo
pallentes, ad fastigia cauliculorum: radículas similiter mi-
nutas & tenuissimas. canescunt foliola cum ramulis; odor
adest, qualis resina pitijina aut pineæ.

Ad harum genus referenda occurrit, quæ quoddam foliorum Pseudo-
chamapitys appellari meruit. Prima hæc procumbentibus
ac tenuibus pediculis foliisque similis; sed flosculi differunt,
qui candidi sunt. & inuersos Lamij satis referunt, ipsis ta-
men & longiores & patentiores. quaterna coherent inde
semina. radícula mediocris crassitudinis. Ex Hispaniis
anonymos ad nos peruenit. Pseudochamæ-
pitys.

DE THALIETRIS.


CAP. XV.

MULTÆ occurrunt stirpes quæ ad Dioscoridis Thali-
etrum referende putantur. Quarum quintum humile ac
paruum genus; reliqua maiora.

Inter maiora Belgio vernaculum, caulem attollit bipe-
dalem aut altiore, ramosum, striatū, quasi angulosum,
articulus geniculatum, intrinsecus cauum, subinde è puni-
co colore purpurascentem, non raro herbacei coloris. folia
ampla in multas particulas latas, sed tamen oblongiores
diuisa; quarum plurimæ anteriùs duabus ad minus incisuris
denticulatæ. color foliorum saturatior superiùs, inferiùs
dilutior. flores in fastigiis racemosi, exigui, quorum mus-
cosa stamina, è pallido candicant, incanescentem veluti
lanugi-

T. flavum, L.
Dod. pempt. 56





T. minus, L.
Ord. pempt. 58

lanuginem ostentantes. sequuntur valuula triangulares, exigua, in quibus semen. teres, obliqua & lutea radix est, lateq₃ serpens, & plerisque locis germina emittens; stirpē ita multiplicans.

- 2 Huius simile alterum est, sed folio saturatiùs virente, & minore: cauliculo rotundiorē, nullasq₃ strias habente.
- 3 Tertium maius est. caules huius altiores, crassiores, punico non raro colore purpurascētes: folia maiora, latiora, caeruleo colore virentia: lutea flosculorum stamina; radix vt aliorum serpens. gratioris istud odoris quàm reliqua.
- 4 Quarti, flosculi dilutam Viola nigra purpuram reddūt, luteis tamen supereminētib^{us} apicibus; reliquis primum satis refert.

- 5 Quintum genus minimum cauliculos habet tenellos, dodrantales: foliola paruula: flosculos raros, è luteo languescunt quorū stamina. Odor huius gravis quoq₃ est. In maritimis & vicinis nonnullis apud Belgas reperitur locis.

Recentior etas huius generis herbam Pigamum, quasi πῖγαρον, vnā cum officinis quibusdam nominat: nonnulli Pseudorhabarbarum et Rhabarbarum monachorum etiā vocant; à luteo fortè radice colore. Cum neutro antē conuenit. Legitimum verò & Thalietrum esse, nondum satis quoq₃ definitum.

DE CRITHMI GENERIBVS.

CAP. XVI.

CRITHMI siue Crithami aliquot genera posteritas obseruauit.

- I Vnum, quod à multis Creta marina, folia habet numerosa, pingua, crassa, in plura diuisa; quorum singularia Portulaca minoris foliis longiora: caulem dodrantalē: umbellae



Echinophora ^{6 3} *chinosa*, L.
 prod. pamph. 1785



Gnaphalium crithmoides, L.

Bot. Beech. 506

bellas in summo : flores in his candidos.

Huic similis est *Cribrinus spinosus*, genus alterum, nisi ² quòd folia eius angustiora & mucronata, in acutas & pungentes fastigientur spinas. semen etiam maius est, & nonnullis spinis confutum.

Tertius *Cribrinus* longiores ramulos & cōplures emit- ³ tit, foliis circumdatos multis, dissectis, crassioribus quàm *Abrotani*, è quorum cacumine flos exit *Chrysanthemi a-* *mulus*, & medio videlicet disco, & orbiculato ambitu lu- *teus*.

Matthiolus huic similem & tertium quendam (si non idem est) exhibet quoque, sed flore (quantum icon ostendit) differentem, quem scribit in cacumine orbiculatum, villosum, & pallidum.


DE CARLINA SIVE CARDOPATIO.

CAP. XVII.

CARLINÆ siue *Cardopatij* duæ species. Vna humilis & absq; caule: altera caulem promit. Vtriusq; florē candidum videre contigit, Gesnerius purpureum reperiri scribit, quod & Franciscani fratres testantur.

Humili folia sunt spinosa & oblonga; inter quæ medius ¹ emicat orbiculatus flos, amplius, magnus, exteriore parte instar echini castanea valde spinosus; superius planus & latè patens, cuius medium multis capillaceis staminibus fartū, oblonga, angusta ambiunt foliola, candida aut purpurea. sereno hic explicatur calo, nubilo verò & per noctē veluti se recludens contrahitur. radix huius oblonga & mediocris crassitudinis.

Alteræ species folia similiter valdè habet spinosa non ra- ² *to asperiora*: caulem dodrantalem aut altiore: florem in



Carlina acanthus, L.
Det. Hook. 227

capitulo vti prioris, sed minorem multò: radicem digitalis ferè crassitudinis odoratam & vt plurimum rimosam.

De vtriusq; nomine inter recentiores non satis conuenit. Sunt qui velint priorem Chamaleonem album esse; alterum vero Chamaleonem nigrum: alij vtrunq; à Chamaleonibus differre asserunt.

Chamaleonem autem album Dioscorides folia habere Scolymosimilia ait: caulem non promere: è medio spinas erigere echini marini aut Cinaræ modo: flores edere purpureos veluti pilos papposos: semē Cnici: radicem interiùs albam, aliquatenus aromaticam, grauis odoris & dulcem, circa quam viscum reperitur.

Chamæleon albus.

Nigrum verò Chamaleonem, idem inquit, folijs quoq; esse Scolymi, sed minoribus, tenuioribus, ac rubro distinctis: caule dodrantali, digitalis crassitudinis, subrubente; et ἰκτιάδου suæ umbellâ habere, in eaq; florem tenuē Hyacinthi amulum, versicolore: radicem verò crassam, nigram, densam, interdum exesam, quæ dissecta sublutea sit, & manducata mordeat.

Chamæleon niger.

Et cum Chamaleone quidem albo Carlina humilis conuenire posse appareret, si fructus aut capitulum responderet. Caule siquidem & folijs spinosa, sed fructus non est veluti Cinaræ. Pini conum siquidem Cinaræ capitulum refert, ex squamis multis fastigio acuminatis ac spinosis coactus, quale non est Carlinae. Neque enim satis est, quòd caule careat; aut quòd viscum ferat; sed reliquas etiâ adesse notas refert. Nam vt Franciscani fratres tradunt, plures Carduorum species reperiuntur caule vidua: possunt & alia viscum ac gummi præbere. Plinius lib. XXI. cap. xvi. Ixinem raram visu & radice foliosam esse inquit, ex qua medium veluti malum extuberat.

Est autem Ixine Chamaleon albus. Exemplaria Hel-

Plinij locus re-
finitus.

xine perperam habent. Idem de Carlina altera dicendum. tametsi enim folia sortè habeat Scolymi, & caulē dodran-
talem; cū tamen flos non sit hyacintini, id est, cerulei
coloris; desideratis & aliis, Chamaleon niger dici non po-
rest.

Accedit nostra sententia in lib. Singularium suorū pri-
mo, diligentissimus Petrus Bellonius, qui ambas Carlinas
à Chamaleonibus differre ostendit; & vtrumque Cham-
leonem Italia, Germaniæ, & Galliæ incognitum esse scri-
bit. Albi Chamaleonis radicem perquam crassam esse ait,
et pedalis aut cubitalis longitudinis, multumq; odoratam,
atque ex ea lachrymam manare: Chamaleonis verò nigri
florem esse pulcherrimi cerulei ac planè celestis coloris,
quem Dioscorides ὀφειλίζοντα appellat, ab Hyacintho nō
scripto, qui creberrimè ceruleus est.

ὀφειλίζοντα
color.


DE CARDVO SPHÆROCEPHALO.

CAP. XVIII.

SPHÆROCEPHALI Cardui reperiuntur com-
plures.

- I Vnus satis vulgaris est. Fuchsius olim Chamaleonem
nigrum, sed postea rectius sentiens Spinam peregrinam
hanc nuncupavit. caule est præalto: foliis laciniosis ma-
gnis, longis, latis, profundius incisis, superiore parte viren-
tioribus, inferiore verò candidioribus. flosculi è globoso &
absolutæ rotunditatis capitulo in cauliculorum fastigiis ex-
eunt candidi, exigui, stamine in medio ceruleo: semen ob-
longum, nonnihil hirsutum: mediocris longitudinis, crassa
& ramosa radix.

- 2 Acutus Sphærocephalus folia habet minora at spinosio-
ra;



Echinops spinosus, L.
Bot. Franc. 722

ra; capitula quoq₃ globata; sed è quibus longa quedam, & dura eminent spina.

3 Tercius primo forma figuraq₃ similis, sed longè minor, & eius flosculi ad ceruleum magis accedunt colorem.

4 Minimus est quartus, foliisq₃ acutissimis ac spinosissimis. capitulo exiguo, cuius flosculi vt primi candicant.

5 Referri huc & alius quidam posse videtur, sed tamen capitulo minùs globato; compressiore videlicet ac superius latiore; è quo flosculi carulei. tenuis huic caulis, exili lanugine candicat: folia oblonga, vtring₃ similiter laciniatim diuisa, ad singulos angulos spinis munita. Hunc pleriq₃ esse volunt, quem Matthiolus pro Spina alba proponit.

DE CARDVO ERIOCEPHALO.

CAP. XIX.

ERIOCEPHALVS Carduus caulibus assurgit crassus & altis. folia eius laciniosa, magna. spinosa, pro-na parte candidiora: capitula rotunda multa, tenui, candida molliq₃ lanugine cōuestiuntur; emicantibus vndequaq₃ exiguis pungentibus aculeis; superius verò stamineis purpureis floribus. semen splendens & oblongius, vti multis Carduis.

Aliunde in Belgium hic venit. fertur complurimis Hispania incultis locis reperiri, sed tamen breuior ac humilior ac minor, quàm in Germania inferioris hortis; in quibus luxurians, alior atque omnino amplior nascitur.

Eriocephalus, à capitulo lanoso, alio destitutus nomine, appellatur.



Carduus eriocephalus, L.
Bot. Beech. 720



O. Onopordion, L.
Bot. praecl. 338

DE CARDVO QVEM ONO-
PORDON APPELLANT.

CAP. XX.

INTER omnes spinas & carduos spinosissimus hic est. caules eius præalti; adnatus & à foliis demissis membranæ angulosi apparent. folia vtriusq; profundè laciniosa, multis horrent spinis. capitula spinosissima ex squamis multo compacta; è quibus flores purpurei, veluti alii. radix ferè recta, sed non altè descendit.

Peregrinus & iste Carduus Belgio est. Onopordon barbari appellant: Plinii tamen esse Onopordon affirmari nequit. Nihil enim apud eum de Onopordi forma.

Fortassis etiam Acanos est, quem Bellonius omnium carduorum spinosissimum refert: & in Creta hac ætate Aconachian vocari.

Pauca autem de Acano à veteribus prodita extant: pauciora verò etiã de Onopordo. Certius est Acanon spinam esse, quàm Onopordon.


DE CARDVO STELLATO ET
SPINA SOLSTITIALI.

CAP. XXI.

STELLATUS Carduus, tamen si Carduus appellatus, nusquam tamen spinas, quàm in solis capitulis gerit. folia eius initio oblonga, dodrantalia, molli lanugine hirsuta, secundum margines grandibus incisuris lacinosæ; inter quæ cauliculi cubitales in alas quàm plurimas diuisi; fastigiantibus oblongis, haud magnis, numerosis capitulis, quæ longæ, acutæ durissimæq; spina, in modum radiantis stella



Centaurea calcitrapa, L.
Dietl. plant. 333



Centaurea solstitialis, L.
ord. Pennf. 734

stellæ ambiunt. flosculi purpurei: proluxa radix & tenuis est. Exit passim in Zelandiis, & aliis maritimis; circa Antuerpiam frequens. reperitur & in Germania, Italia, ac alibi.

Nonnulli Stellariam vocant: Cordus Polyacantham. sed tamen *πλωάκη* sive *πλωάκη* Theophrasti (Gaza aculeosam reddit) sortasus ab hac differt. Falluntur autē, qui Eryngium aut aliquam eius speciem esse autumant.

- 2 Spina solstitialis, Cardui stellati, altera quadam species esse videtur. Neque enim alibi, quàm circa capitulum spinosus est; & spina eius stellatim quoque digeruntur: caules eius cubitales in ramulos pauciores quàm stellati diuiduntur; membranaceas appendices habent; quibus quadrangulares apparent. folia longiuscula: flos luteus: semen exiguum.


Iuxta Monspelim Gesnerus refert vulgarem esse. Solstitialis cognominatur quod solstitio æstivo floreat; eodem auctore.

DE CIRSIO.

CAP. XXII.

Ex Carduorum & Spinarum etiam numero Cirsion est. folia eius oblonga, lactuca quasi similia, verum acuminata, & per circumsistentiam aculeata, candidiora vulgaris Buglossi: caules recti, bicubitales, in alas nonnullas discreti; in quorum singulis capitulum eminet hispidum, quod post florum vigorem deorsum reflexum nutat, tandemq; in papposam lanuginem resolvitur. flos purpureo rubet colore: semen splendet aliorum Carduorum instar. In hortos aliunde illatum est. fertur aliubi in maritimis exire.

Similes huic & nonnulla alia; quæ ad Cirsij genus non ineptè



f 2

Cirsium monspessulanum, Spr.
 Dorr. & Comp. 237

- 1 ineptè referri posse videtur. Vna foliis est Cirsio nigrioribus, per circumferentiam altius serratis; floribus purpureis: capitulo Cirsij, quod etiam aliquantulum reflectitur. Alior hæc spina est, & caules eius membranaceis appendicibus angulosi.
- 2 Altera foliis est spinosioribus: flosculis concoloribus, sed tribus quatuorve unitis, quorum minora capitula non reflectuntur. Hanc pro Cirsio Matthiolus depinxisse videtur.
- 3 Tertia tota sua stirpe magis spinosa est. folia profundis incisuris secta, durissimis & acutissimis spinis horrent; colore virentia, medio tamen candicante nervo. capitula nutant quoq; flosculi purpurei: caules crassi, membranacei, & angulosi. Fertur hæc in Zelandiis, Flandria, ac Hollandia, locis reperiri haud procul à mari.

Florent omnes hæc spina mensibus æstivis.

DE ABSINTHIO ANGVSTIFOLIO.

CAP. XXIII.

ANGVSTIFOLIVM Absinthium, ex Absinthio & Lauendula confusis, miscellanea quedam stirps videtur. Cauliculi eius lignosi teretes vt Absinthij; flores similes, atq; eodem quidem ordine, sed minores. folia verò oblonga, incana, qualia Lauendula odoris haud est ingrati; Lauendulam obscure referens. Pleriq; Absinthium Santonicum esse volunt.

Est autem Santonicum, siue, vt exemplaria Dioscoridis habent, *σποδώνιον*, simile Absinthio, sed seminis non adeò fecundum, subamarum & Seriphij facultate. At tale nequaquam istud est, quod Absinthij formam nequaquam refert. & seminis est copiosissimi.



f 3

Artemisia coerulescens, L.
Doubt. - *fruticosa*, 26

Catananche coccinea, L.
Dord. Kemp. 638




DE SPECIE QVADAM CHONDRILLAE.
CAP. XXIIII.

CHONDRILLAE hac à nobis appellata species, foliis oblonga & aliquantulum aspera promit, adnatis veluti exiguis alis ramosa, Cornu cerui dicta herba, quam Coronopum vocant, satis similia; & eodem quo illius serè modo, per humum decumbentia, tamen aliquanto maiora ac longiora; inter quæ cauliculi tenues; culminantibus in summo capitulis; ex parvis candidantibus, & argenteo propemodum fulgore splendentibus, squamis compacti, flosculi è quibus prodeunt multiplices, Cichoriij amuli, colore pulchrè ceruleo. tenuis & oblonga radix. Effluit è vulneratis caulibus & radice liquor lactei candoris.

Sesamoides minus nonnullis esse videtur. Parum tamò cum Sesamoides conuenit. Sesamoides vtrung, ab aliqua cum Sesamo similitudine nomē habet: ista verò herba nullam refert. Nos ad Chondrilla genera citius referendam existimauimus.

Flores etenim habet forma & colore Cichoriij: liquorē qualem Chondrilla. Non tamen ea de causa vna eorū est quæ à Dioscoride describuntur, sed ipsis affinis. Neque enim alienam plures vnius herba species esse, quàm à Dioscoride referantur. Quotidianam siquidem ostendit observatio, herbarum multarum genera multo plura reperiri, quàm veteribus cognita fuerint.

Quòd si autem hanc herbam Matthiolus pro Sesamoides minori depingit, iconem eius non bene pictor expressit. absq, enim floribus, sola exhibentur capitula.



Erigeron peludo, L.
Bot. pentz. 641

DE ERIGERI SIVE SENECTIONIS
SPECIE QUADAM.

CAP. XXV.

EST hac herba inter Erigeri species, tum etiam Cichoraceorum siue Intubaceorum numero reponēda. differt tamen ab utroq, Erigero, maiore scilicet ac minore, foliis maioribus, profundius incis, & ad Cichorij accedentibus. caules eius ramosi, pedales, comanibus in summo floribus luteis, qui citissime & canescunt & in pappos abeunt, veluti Erigeri: radix crassior, cetera Erigero qualis. foetet herba nonnihil: vnde Cichorium foetidum à plerisq, vocatur.

Theophrastus lib. VII. Aphaces non modo leguminis, Aphace olus. sed & herba meminit, cui hac Erigeri species perquam similis. Nam ut Theophrastus, Aphace herba ex olerum et Cichoraceorum est numero, ingustabilis, & amara: festinanter floret; sed celerius flos senescit atq, lanugine papposa marcescit. Talis quidem hac Erigeri species. Sed addit Theophrastus tota Hyeme totoq, Vere florere. Huius autē flores Aestate tantum vidimus, inclementioris calis nostri fortassis occasione. Potest in nativo ac patrio solo diutius florere.

DE ALTHAEA HORTENSI.

CAP. XXVI.

CAULES huic crassi sunt & rotundi: solia mollia, albicantia, veluti Althaeae; flores magni, quinque foliorum, Malva hortensis similes, diutē in rubro purpurei, aut ex albedo purpurascētes, stamine medio. fructus haudquam ut aliarum malvarum, sed tuberosus, rotunda ferē

Althaea palustris, L.
Dord. French. 685



ac globosa quinquangulari tamen specie. Fuerunt qui Sida. *Sida*.
dam nuncuparent. *Sida* autem, ut Theophrastus ait, palu-
stris est planta, ab hac non parum differens. Neque est, ut
alii volunt, *Abutilon* Auicēne. folia siquidem *Abutilo* sub-
rotunda, acuminata, Cucurbitae similia: flores exigui, lutei: *Abutilon*.
fructus rotundi, nigri, crassi, veluti plicas multas habētes,
aut veluti ex multis siliquis exiguis coherentes. Mat-
thioli pictor ex isto *Abutilo* & *Althea* hac hortensi, mon-
struosam & deprauatam effinxisse videtur imaginem, lib.
III. cap. CXLVI, utramq; confundens.

DE ALCEA VESICARIA.

CAP. XXVII.

D I F F E R T hac *Alcea* à *Dioscoridis Alcea*. cauliculis exit ramosis, facile collabentibus: foliis altis incisuris fissis, laeuore, splendore, ac colore, tum & quadantenus forma ad summi *Acanthi* accedentibus, sed tamen minoribus multò. flores pulchri, circa margines subalbidi, interius umbilicum versus nigricant, stamine aurei coloris medio. aperiuntur hi tribus aut quatuor horis post Solis exortum: hora una aut sesquihora vigent. post florem folliculus relinquitur patens, in quo capitulum rotundo oblongius, hirsutum, semine intus paruo, & nigricante.

In *Atrebatum* & *Morinorum* finibus iuxta agrorum margines reperiri fertur. *Italiae* etiam cognitum est. stirps est annua.

Alcea vesicaria haud perperam dici potest. Pleriq; *Alceam* nuncupant Venetam: alij *Maluam* Theophrasti. Sed Theophrasti *Malua* à vulgari haudquaquā differt. Matthiolus pro *Hypecoo* depingere videtur; cum quo nihil habet vel similitudinis vel affinitatis. *Hypecoon* siquidem fo-
lis

Urtica Tricoma, L.
Det. Penn. 657



lis est Ruta. huius verò longè ab hac dissident. Quod non modo nasutis videtur; sed omnibus non cecutientibus manifestum.

DE PSEUDOCAPSICO.

CAP. XXVIII.

PSEUDOCAPSICON à similitudine Capsici nomen accepit, altius tamen ac fruticosius est, & vita diuturnioris. potest siquidem pluribus. superesse annis, si hybernis mensibus à frigore muniatur. Caules eius quandoq, bicubitales, lignosi, ramosi; folia oblonga: flores candidi: fructus rotundus, rubens, dilutiùs tamè quàm Capsici: semen planum, nullius aut exigui gustus.

Sunt qui Solanum rubrum aut Solanum lignosum esse velint. Sed Solani non est species. Hispani Guindas de las Indias appellant.

DE MOLVCCIS.

CAP. XXIX.

MOLVCCAE duæ sunt; *Levis una*, *Spinosa altera*.

Levis Molucca caules facit complures cubitales, circa quos folia multa, ambitu profundis incisuris crenata; supra quæ flores orbiculatim, ex amplis, et patentibus acetabulis exeunt, colore candidulo, Lamij floribus similes, attamen paulo minores.


Spinosa Molucca caules similiter multos & cubitales promit, eosq, striatos & quadrangulares: folia vii prioris: flores similes, ex acetabulis quoq, sed angustioribus, oblongio-

Solanum pseudocapsici Cass., L.
Dud. plant. D. 1 p.





Molycaea laevis, L.
Oud. h. n. p. 92



Molyccella spinosa,
Prod. - pempt. - 92.

longioribusq; & eminentes duras & acriter pungentes spinas ambitu habentibus.

A Moluccis Orientis insulis utraq; nomē habet: in quibus primum reperta creduntur. Matthiolus (nisi nos pictura fallat) leuam Moluccam, Constantinopolitanum Melissophyllon appellat.

DE MOLY THEOPHRASTI, ET ALTERO Moly quod Indicum cognominatur.

CAP. XXX.

MOLY, quod recētior aetas ad Theophrastum refert, folia habet longa, lata, pingua, laeua, multo quā Porri maiora: caulem verò rectum, crassum, rotundum, glabrū, cubito altiore: culminantem umbellam latam, veluti palustris Gladioli, in Frumentorum historia nostra descripti; purpurei in qua flosculi, & capitula inde exigua triangularia. bulbus Cepae instar pro radice. Tota herba speciem cepacci generis praese fert; odorem tamen nullum, aut perquam exiguum spirat. Intra folia in breui quodā pediculo, globosum quoddam exiguum exilit, eiusdem cū foliis coloris.


Quibus terris sponte gignatur nondum accepimus: Belgis hortense est.

De Moly autem hac Theophrastus: Moly apud Phenaeum exit, atq; apud Cyllenam esse, quemadmodum Homerus dixit, affirmant: radice rotunda, Cepae quodammodo simili: folio Scillae simili esse: usum eius contra venesicilia: non tamen effodi difficulter; ut Homerus ait.

Indicum Moly, bulbum, folia, atq; è sinu eorum sphaerulam, caulemq; prioris similia habet; in fastigio tamen non umbellam floriferam, sed veluti capitulum aliquanto
g
latioris,

Allium magilum, L.
Dod. pempt. 685





latioris, quàm globosa forma, tenui contextum membrana, in quo fructus (nullo apparente flore) gignuntur, nucleis aut exiguis bulbis similes; qui terræ commissi, in maiores bulbos adulti, solia caulesq; faciunt. Eiusdem cum priore generis esse videtur. Ex India fertur allatum: atq; inde Indico cognomen: Caucason pleriq; vocitant.

DE BULBO ERIOPHORO.

CAP. XXXI.

AD Bulborum genera referendus est quoque Bulbus Eriophorus, quem quidem subinde vidimus in amplissimo ac ditissimo horto generosi viri Ioannis Brancionis, sed nunquam tamen floriferum. Bulbus erat qualis Ceparum ex tunicis compluribus commissus; inter quas lenta quadam veluti lanugo reperitur.

Iconem hîc exhibitam ad nos Patânio misit amplissimus et multa laude dignissimus vir Iacobus Antonius Cortusus, de nobis & vniuersa re simplicium optimè meritis; quâ vt accepimus, in nullo mutatam aut mutilatam exprimendam curauimus.



Lanaria plumosa,
Pod. purp. 692



Iris pinnatifida
Bot. Beech. 1893





Fritillaria imperialis, L.
Comp. Ord. pent. 202.

DE FLORE TIGRIDIS, NASTURTIO
Indico, & Corona imperiali.
CAP. XXXII.

TRIVM harum icones tantum nobis videre contigit, sed coloribus suis expressas. Europe peregrinae sunt. Priores duas America, quam Occidentalem Indiam vocant; posteriorem Oriens gignit.

Virent primae oblonga, angusta, et acuminata folia: flos plurima parte luteus, rubentibus tamen quamplurimis exiguis maculis variegatur. Stylus medius diluto rubet purpureo. bulbus subnigricat. Tigridis flos appellatur.


Altera icon speciem exhibet conuoluuli. folia eius lata, angulosa, & pulchrè depinguntur virentia. flos luteus retrò propendens habet corniculum instar floris Regij, què Delphynium appellant. Nasturtij Indici nomine hanc accepimus.

Tertia Lilij sylvestris species est. folia & caules sunt sylvestris Lilij: flores rubentes, pistillo in medio candido. Corona dicitur imperialis: à nonnullis Pennachi del Persiano, siue Liliū ex Persia. affirmant tamen alij Pennachi del Persiano à Corona differre imperiali.

Hanc autem acceptam debemus clarissimo ac doctissimo viro D. Alfonso Pancio. Priores D. Ioannis Boisorii benivolentia nacti sumus.

DE RORE SOLIS.
CAP. XXXIII.

DE hac herba in ista Appendice non fuissē scripturus, nisi quæ de huius facultatibus explorata mihi, communicare, ex re & laborantium & medicantium futurū



Dioscorea rotundifolia, L.
 225

indicassent. Neq₃ enim talis, qualis credita eius est facultas ac potentia.

Existimant recentiores phthificis eam ac tabidis omnibus vtilem; & præsertim stillitium eius liquorem. Vellunt enim humoris rorisq₃ tenacissima, quem ardentissimus etiam Solis fervor ipsa meridie absumere nequit: ita naturam generalemq₃ in hominum corporibus humorem conservari ac foveri hæc herba posse creditum fuit. Auxit opinionem, quòd huius pastu quadrupedes fœmina ad Venenum incitentur. Decipiuntur autem non parum, qui ita sentiunt.

Caustica siquidem & exurēs eius facultas est ac potentia. Cuicunque enim corporis particule trita siue sola siue cum momento salis imposita fuerit, mox vesicam excitans partem exulcerat.

Videant nunc qui hanc commendant, & phthificis vtilem rentur, quantum à vero aberrant. Fieri enim nequit, ut tutò intra corpus sumatur, quæ foris imposita exulcerandi vrendiq₃ vim exerit.

Est autem hæc herba parva quidem ac humilis: foliola habet in tenuibus oblongisq₃ pediculis pauca, exigua, rotunda, aliquantulum & instar auris scalpj concava, hirsuta atque rubertia, aridissimis temporibus subq₃ ferventissimo Solis aestu, rore humoreq₃ mendentia. (unde Roris Solis nomen accepit.) coliculi inter hæc exeunt quadratales aut minores, in quibus flosculi candiduli, tenuissime & capillacea radícula.

Exit locis desertis, arenosis, sed riguis, & nō raro in ipso humi nascente musco; cuius speciebus annumerandus.

Potentia, ut diximus, acris & erodens, ad quartum caliditatis & siccitatis gradum accedens.

ALTERA APPENDIX

CIS PARS:

In qua aliquot umbelliferarum icones, cum
suis succinctis descriptionibus.

DE AMMI.

CAP. I.



V LGARE Ammi cubitali aut proceriore
altitudine assurgit: alas è caule rotundo spar-
git: folia è pluribus constant oblongis ambitu
serratis. flosculi in umbellis candidi. semen cū
acrimonia quadam amaricat, oblongum, cumino minus.

Vtuntur isto passim officina. Sunt tamen qui reiiciant,
ac aliud pro legitimo ostendant. Quod & olim à nobis pro
exiguo aut paruo Ammi depictum fuit.

Ammi alterum.

Est autem herba exigua, tenui ac breui cauliculo; foliis
oblongis creberrimis incisuris tenuissimè dissectis, & sur-
sum versus magis attenuatis. flores in exiguis umbellis
candiduli. semen minutissimum acre ac feruidum. Prae-
stantius istud habetur, sed tamen vulgare non reiiciendū,
quod etiam acre & cumino simile.

DE MEO.

CAP. II.

M E O folia sunt virentia, multiplicatis sectionibus
Feniculi tenuiora, teneriora, angustioraq; : cauliculi gra-
ciles, cubitales; in quorū fastigium umbelle, & flosculi can-
didi; semenq; angulosum cumino maius, odoratum & cū
acri-



ammi majus, L.
dist. pent. 301

Aethananta meum, L.
Ord. Comp. 305



acrimonia amaricans. radices dodrantes in plures partes in obliquum & altum dimaricata; foris nigricantes, interius candidiores; acri sapore linguam vellicantes; odore cum suauitate graui.

Nascitur pluribus Italia, vtriusq; Germania, Hispania & Gallia locis. Imposuit multis Plinius, Meum scribens non nasci in Italia, & à medicis, in q; paucis, feri, lib. xx. cap. xxiii. hinc etenim creditum fuit Italia peregrinū, ac diuinè, tametsi familiare & frequens, pro quouis alio citius habitum, quàm pro Meo agnitum. Vnus Daucum Creticum; alius Seseli Creticū. siue Tordylion; quidam etiā Libanotidis speciem credidit; quod tamen verū est Meum. Ruellius Anethum ait appellari sylvestre, et Anethum tortuosum. Germanis est Beerwurt; Hispanis pleriq; locis Sistra; Belgij officinis Fœniculus porcinus. Aliis Peucedanos dicitur Fœniculus porcinus.

DE PEUCEDANO.


CAP. III.


PEUCEDANO folia & à radice & secus cauliculos ampla, in multas minutissimas partes diducta, quarum singula angustum ac oblongum Pini amulantur folium: (vnde *πικρὸν δένδρον* nomen.) caules tenues, rotundi, virentes, geniculati; flosculi in umbellis exigui sublutci: semen longiusculum: foris nigricans radix, interius albicans, alba, luteum vulnerata succum reddens.

Nascitur montosis, & non nullibi densioribus; alibi longioribus aut rarioribus foliorum sectionibus.

Latinis Pinastellum dicitur; ex quo, quod alibi monuimus, *πικρὸν* Latinis Pinum dici etiam apparet: à nonnullis Fœniculus porcinus, ut diximus.

P. officinale, L.
Dich. p. 313





Seseli *fruticosum*, L.
 800. - *fruticosum*. 312



Seseli æthiopicum, Lam.
Prod. p. 312

DE SESELI ÆTHIOPICO.

CAP. IIIII.

SESELEOS genera apud Dioscoridem, & prater quidem Tordylion, quod Sefeli Creticum appellatur, tria sunt. Massiliense videlicet; Æthiopicum, & Peloponnesense. De Massiliensi autem & Peloponnesensi nihil modo.


Æthiopiici tantum, & quidem utriusq; icones exprimi curavimus, fruticantis scilicet & herbacei.

Fruticans Æthiopicum Sefeli caules. promit lignosos ¹ viuaces, mediocris longitudinis, subnigricantes, interdum subrubentes, cubitales alas emittentes. foliis vestitur laevibus, longis, mediocris latitudinis, dilute & ex albedo virentibus, Hedera longioribus, ad Periclymeni Germanici accedentibus. umbellæ luteos ferant flosculos: semina autem ² maiora quam Fœniculi. radix longa est. Nasci fertur in Gallia Narbonensi haud procul à Massilia: unde Massiliense nonnullis visum.

Herbaceum cum superiore nihil habet similitudinis, caulibus ² nequaquam lignosis, aut vestibilis, sed Hyeme intercidit: folia amplius, palustris Apij modo, quibus etiam maiora, ex multis latis, forma hederaceis, sed ambitu serratis, coherent: flores in umbellis candidi: semen cādicantibus membranis angulosum: radix alba & alta.

Depinxere istud pro legitimo Æthiopico Fuchsius, Tragus, & Matthioli; sed verum fruticans solum est.

Herbaceum ad Theophrasti Libanotidem citius referendum. Sed scrupulum tamen $\alpha\lambda\chi\epsilon\iota\varsigma$ siue $\alpha\lambda\chi\epsilon\iota\varsigma$ Libanotidis fructus adfert, longè quàm huius herba semen maior; quem quidem Libanotis Dioscoridis gignit. Sed differens hac à Theophrasti est Libanotide: Dioscoridis folio est Fœniculi simili: Theophrasti verd Libanotidis $\sigma\alpha\lambda\iota\omega\iota\varsigma\ \alpha\lambda\epsilon\iota\omega\iota\varsigma$, i. palustri Apio, multo maiora sunt.



Laserpitium Siler, Willd.
Ord. pempt. 310

DE SILERE MONTANO.

CAP. V.

SILER montanum foliis est similiter amplis & multipliciter dissectis, quorum tria segmenta ab vno dependentia pediculo, foliorum Trifolij aut Meliloti speciem ostentant, ipsis tamen angustiora ac molliora. caulis tenuis, sed crassior ac procerior quam Anethi. flores subcandidi. semē crassum, sordido cumini colore subnigricans, quo maius ac acrius, ipsum alioqui respiciens.

In Liguria montibus gignitur. Pro Seseli Massiliensi à non paucus habitum fuit. Placet magis Ligusticum esse. folia enim, ut ostendimus, ad Meliloti accedunt: semen quàm Fœniculi maius est.

DE VVLGARI LEVISTICO,

CAP. VI.

QVOD passim Leuisticum, quasi Ligusticum, vocatur, à Silere montano differens est. proceri ac geniculati eius caules, in alas diffusi, interius inanes: folia in plures lacinias diuisa, leuia, resplendentia, ex luteo, veluti & ipsi caules, virentia: flores lutei: semen nigricans: grandis, carnosus & restibilis radix. Tota stirps grato & aroma redolente odore est, sed semen graueolentius.

Ad Panacis genera nonnulli referre student, sed temerè. Hipposelinon etiam non est. A Smyrniomultum quoque differt.



Ligusticum Levisticum, L.
Ord. pent. 311



64

Laser. Tivina chinensis,
ord. pent. 309

DE PANACIS QVADAM SPECIE,
atque de omni Panace.

CAP. VII.

PEREGRINA hæc stirps foliis est amplius, multiplicibus, nonnihil hirsutis & asperis; quorum singulares particula Lappathi amulantur, sed tamen minora. caulis duorum, trium aut quatuor cubitorum: flores in umbellis lutei: semen planum, latum, & sufflanum. longa & candida radix. Panacis hanc esse speciem, semen demonstrat, in Panacis lachryma repertum, ex quo Petro Coudenbergo Antuerpiensi diligentissimo pharmacopœo primum enata stirps est.

Panaces autem, auctore Theophrasto, multiplex est. Quoddam in Syria nascitur: deinde & alia tria, Chironium, Heracium, & Asclepium; quæ à Dioscoride sola describuntur. Præter hæc verò & unum est πατύσλλον, & alterum λεπιδέσλλον. Ita in vniuersum apud Theophrastum sex Panacis species.

Cum primo istorum, aut cum Chironio conuenire præsens posse apparet: cum reliquis verò minimè. Heracium siquidem soko est amplo, ad ficulnea accedente. Asclepium verò Thapsia, aut, ut Dioscorides, Fœniculi. Panaces latifolium Centaurium esse magnum: & tenuisfolium Centaurium minus non temerè putatur. Teste siquidem Plinio, Panaces à Chirone repertum Centaurium cognominatur. Quodnam verò ex reliquis duobus, certò affirmari etiam nequit.

Syriacum Panaces à Theophrasto nō describitur. Plinius lib. xii. cap. xxvi. foliis illud esse ait ampla magnitudine rotundis. Sed suspicio est, hæc ex Heraclij Panacis descriptione translata. Lib. enim xxv. cap. iiii. Heracleoticum

cleoticum Origanum pro Panace Heraclio perpetan: sup-
posuit.

Chironium Panaces Theophrasti et Plinij exemplaria
folio habent esse Lapathi: Dioscoridis verò & interpretis
Nicandri Amaraci. Expende Lector, vira magis veniat
probanda lectio. Si Chironium folio est Lapathi, poteris
presens Chironium esse: sed si Amaraci, nequaquam. Re-
linquitur vt Syriacum, vel omnino alterius sit generis. Ef-
fundit autem lachrynam, aestiuis mensibus Sole feruente,
vulnerato caule. Id Syriacum facere Plinius apertè scri-
bit: Theophrastus innuit. Chironium lachrynam facere,
nusquam reperitur.

Est autem huius stirpis lachryma Opopanaci, qui in of-
ficinis habetur, colore similis, sed tamē exigui odoris. quod
propter soli calig, frigiditatem accidere potest. In calidis
regionibus omnia odoratiore: in frigidis minùs odorata gi-
gnuntur: testis Theophrastus.

DE SPHONDYLIO.

CAP. VIII.

SPHONDYLIVM vulgare, quod nonnulli Bran-
cam vrsinam vocant, passim nascitur, caule bicubitali, ro-
tundo, subhirsuto: foliis similiter nonnihil hirsutis & aspe-
ris, ex pluribus ac saepenumero quinque coherentibus, per
ambitum, & exiguis & profundioribus incisuris diuisis, fi-
culnea serè referentibus, attamen ipsis minoribus. flores in
ymbellis candidi. semen latum, planum, tenue. radix in
plures distributa candicat.

Huic similis & alia sed rarior ac maior stirps est, cui
plures non rarò caules assurgunt, crassiores altioresq,. so-
lia ex tribus serè composita, maiora & fici foliis similia,



Phondylium spindylum, L.
Bot. t. 307



Sphondylium alternum

ord. umb. 307

aspera nonnihil, atq; vnà cum caulibus hirsuta. flores, semen & radix vt prioris.

Hoc genus non Sphondylium alterum, sed Panaces creditur Heracium. Desideratur tantum floris color, quem Dioscorides luteum esse ait. folia aspera ficulneis respondent: cauli hirsutus: radix multiplex, quale Heracium scribitur esse Panaces.

DE SMYRNIO DIOSCORIDIS.


CAP. IX.

HVIC Smyrnio folia prima, inferiora, ampla sunt & multipliciter dissecta; reliqua verò rotunda, & caules ipsos circumambientia: flosculi lutei in umbellis: rotundum & subnigricans semen quale brassica: foris nigricans, interius candida crassiuscula radix.


Nascitur, vt Dioscorides scribit, in Amano monte.

Appellatur, eodem teste, in Cilicia Petroselinum. Differt ab Hipposelino, quod etiam Smyrnion dicitur.

Et nominatur tamen Hipposelinon, haud improprie Smyrnion. Effluit enim ex eius vulneratis aut sectis radicibus liquor facile concreescens, acri amaroq; sapore Myrrha amulus. Id quod nos non raro obseruauimus erutis & incisis radicibus. Scriptum quoq; id Theophrastus reliquit lib. VII. Ex Smyrnio autem, quod Dioscorides describit, nulla lachryma manat.



Smyrnium *olusatrum*, Lf. *Ind. herb.* 694



Saxifraga magna, L.
Dist. pent. 3 H.



Saxifraga parva
D. C. f. p. 117

DE SAXIFRAGIS.

CAP. X.

SAXIFRAGÆ duæ sunt. Maior vna : altera minor.

I Maior amplitudine foliorū cauliumq; altitudine minorem superat. folia Pastinacæ siue Elaphobosci aliquatenus similia sed nigriora, asperiora, minora. caulis bicubitalis, striatus: candicantes floribus umbellæ. semen quale Apij hortensis. sed gustus feruentior. radix oblonga, teres, candida, sapore acris, saluam commenducata cit.

2 Minor primis ac radicibus proximis foliis priorē amulatur, sunt tamen minora ac teneriora: sed tenuissima circa cauliculos. radicle tenuiores ac minores; sed non minus acres aut saluam cientes.

Sunt hæc duæ stirpes Germania ac Belgio satis familiares. Latum & pingue requirunt solum, alioqui incultum, veluti margines agrorum.

Nomen maiori vulgò Beuernæett: minori Beuernel-le. Vtramq; Saxifragam appellant: nonnulli Bibinellam: Baptista Sardus Pimpinellam. Quam ob causam à plerisque Pimpinella Saxifraga cognominatur. Est enim & alia Pimpinella, quæ & Sanguisorba, & Dioscoridis Sideritis altera.

Sunt etiam, qui Saxifragam Pyrethrum esse existimēt. Sed si ad aliquam Dioscoridis, ad Bunium præsertim quæ minor, referenda videtur. Folia siquidem inferiora Apij hortensis haud ineptam similitudinem præferunt: superiora magis attenuata: flores in umbellis, sed candidi: semen odoratum, magnitudine seminis Hyoscyani ac Apij. Potest verò & omnia, quæ Bunium.



Angelica archangelica
ord. p. 118

DE ANGELICIS.

CAP. XI.

ANGELICARVM vna maior est, quam Hortensium & satiuam non inani: altera Minor syluestris.

1 Satiua procero caule, coq₃ laui, gemculato, atq₃ interius inani assurgit, qui quandoq₃ brachij crassitudinem & humana statura excedit altitudinem. folia amplissima, alio multis, partibusq₃ compluribus, lato ambituq₃ incisus luxurians. umbellæ late sunt; flosculi albi, antes: semina sufflata, lata, plana, membranosa. prægrandis est radix & crassa; fori. mirus, interius candidior, odore grato aroma reholens, ex qua liquor ol. osus, pinguis, sublutem fluit, odoris assimilis; quem & ipsi folia ac caules referunt.

2 Syluestris satiuam emulatur, sed tamen omnibus partibus minor. caules breviores ac tenuiores sunt. folia tamen si ampla, minora tamen ac nigriora. radix tenuior, nõ tamen ni inus oleosa, aut odorata.

Satiua in Belgij quidem hortis, sed alibi spontanea est; ut in Noruegia, et Islindia dicta Septentrionis insula: prægrandi ubi nascitur altitudine, & ab indigenis caule detracto editur cortice, ut ab ipsis accepimus, quos in Islandia peregrinantes, his vesci alterius cibi quandoq₃ coegit inopia. ferunt autem sapidum esse & palato gratum.

Saxæ sine Laserpitij species est, vel ipsum etiam legitimum ac genuinum Laserpitium. Olim enim ab excellentissimo ac clarissimo viro Iacobo Antonio Cortuso, Laserp accepit, odore & colore Angelicae plius succum omnino referens.

Syluestris Angelica passim in vtraque Germaniæ locis reperitur humidioribus, præsertim in syluis aut syluosis.

Vtriusq₃ radix post seminis maturitatē marcescit, quod altero

altero aut raro tertio, ex quo sata est anno accidit. Legenda radix priusquam caulis erumpat : fungosa aliqui & inefficax.

Matthiolus et Gesnerus aquatica etiam cuiusdam Angelice meminere, sed quandoque eam non describere, suspicandum videtur eam hanc esse, quæ Archangelica apud Archangelica. nos dicitur. Est hæc & foliorum amplitudine, satina h. ul inferior, sed tamen singularium frequentia numerosior: in plurima enim folia, huius diducuntur. caulis crassius, geniculatus quoque, valde ramosus, è singulis siquidem articulis tres aut quatuor alas promit; multis idcirco vndeque umbellis cingitur, quarum flores candicant: semen latum, longius, & crassius quam Angelica. alta radix & albida, exigui odoris; maioris tamen, quam folia vel caulis, quæ nullius aut admodum obscuri. Rubent quandoque foliorum pediculi.

DE ASTRANTIA SIVE IMPERATORIA.

CAP. XII.

ASTRANTIÆ lata sunt folia, margine serrata, ut plurimum quæ radicibus proxima præcipue trifolia; non raro verò & numerosiora: cauliculi cubitales, tenues, & geniculati, inferius rubent. muscaria exiguis flosculis candida. semen latum, planum, tenue, anethi instar. oblique serpunt radices, acres, odorata, & succi oleosi plena; foris è punice colore subnigræcantes, interius sufflaue; facili fecunditate stirpem multiplicant. In hortis viuacissima est.

Non modò Astrantiam, sed et Imperatoriam vocitant: nonnulli Ostrutium, quasi Struthion. differt autem multum à Struthio, siue Lanaria herba. Germanis est *Aecker-tourz*; & *Aeckerwoyle*. Feruentis admodum natura

Imperatoria angustifolia, L.
Dord. herb. 320.



radix est. Huius sylvestris species est, quam vulgò *Gerard*, id est, *Gerardi* herbam appellant. solum siquidem, floribus in muscariis candidulis, latè serpentibus radicibus, priorem refert, omnibus tamen minoribus. graueolens herba est, & hortus molesta.

DE SCANDICE.

CAP. XIII.

Ex sylvestrium olerum numero *Scandix* est. folia habet tenuiora quidem, quàm luteæ radicis *Pastinacæ*: latiora verò, crebrius tamen dissecta, nigriora item, minusq; odorata quàm *Cheræfolij*. cauliculus doctantalis: umbellæ angustæ: flosculi candiduli: semen longum in mucronem extenuatum, rostellis aut citius crassis magnisq; acubus simile. perquàm exigua radicle sunt.

Romani, ut inter nothas voces reperitur, *Aculum* ac *Scanariam* appellant. *Acula* autem à semine acum referente aptè dicitur. *Ruellius* sub *Pectinis Veneris* nomine hanc describit. Apud Hispanos alicubi ad forum venalis deferitur, & editur, vulgoq; *Euixones* vocant.

Dioscorides *Scandicem* et crudam & decoctam mandis quoq; ait: stomachoq; & ventri vident.

DE MELANTHIO DAMASCENO.

CAP. XIII.

MELANTHIVM, quod *Damascenum* cognominatur, *Melanthij* siue *Gith spurium* est genus, in plurimis cum legitimo convenit, sed caules eius proceriores sunt ac ramosiores: folia tenuiora crebriusq; diuisa: flos haudquam candidus, sed ceruleo nitens colore, quem quinque



Scandix pecliva, Wedd.
Bot. penins. 301



34

Melanthium damascenum, L.
Bot. Fauna, 304

dissecta stipant folia alba strorum instar. capitulum et semen quale Melanthio, sed odore destitutum semen.

Non est Isopyron, Fa'elo quidem Isopyron simile; & semina habet Melanthij gustu, non forma.

DE VIOLA CALATHIANA, ANNOTATIO.

IN nostra de Floribus historia cap. ix. exiguum quandam descriptis us herbam, floribus eleganter caeruleis & calathiformam referentibus, quam Violam calathianam nuncupamus, utpote Viola calathiana descriptioni respondentem; quam quidem Io. Ruellius habet lib. i. c. cxxix. Sed plura & locupletata malitum adfert Ruellius verba; & secus quam in Plinij exemplaribus reperiuntur.

Si Plinij verba diligenter expendantur, Calathiana Violae nequaquam caerulea, sed lutea est, caltha concolor. Ita etenim Plinius lib. xxi. cap. vi.

In totum sine odore minutoq; folio Calathiana minus Autumni, caetera Veru. Proxima ei Caltha concolori magnitudine: vincit numero foliorum maritimam, quinque folia non excedentem. His verbis ostendit Plinius Calathianam concolorem esse Caltham, id est, luteam, et aequalis magnitudinis: sed tamen Caltha florem pluribus componi foliis.

Caltham autem esse lutei coloris, ostendunt Virgilij et Columellae versus, cap. de Calendula à nobis citati.

Ruellius verò unde locupletatam illam descriptionem acceperit, non facile suerit affirmare. non est tamen, quod ab eo excogitatum suspicetur quicquam. Nam talem, qualem ipsa descriptio proponit Calathianam violam non agnoscunt. Existimas

stimat siquidem Aquileiam, Gallis Ancoiles, dictā Calathianam esse: qua à descriptione, ab eo proposita, multū deficit. Aquileia non munus Autumni, sed Verus flos; calathum non refert, sed alterius est forma: colore idem non semper ceruleus, sed colorum varietate luxuriat. Ruellij de Calathiana hæc sunt verba:

Calathiana nomen Autumni, Viole ceteris Veris. ea minuto est folio Viola alba non dissimili, in totum sine odore, calathi similitudine, Autumno tantum proveniens, tanta coloris pulchritudine, ut ceruleum ipsum quod imitatur prouocet; in pratis post Aestatem emicat; Autumnalē Violam nominant.

Quod si hæc verba neq; Plinij, neque alicuius veterum sunt, nostra Calathiana legitima esse quomodo poterit? Quod si verò ex antiquo aliquo Pliniano codice transscripta, cōsequens erit, eui. lgata exemplaria corrupta ac mutila, & veram esse Calathianam à nobis descriptam, apparebit. Sed quid in tam dubiis affirmandum? Expediit subinde stirpes nouis donare nominibus, quàm temerè eis veteres appellationes attribuire. Ita nostram hanc præstisset fortassis Autumnalē Campanulam appellasse, quàm Calathianam dixisse. Deinceps idcirco Campanula nobis erit Autumnalis: Calathiana verò ubi Plinij reperiunt exemplar, aut alterius alicuius veteris auctoris, ex quo Calathiana Viole descriptionem Ruellius mutuatus est.

F I N I S.

INDEX HVIVS

LIBRI.

A Elinthium angustifolium	41	Astrantia	493
Aconitum bacciferum	138	Aurea mala	364
Aconitum Pardalanches	305	Auricula vrfi	386
Aconitum Theophrasti	313	Barba Aaron	29
Adonidis flos	304	Behen	41 & 92
Alazor	122	Biondella	51
A. ca vesicaria	419	Bisaria	32
Akakengi	316	Bistorta	40
Aloe	115	Bolbocastanum	43 & 44
Aloe Gallica	70	Britannica	43
A. Icebran	160	Bryonia alba & nigra	229
Albata hortensis	418	Bryonia sylvestris	233
Alyflos	106	Bulbus eriophorus	469
Alzelin	61	Campana carulea	223
Amatodu'cis	240	Capnos Chelidonia	15
Ambuxum	248	Casrifolium	261
Amnu	477	Cardopatum	439
Androsimum	425	Carduus erioccephalus	445
Anemones	293	Carduus sphaerocephalus	413
Anemone sylvestris	303 & 311	Carduus stellatus	448
Angelica	458	Carlina humilis	410
Anteuphorbium	171	Cartamus	123
Anthora		Caraputia maior	117
Aparine	98 & 99	Caucasen	463
Apios	155	Centaurea	49
Apium risus	281 & 283 & 294	Centaureis	121
Apocynum	255	Centaureium magnum	46 & 48
Apollinarius	347	Centaureium minus	51
Argemone	341	Chamaecissus	215 & 217 & 271
Arisarum	37	Chamaeleon albus	441
Aristolochia Clematidis	13.16	Chamaeleon niger	ibid.
Aristolochia longa	13.14.21	Chamaepityes	428 & c.
Aristolochia rotunda	13.15	Chamaesyce	166
Aristolochia Sarracenicia	19	Chamelata	124
Aronia	33	Chamelæa Germanica	129
Arthanita	56	Chondrilla species	454
Arum	26 & 27	Christophoriana	236
Arum Egyptianum	28	Cicuta	374
Arum palustre	36	Cision	451
Afarum	110	Clematis altera	148
Aselepias	252	Clematis Daphnoeides	245
Ascyros	422	Cncoron	131 & 133
Asperugo	98	Cnicus	122
Asperula odorata	104	Colchicum	372
Asphodelus minor	402	Colocasia	19
Aster Atticus flore luteo	411	Colocynthis	180
		Colofo	

Colossinus color	5	Halimolobos peregrinus	116	
Convolvulum maritimum	220	Hamamelis	420 & 421	
Convolvulum nigrum	ibid.	Hedera	267	
Cordialis	106	Hedera mollis	212	
Corona imperialis	42	Hedera spinosa	226	
Corona terre	218	Hedera terrestris	115	
Cinchinus chrysanthemus	438	Helenium Aegyptium	75	
Cinchinus spinosus	437	Helenium Apulei	75	
Crocus sylvestris	406	Helenium Theophrasti	75	
Crucifera	70. 71. &	10	Helleborine	187
Cucumis sylvestris	178	Helleborites	53	
Cucurbita sylvestris	181	Helleborus albus	183	
Cyclamen	16	Helxine Cissampelos	220	
Cyclaminus orbicularis.	14. 15	Hemerocallis Valentina	401	
Cyperus	59	Herba bauosa	115	
Dens caninus	388	Herba Paris	326	
Denaria	381	Hermodyctylus	372 & 373	
Diagridium	207	Hippomanes	155 & 370	
Dietamnium	425 &	426	Hippophaes	151
Dracontea	11	Hyacinthus autumnalis	407	
Dracontium	10. 11	Hyoscyamus	144	
Dracontium minus	32. 33	Hyoscyamus Peruvianus	349 &	
Draconculus	32 & 41	150.		
Draconculus aquaticus	35 &	36	Hypocoum.	342
Draconculus polyphyllus	31	Hypericon	412	
Dulcamara	238	Hypocistis	400	
Dulcichinum	60. 61	Iarus	29	
Dulcis radix	63	Isaminum	259	
Ebulus	176 &	177	Imperatoria	499
Elaternum	178	Inula	73	
Enula campana.	73	Iris biflora	403	
Ephemeron	31	Iris bulbosa Lusitanica	474	
Epimedium	386	Iris tuberosa	393	
Erigeron species	456	Isacus angulosus	60	
Erigeron	24 &	25	Iuncus quadratus	ibid.
Euphorbium	36	Iusquamus	347	
Ezula	157	Lactaria caprina	151	
Ezula rotunda	164	Lappa minor	98	
Ficaria	415	Lathyrus	162	
Flammula	24	Laureola	113	
Flammula Ranunculus	295	Leucoion bulbosum autumnale	110	
Fraxinella	82	Lemnicum	486	
Fumaria	395	Leontopetalon	24	
Gallium	102	Limonium	43 & 93	
Geraanium tuberosum	417	Linaria odorata	399	
Gethium	358	Liquiritia	67	
Glaucium	341	Lupha	29	
Granum Noli	224	Luph crispum	32	
Gratiola	119	Lupinus	256	
Habaladina	61	Lycostemon luteum	309	
			Lycos-	

INDEX.

Lycostemon luteum minus	111	Pistlochis	18
Lycostemon non lutea	14	Pityusa	157
Mala Malana	366	Polygonum	77 & 78
Mastigoras	63	Polyrhizon	18
Mastigoras Theophrasti	361	Pomum spinosum	363
Mecobacha	215	Presea	100
Mecomum	330	Pseudocapsicon	462
Melampodium	12	Pseudochamaepitys	412
Melanthium Damascenum	501	Pseudocyperus	59
Meleagris flos	395 & 397	Pseudodictamnium	427
Meum	473	Pseudohelleborum	192
Mezeion	126 & 129	Pulsailla	194
Mollugo	100	Pytelhrum	79
Molucca lanis	463	Radix caua	1123
Molucca spinosa	464	Ranunculi externi	181
Moly Indicum	447	Ranunculus hortensis	276
Moly Theophrasti	466	Ranunculus Lusitanicus	183
Morilla	351	Ranunculi sylvestres	27
Napeilus	317	Ranunculus tuberosus	189
Napeilus Movsis	321	Rha	200
Narcissus albus	408	Rhodia radix	8. & 82
Narcissus autumnalis	40	Rheon	107
Narcissus multiplex	395	Ricinus	135
Nardus rustica	12	Ros Solis	471
Nasturtium Indicum	471	Rubia	79
Oleaster	124	Rubia marina	103
Onopordon	46	Rubus cetrinus	216
Opium	310	Ruta genera	411
Ornithogalon Narbonense	311	Ruta montana minima	49
Ostris	418	Ruta sylvestris	412
Oxyptea	44	Salcastrum	115
Palma Christi	117	Sarracenica	1012
Panaces Chironion	75 & 381	Sarracenia magna	494
Pandis species	487	Saxifraga parva	45
Panis porcineus	16	Scammionum	207
Papaver	329	Scandix	501
Papaver corniculatum	317	Scellum	160
Papaver corniculatum rubrum	319	Secacul	78
Papaver craticum	313	Sena	17
Papaveruli	372	Serpentaria maior	12
Pedicularis	133	Serpentaria minor	19
Peperon sine Peplus	161	Sesamoides magnus	197
Peplus	ibid	Sesamoides parvus	199
Periploca	255	Seseli Ethiop. frutex	481
Periploca	112	Seseli Ethiop. herba	481
Peruvilla	24	Sigillum Solomonis	78
Petamborica	71	Siler montanum	485
Petamborica	ibid	Synocelum	405
Pentstemon	479	Smilax aspera	226
Pheaeus color	303	Smilax lauis maior	200

Smilax

INDEX.

Smilax laevis minor	211	Thora valdenlis	327
Smyrnion Dioscoridis	491	Thymelaea	128
Solanum hortense	351	Tigridis flos	470
Solanum lethale	359	Tithymali	138 &c.
Solanum manicum	358	Tithymalus tuberosus	155
Solanum somniferum	357	Toxicum	319
Solanum vesicarium	354	Tragium primum	84
Solatrium	353	Trasi	61
Soldanella	218	Tripolium	173
Speronella	100	Tuber tetræ	56
Sphondylium	450 & 451	Turbith	175
Spina solstitialis	449	Valeriana	85
Staphis agria	134	Valeriana Græca	93
Stellaria	106	Valeriana rubra	92
Stachas folio serrato	411	Veratrum album	183
Stramonia	368	Veratrum nigrum	188 & 193
Sylue mater	263 & 271	Vincetoxicum	150
Tamus	233	Vitalba	241
Tarragontia	33	Volucrum maius	263
Terdina	90	Vua Taminia	235
Tetræ malum	46	Vua vulpis	353
Terræ sapum	ibid.	Vulgago	112
Thalictrum	434	Xylosteum	263 & 264
Thesium	25	Zarza parvula	216
Thora	319	Zedoaria	313

INDEX GRÆCARVM VOCVM.

Ἀγριοκάρδιον	45	ἀσπερς	212
ἀνδρὶς	67	αὐξίς	417
ἀκρίδιον σπινθάριας	307	βητράχιον	281
ἀνδράκατος	116	βυβλοκάρδιον	45
ἀνδρὶς	29 & 67	βριάει	231
ἀνδρὶς	115	γὰλινος	102
ἀνδρὶς ἰγρεα	235	γὰντος	ibid.
ἀνδρὶς ἰγρεα	211	γὲ πῆν	70
ἀνδρὶς ἰγρεα	ibid.	γλυκύπικρον	240
ἀνδρὶς ἰγρεα	166	γλυκύριζα	63
ἀνδρὶς ἰγρεα	314	δακτυλίτης	17
ἀνδρὶς ἰγρεα	173	δερδατος	18
ἀνδρὶς ἰγρεα	98	δαφνοδιδίς	133
ἀνδρὶς ἰγρεα	117	δράκιδιον	33
ἀνδρὶς ἰγρεα	256	δρακοτία	19 & 12
ἀνδρὶς ἰγρεα	37	δρακοντις	32
ἀνδρὶς ἰγρεα	ibid.	ἐλκιδίον	187 & 18
ἀνδρὶς ἰγρεα	17	ἐλκιδίον λευκὸν	185
ἀνδρὶς ἰγρεα	ibid.	ἐλκιδίον λευκὸν	192
ἀνδρὶς ἰγρεα	29 & 33	ἐλκιδίον λευκὸν	212
ἀνδρὶς ἰγρεα	33	ἐλκιδίον λευκὸν	95

ἱεροσολιμῶν	60	πῖπλιον	133 & 166
ἐν τῇ γ' ὕδατι	67	πῆλιν	166
ἐν τῇ β' ὕδατι	169	πῆλιν	164
ἡ δὲ πᾶ	18	πῆλιν	263
ῥῆμα	60	πῆλιν	160
ῥῆμα	95	πῆλιν	410
ῥῆμα	25	πῆλιν	78
ῥῆμα	128	πῆλιν	3
ῥῆμα	153	πῆλιν	38
ῥῆμα	157	πῆλιν	79
ῥῆμα	49	πῆλιν	101
ῥῆμα	51	πῆλιν	ibid.
ῥῆμα	137	πῆλιν	82
ῥῆμα	96	πῆλιν	281
ῥῆμα	363	πῆλιν	193 & 199
ῥῆμα	241	πῆλιν	180
ῥῆμα	270	πῆλιν	181
ῥῆμα	247	πῆλιν	17
ῥῆμα	248	πῆλιν	27
ῥῆμα	131	πῆλιν	67
ῥῆμα	132	πῆλιν	218
ῥῆμα	129	πῆλιν	216
ῥῆμα	181	πῆλιν	134
ῥῆμα	181	πῆλιν	313
ῥῆμα	372	πῆλιν	316
ῥῆμα	220	πῆλιν	318
ῥῆμα	137	πῆλιν	37
ῥῆμα	16	πῆλιν	164
ῥῆμα	111	πῆλιν	131 & 132
ῥῆμα	19	πῆλιν	33
ῥῆμα	177	πῆλιν	347
ῥῆμα	161	πῆλιν	342
ῥῆμα	121	πῆλιν	ibid.
ῥῆμα	111	πῆλιν	119
ῥῆμα	112	πῆλιν	200
ῥῆμα	368	πῆλιν	89
ῥῆμα	363	πῆλιν	316
ῥῆμα	142	πῆλιν	177
ῥῆμα	137	πῆλιν	133 & 147
ῥῆμα	168	πῆλιν	17 & 78
ῥῆμα	137	πῆλιν	84
ῥῆμα	314	πῆλιν	17
ῥῆμα	17	πῆλιν	164 & 168
ῥῆμα	50	πῆλιν	114
ῥῆμα	314	πῆλιν	49
ῥῆμα	337	πῆλιν	70 & 483
ῥῆμα	379	πῆλιν	





Rembert Dodoens geboren,

in Jankama in Frisland

29. Juni,

1517, des Jankama Friso,

Stadtschreiber zu Liden

1586, 10. Mai.

P. J. van Meerbeeck recherches

historiques et critiques sur
la vie et les ouvrages de

Rembert Dodoens. Malines

1841. 8. maj. (avec portrait, facsimile et
representation de son tombeau.) 340 ff.